FLORA
GRÆCA
Sibthorpiana.

CENTURIÆ DECIMÆ

QUOD EXTAT.

1840.



DELPHI.

FLORA GRÆCA:

SIVE

PLANTARUM RARIORUM HISTORIA

QUAS

IN PROVINCIIS AUT INSULIS GRÆCIÆ

LEGIT, INVESTIGAVIT, ET DEPINGI CURAVIT,

JOHANNES SIBTHORP, M.D.

SS. REG. ET LINN. LOND. SOCIUS,

BOT. PROF. REGIUS IN ACADEMIA OXONIENSI.

HIC ILLIC ETIAM INSERTÆ SUNT

PAUCULÆ SPECIES QUAS VIR IDEM CLARISSIMUS, GRÆCIAM VERSUS NAVIGANS, IN ITINERE, PRÆSERTIM APUD ITALIAM ET SICILIAM, INVENERIT.

CHARACTERES OMNIUM,

DESCRIPTIONES ET SYNONYMA,

ELABORAVIT

JOHANNES LINDLEY, PH. D.

ACAD. REG. BEROL. CORRESP.; ACAD. CÆS. NAT. CUR. SS. REG. LINN. LOND. REG. BOT. RATISB. REG. HORT. BEROL. PHYSIOGR. LUND. ALIARUMQUE SOCIUS; SOC. BATAV. SCIENT. ET LYCEI HIST. NAT. NOVEBOR. SOC. HON.

BOT. PROF. IN COLLEG. UNIV. ACADEMIÆ LONDINENSIS NEC NON IN INST. REG. BRIT. ET SOC. PHARM. LOND

VOL. X.

LONDINI:

TYPIS RICHARDI ET JOHANNIS E. TAYLOR.

MDCCCXL.

LECTORI BENEVOLO.

ECCE tandem ex prelo prodit opus illud Sibthorpianum, cui nomen inditum est FLORÆ GRÆCÆ, quum jam post obitum auctoris quadraginta quinque præterierunt anni. Neque in eo solum vir egregius operam suam præstitit, ut cognitione diligenti et scientia singulari rem herbariam Græcorum collectam digereret; sed idem fundi annuos fructus legavit, unde et liber, et quod multo majus est, istæ tabulæ, tum propter pulcritudinem, tum quod tam prope ad naturæ veritatem accedunt præstantissimæ, publici juris fieri possent.

Operi promovendo per tot annos præfuerunt, quibus Sibthorpius curam testamenti sui demandaverat, Johannes Hawkins socius ejus laborum itinerumque, et Thomas Platt, quo diu usus erat familiarissime. Hi ultra concessum humani ævi spatium suo quodam fato durasse videntur, tamquam ad id ipsum ut amicis liceret amici votis quam absolutissime satisfacere. Unum quodammodo molestius ferunt, quod non potuerint totum illud mille tabulas, quod testator ipse præfiniverat, efficere. Causam tamen apud omnes probatum iri sperant. Quippe tantum indicium liberalissimi animi tam insigni legato vix dederat Sibthorpius, quum, uno mensi interposito, subita morte est præreptus. Decimam igitur centuriam, quam operis finem fore sibi animo proposuerat, neque explevit, neque unde alii possent explere, reliquit. Huc accedit, quod pictor, cujus eximia opera adhuc datum est uti, et ipse desiit vivere. Ita quum omnes necessariæ opes ad rem ex sententia auctoris perficiendam desint, nemo profecto reperietur, qui culpæ putet vertendum, si ordo tabularum non ultra DCCCCLXVI^am^ processerit.

Is denique, qui post Smithii mortem curatoris est munere functus, hoc pro se dictum velit. Quum optime sciat quam nihil suo labore ad faustum exitum profuerit, tamen haud mediocri sibi ducit gloriæ, ei se operi curando et ad finem perducendo interfuisse, quo nemo antehac indagatoribus naturæ quicquam legavit splendidius.

KALENDIS JUNIIS: ANNO SALUTIS MDCCCXL^mo^. EX COLLEGIO UNIVERSITATIS APUD LONDINENSES.

Centaurea spinosa.

Centaurea cuneifolia.

TABULA 901.

CENTAUREA CUNEIFOLIA.

Centaurea foliis arachnoideo-tomentosis: summis linearibus acutis inferioribus bipinnatifidis, lobis obovato-cuneatis mucronulatis, capitulis ovato-oblongis, squamis fimbriatis sulcatis.

C. cuneifolia. *Prodr. v.* 2. 198. *De Cand. Prodr. v.* 6. 581.

In monte Athô. ⊙.

Tota arachnoideo-tomentosa. *Caulis* strictus, corymboso-ramosus, bipedalis, angulatus; *ramis* rigidis, gracilibus. *Folia inferiora* bipinnatifida, laciniis versus basin sensìm decrescentibus, minoribus indivisis interjectis; lobis obovato-cuneatis, mucronulatis; *superiora* pinnatifida, mox basi utrinque appendiculata; *summa* linearia, indivisa in squamas ferè mutata, nunc capitulis proxima, sæpiùs infra capitula deficientia. *Capitula* solitaria, ovata, 5 lineas longa. *Involucri squamæ* ovatæ, levitèr sulcatæ, rigidæ, basi glabræ, apice arachnoideæ, setis æqualibus, glabris, appressis, subspinosis fimbriatæ; *intimæ* lineares, apice tantùm fimbriatæ. *Pappi* setæ valdè inæquales, *achœnio* breviores; extimæ squamæformes.

Huic proximè affinis est Cyanus orientalis artemisiæ foliis, *Tourn. Cor.* 32, sed floribus majoribus squamisque calycinis haud sulcatis diversus. *J. E. Smith.*

a. Involucrum.
b. Una e squamis involucri intermediis.
c. Flosculus radii.
d. Flosculus disci, cum ovario suo.

TABULA 902.

CENTAUREA SPINOSA.

Centaurea arachnoideo-incana, caule fruticoso ramosissimo intricato, ramis inflorescentiæ spinescentibus, foliis pinnatis: laciniis linearibus obtusis distantibus summis integerrimis, capitulis sessilibus lateralibus, involucri ovalis angusti glabri squamis fimbriatis apice brevè spinescentibus.

C. spinosa. *Linn. Sp. Pl.* 1290. *Willd. Sp. Pl. v.* 3. 2293. *De Cand. Prodr. v.* 6. 586. *No.* 111.
Cyanus spinosus. *Alpin. Exot.* 163, *t.* 162.
Jacea cretica aculeata incana. *Tourn. Inst.* 445.

In Cretæ et Helenæ insularum arenosis maritimis, et prope Athenas. ♄.

Suffrutex pygmæus, basi lignosus, apice herbaceus, ramosissimus, intricatus, undique lanugine arachnoideâ incanus; *ramis* divaricatis, furcatis, nunc spinescentibus elongatis, nunc brevibus monocephalis. *Folia caulina* pinnatifida, basi dilatatâ vaginantia; *laciniis* linearibus, mollibus, obtusis, inferioribus minoribus; *ramea* summa linearia, indivisa, ferè in squamas mutata. *Capitula* solitaria aut geminata, sessilia, 4 lineas longa, angusta, ovalia, glabriuscula; *squamis* ovatis, acuminatis, apice spinosis, utrinque setis candidis ramentaceis fimbriatis. *Flosculi* albidi.

a. Capitulum.
C. D. E. Involucri squamæ magnitudine auctæ.
F. Flosculus radii, auctus.
G. Flosculus disci, auctus.
B. Idem, magnitudine auctum.
f. Flosculus radii.
g. Flosculus disci, cum ovario suo.

TABULA 903.

CENTAUREA RAGUSINA.

Centaurea albo-tomentosa, caule erecto subsimplici, foliis radicalibus petiolatis infimis oblongis integerrimis superioribus pinnatifidis: laciniis oblongis undulatis subdentatis obtusis, caulinis paucis semipinnatifidis subsessilibus, capitulis racemosis incanis: squamis maturis glabris obtusis fimbriatis inermibus.
C. ragusina. *Linn. Sp. Pl.* 1290. *Willd. Sp. Pl. v.* 3. 2294. *Bot. Mag. t.* 494. *De Cand. Prodr. v.* 6. 589. *No.* 132.
Jacea epidaurica, candidissima et tomentosa. *Tourn. Inst.* 445.

In insulâ Cretâ. ♃.

Radix multiceps, lignosa, contorta. *Herba* tota tomento densissimo albo arachnoideo incana. *Rami* subdivisi, ascendentes, basi densè foliati, apice in *caulem* angulatum, pedalem, racemo paucicipiti terminatum producti. *Folia radicalia* longè petiolata, cæspitosa; infima oblonga, repanda, integerrima; proxima triloba, laciniis lateralibus oblongis multò minoribus; superiora pinnatifida, laciniis oblongis, undulatis, sensìm basin versus decrescentibus, integerrimis aut denticulatis, ultimâ majore; *caulina* subsessilia, internodiis subæqualia, semipinnatifida, sub capitulis in bracteas lineares obtusas patentes mutata. *Capitula* subrotundo-ovata, semipollicaria, juniora incana,

Centaurea Jacea.

F f d e b c a B

Centaurea napifolia.

Centaurea sphaerocephala.

matura glabra, flava. *Involucri squamæ* exteriores oblongæ, obtusæ, fimbriatæ, haud spinescentes, interiores sensìm elongatæ, demùm, fimbriis evanidis, in appendicem bilobam, scariosam, laceram desinentes. *Flosculi* aurei. *Pappi* setæ pallidæ, valdè inæquales; extimæ minimæ.

Centaurea Marschalliana, Spreng. vix differt nisi flosculis purpureis nec aureis, et pappo brevi discolori; habitu et pluribus notis simillima est.

a. Capitulum.
d. Flosculus radii.

b. *c*. Squamæ involucri exteriores.
e. Flosculus disci, cum ovario suo.

TABULA 904.

CENTAUREA SPHÆROCEPHALA.

Centaurea caule diffuso, foliis hispidis auriculatis lyratis laciniis angulatis dentatis, terminali maximâ: summis involucrantibus subintegris, involucri squamis spinas 5 palmatas erecto-patulas gerentibus, pappo brevissimo in radio nullo.

C. sphærocephala. *Linn. Sp. Pl.* 1295. *Willd. Sp. Pl. v.* 3. 2311. *De Cand. Prodr. v.* 6. 599. *No.* 192.

C. Romana. *Linn. Sp. Pl.* 1295.

C. Zanonii. *Sebast. et Maur. Fl. Roman.* 298. *in Adnot.*

C. cæspitosa. *Vahl. Symbol. Botan. v.* 2. 93.

Carduus sphærocephalus tingitanus. *Tourn. Inst.* 441.

Jacea tingitana centauroides echinato capite villoso, ex unaquaque squama plurimis aculeis circulariter radiatis. *Pluk. Almag.* 191. *t.* 38. *f.* 5.

In Archipelagi maritimis. ♃.

Deest in herbario Sibthorpiano.

a. *b*. Involucri squamæ duæ.
d. Flosculus disci, cum ovario suo.

c. Flosculus radii.

TABULA 905.

CENTAUREA NAPIFOLIA.

Centaurea caule erecto ramoso foliaceo-alato, foliis caulinis longè decurrentibus lineari-lanceolatis dentatis: inferioribus lyratis laciniâ terminali cordato-ovatâ, capitulis

bracteatis radio longissimo pendulo, involucri squamis apice subcordatis radiato-spinosis cartilagineis.

C. napifolia. *Linn. Sp. Pl.* 1295. *Willd. Sp. Pl. v.* 3. 2313. *De Cand. Prodr. v.* 6. 600. *No.* 199.

Pectinastrum napifolium. *Cassin. in Dict. Sc. Nat. v.* 44. *p.* 38.

Carduus creticus rapi folio. *Tourn. Inst.* 442.

In Cretâ et Siciliâ. ⊙.

Radix annua. *Herba* viridis, pubescens. *Caulis* erectus, sesquipedalis, corymboso-ramosus, membranâ foliaceâ dentatâ, a basibus foliorum decurrentibus ortâ, alatus. *Folia radicalia* petiolata, rugosa, lyrato-pinnatifida; *petiolo* alato, dentato; *laciniis* dentatis, lateralibus ovatis, intermediâ ovato-cordatâ in infimis, obovatâ in supremis; *ramea* linearia, sessilia. *Capitula* bracteâ unâ alterâve proximâ subtensa; *flosculis* roseis, laxis, tubo albo elongato, deflexis, involucro longioribus. *Involucrum* 6 lineas longum, subrotundo-ovatum, basi subarachnoideum, cæterùm glabrum; *squamis* cartilagineis, arctè imbricatis, palmato-spinosis, planis, infimis sessilibus, superioribus cordatis in stipitem herbaceum elevatis, summis elongatis tantùm dentatis. *Pappi* setæ valdè inæquales, extimæ minimæ.

a. Involucrum.
B. Involucri squama intermedia, magnitudine aucta.
d. Flosculus radii.
b. Squama ejusdem intermedia.
c. Una e squamis involucri intimis.
e. Flosculus disci.
f. F. Achænium maturum, magnitudine naturali et auctum.

**** *Involucri spinis compositis*, Calcitrapæ.

TABULA 906.

CENTAUREA BENEDICTA.

Centaurea foliis amplexicaulibus subdecurrentibus semipinnatifidis spinosis reticulatis glabris capitula sessilia terminalia involucrantibus, achænio sulcato coronâ dentatâ cincto, pappi duplicis serie extimâ setiformi nudâ intimâ nanâ ciliatâ.

C. benedicta. *Linn. Sp. Pl.* 1296. *Willd. Sp. Pl. v.* 3. 2315.

Calcitrapa lanuginosa. *Lam. Fl. Fr. v.* 2. 35.

Cnicus benedictus. *De Cand. Prodr. v.* 6. 606.

Carduus benedictus. *Camerar. Epit.* 566. *cum ic.*

Cnicus sylvestris hirsutior, seu Carduus benedictus. *Tourn. Inst.* 450.

Καλάγγαθο *hodiè.*

In variis Peloponnesi locis, necnon in Cretâ, Cypro, et Samo, insulis. ⊙.

Centaurea benedicta

Centaurea aegyptiaca.

Plantæ hujus, medicinâ celeberrimæ, per omnem Europam australem vulgatæ, nihil restat in herbario Sibthorpiano nisi folia vermibus ferè devorata, necnon *achæniorum* reliquiæ quædam. Hæ, vernice quasi obductæ, sulcatæ, tres lineas longæ, basi angustiores ibique hinc areolâ magnâ ovali excavatâ notatæ, apice coronâ cartilagineâ dentatâ, cui tot dentes quot laterum sulci, cinguntur. Intra coronam *pappus* adest duplex; cujus *exterior* e setis 10, subulatis, rigidis, glabris constat, dùm *interiori* totidem adsunt nanæ, ciliatæ, in conum conniventes.

a. Involucrum.
b. *c*. Ejusdem squamæ.
d. Flosculus radii.
e. Flosculus disci, cum ovario suo.
f. F. Achænium, magnitudine naturali et auctum.
g. Receptaculum pilosum.

TABULA 907.

CENTAUREA ÆGYPTIACA.

Centaurea subpubescens, caule ramoso prolifero, foliis spathulatis in petiolum basi simplicem decurrentibus: radicalibus pinnatifidis rariùs integerrimis apiculatis, capitulis sessilibus foliis brevioribus, squamis glabris productis in spinam maximam pugioniformem basi utrinque bisetosam: intimis apice membranaceis.

C. ægyptiaca. *Linn. Mant.* 118. *Willd. Sp. Pl. v.* 3. 2316. nec *De Cand. Prodr. v.* 6. 595.

In Achaiâ. ⊙. (4?)

Caulis erectus, pygmæus, pilosus, a basi imâ ramosissimus; *ramis* rigidis ascendentibus, ad bifurcationes floridis. *Folia* subcarnosa, pilosa, viridia, spathulata, ima tantùm pinnatifida, superiora omnia integerrima, summa capitulis longiora, patentia. *Capitula* in apices et dichotomias ramorum sessilia, foliis subverticillatis bracteata; *flosculis* purpureis. *Involucrum* globosum, glabrum: *squamis* paucis, arctè imbricatis, apice in spinam pugioniformem longissimam pallidam productis, basi utrinque setis 2—3 rigidis nanis auctam; *superioribus* tridentatis tantùm; *intimis* apice membranaceis, patulis.

Hæc species, cum *C. cancellatâ* Sieberi à cl. Candollio perperàm conjuncta, ab omnibus ejusdem sectionis in Prodromo suo descriptis diversa videtur.

a. Involucrum.
b. Flosculus radii.
c. Flosculus disci.

TABULA 908.

CENTAUREA SOLSTITIALIS.

Centaurea caule erecto ramoso, foliis arachnoideo-tomentosis spinuloso-dentatis, radicalibus interruptè pinnatifidis caulinis linearibus decurrentibus, capitulis solitariis sublanatis, squamis intermediis in spinam validam productis utrinque basi setosam: intimis apice scariosis subrotundis.

C. solstitialis. *Linn. Sp. Pl.* 1297. *Willd. Sp. Pl. v.* 3. 2309. *De Cand. Prodr. v.* 6. 594. *No.* 156.

Calcitrapa solstitialis. *Lam. Fl. Fr. v.* 2. 34.

Carduus stellatus luteus, foliis cyani. *Tourn. Inst.* 440.

Φαλαρίδα *hodiè.*

In Græciâ et Archipelagi insulis, frequens. ⊙.

Radix annua, fibrosa. *Caulis* arachnoideo-tomentosus, strictus, angulatus, striatus, simplicitèr ramosus, parcè foliatus; *ramis* longis ascendentibus; capitulo altero terminali, aliisque lateralibus subsessilibus. *Folia radicalia* pinnatifida, longè petiolata, laxè arachnoidea, laciniis spinuloso-paucidentatis: lateralibus 4—6, inæqualibus, linearibus ovatisque imò triangularibus, terminali hastato-ovatâ, subrepandâ, mucronatâ; *caulina* linearia, acuminata, apice spinosa, stricta, decurrentia, sæpiùs cauli adpressa; *suprema* subulata. *Flosculi* lutei, stricti, involucro breviores. *Involucrum* parvum, lanatum, ovale, foliis quibusdam proximè bracteatum; *squamæ* infimæ apice setis aliquot rigidis armatæ; intermediæ in spinam longam, rigidam, pugioniformem, basi utrinque setosam productæ; summæ appendice albâ scariosâ patulâ terminatæ. *Pappi* albi setæ valdè inæquales, extimæ minimæ.

Inter Centaureas Calcitrapeas speciem invenio sub nomine *C. Schouwii* a Candollio descriptam, cui planta nostra meliùs quam *C. solstitiali* veræ respondit. An fortè eadem? Folia parùm decurrentia, capitula minora lanata, spinæ squamarum validæ, omnia a *C. solstitiali* abhorrent.

a. b. Involucri squamæ. *c.* C. Flosculus radii, magnitudine naturali et auctus.
d. D. Flosculus disci, cum ovario suo, magnitudine naturali et auctus.

TABULA 909.

CENTAUREA MELITENSIS.

Centaurea caule erecto ramoso glanduloso-pubescente scabriusculo, foliis radicalibus lyrato-pinnatifidis in petiolum angustatis, caulinis longè decurrentibus linearibus

Centaurea solstitialis.

A

Centaurea melitensis

Centaurea drabifolia.

dentatis acutissimis, capitulis subsolitariis supra ultima folia sessilibus pilosis ovato-globosis, involucri squamis spinosis basi pinnatis intimis indivisis.

C. melitensis. *Linn. Sp. Pl.* 1297. *Willd. Sp. Pl. v.* 3. 2310. *De Cand. Prodr. v.* 6. 593.

Triplocentron melitense. *Cassin. in Dict. Sc. v.* 55. 369.

Carduus stellatus luteus, capitulo minùs spinoso. *Tourn. Inst.* 440.

Jacea melitensis, capitulis conglobatis. *Boccon. Sicul.* 65. *t.* 35.

In Rhodo insulâ; etiam in agro Laconico. ⊙.

Radix annua, fibrosa. *Caulis* erectus, a basi ramosus, 1—2-pedalis, striatus, pube glandulosâ subasperâ cinereus. *Folia* pubescentia, scabriuscula, dentata; *radicalia* petiolata, pinnatifida, sublyrata, laciniis acutis, lateralibus oblongis, intermediâ multò longiore sed parùm latiore; *caulina* basi lanceolata, juxta capitula linearia, longè decurrentia. *Capitula* sæpiùs solitaria, terminalia et axillaria, nunc secus ramos racemosa, nunc geminata, sparsa. *Flosculi* flavi, stricti, involucro breviores. *Involucrum* ovatum, semunciam longum, pilosum; *squamæ* fuscæ, in spinam patulam, basi pinnatam, productæ, intermediis longioribus, intimarum spinulis lateralibus obsoletis.

a. Involucrum. *b. c. d*. Ejusdem squamæ, magnitudine naturali.
e. E. Flosculi radii; *f*. F. disci, magnitudine naturali et aucti.
g. G. Achænium, cum pappo suo, magnitudine naturali et auctum.

TABULA 910.

CENTAUREA DRABIFOLIA.

Centaurea cæspitosa, arachnoidea, incana, caulibus monocephalis ascendentibus, foliis petiolatis lanceolatis dentatis acutissimis, involucri sublanati ovalis spinis palmatis trifidisque laciniâ intermediâ longiore.

C. drabifolia. *Prodr. v.* 2. 202. *De Cand. Prodr. v.* 6. 595. *No.* 168.

In Olympo Bithyno monte. ♃.

Radix perpendicularis, ramosa, lignea, quasi rupibus infixa. *Caules* ascendentes, 1—2 pollices alti, a basi ipsâ foliati, arachnoidei, incani, apice monocephali. *Folia* omnia subconformia, arachnoidea, lanceolata, semunciam longa, dentata, acutissima; dentibus inferiorum altioribus. *Capitula* solitaria, ovato-oblonga, foliis proximis bracteata; *flosculis* luteis, radii laxè patulis, trifidis. *Involucrum* 8—9 lineas longum, sublanatum; *squamarum* spinis fuscis, infimarum simplicibus, intermediarum nunc

trifidis, nunc basi palmatis laciniâ intermediâ longiore, intimarum apice dilatato, pallido, scarioso.

Plantæ hujus rarissimæ involucrum in exemplaribus herbarii Sibthorpiani floridis lanâ densâ juxta omnis squamæ apicem vestitur, ideòque species à cel. Candollio sub hoc nomine descripta paulò diversa videtur.

a. b. c. Involucri squamæ.
d. Flosculus radii.
e. Flosculus disci, cum ovario suo.

TABULA 911.

CENTAUREA ACICULARIS.

Centaurea acaulis, lanata, foliis humifusis interruptè bipinnatis: laciniis incisis acuminatis, capitulis subsessilibus, involucri spinis rectis gracilibus patulis intermediis pinnatis, squamis intimis apice sanguineis multifidis.

C. acicularis. *Prodr. v.* 2. 203. *De Cand. Prodr. v.* 6. 595.

In Liro et Cypro insulis. ♃.

Radix crassa, lignosa. *Caulis* omninò nullus. *Folia* humifusa; *juniora* lanugine alba; *adulta* arachnoideo-lanata, cinerea, spithamæa, interruptè bipinnata, laciniis acuminatis, incisis integrisque. *Capitula* inter folia sessilia aut pedunculata, oblonga; *flosculis* aureis, radii 5-fidis. *Involucrum* oblongum, pollicem et ultra longum; *squamæ* subtomentosæ, exteriores lineari-lanceolatæ, in spinam simplicem reflexam tenuem productæ, intermediæ ovatæ, spinâ longâ tenui, pinnatâ, patenti, proximæ lineari-oblongæ, ad basin spinæ brevioris fimbriatæ, intimæ lineares, in appendicem sanguineam, luteo limbatam, multifidam dilatatæ. *Achænium* immaturum pubescens. *Pappus* in genere longissimus, mollis, involucro æqualis; *exterior* inæqualis, setiformis, versus peripheriam decrescens; *interior* e paleis angustis constans linearibus apice dentatis.

a. Involucrum.
b. Squama ejusdem intermedia.
c. Una e squamis involucri intimis.
d. Flosculus radii.
e. Flosculus disci, cum ovario suo.



Centaurea aciculare.

Centaurea eryngioides.



Centaurea parviflora.

TABULA 912.

CENTAUREA PARVIFLORA.

Centaurea caule erecto paniculato et divaricato-ramoso, foliis canescentibus radicalibus petiolatis bipinnatifidis caulinis pinnatifidis superioribus lineari-lanceolatis dentatis aut integris, capitulis ebracteatis, involucri ovato-oblongi squamis pallidis patulis pectinatis spinosis, pappo nullo.

C. parviflora. *Prodr. v.* 2. 203. *Bieb. Taur. Cauc. No.* 1825. nec *Desfont.*

C. diffusa. *Lam. Dict. v.* 1. 675. *De Cand. Prodr. v.* 6. 586.

Carduus orientalis, calcitrapæ folio, flore minimo. *Tourn. Cor.* 31.

In Asiâ minore. ♃.

Caulis durus, bipedalis, erectus, et humilior decumbens, angulatus, pubescens; *ramis* divaricatis, intricatis, rigidis, monocephalis. *Folia* inferiora bipinnatifida in exemplaribus herbarii Sibthorpiani periêre; *ramorum* linearia, sessilia, acuta, scabra, amplexicaulia, summis proximè sub capitulis. *Capitula* parva, ovata; *flosculis* albidis, involucri longitudine, radii deflexis. *Involucrum* 4 lineas longum; *squamis* corneis, appressis, pallidis, glabris, pectinatis, apice spinosis recurvis. *Ovarium* levitèr pubescens, calvum.

a. A. Involucrum, magnitudine naturali, et auctum.
c. C. Flosculus radii;
e. E. Achænium, magnitudine naturali, et auctum.
B. Ejusdem squama, magnitudine aucta.
d. D. disci, magnitudine naturali, et auctus.
f. Receptaculum.

TABULA 913.

CENTAUREA ERYNGIOIDES.

Centaurea arachnoideo-incana, caule ascendente apice semel ramoso, foliis radicalibus petiolatis pinnatis laciniis superioribus pinnatifido-incisis: caulinis sessilibus, rameis integris, capitulis solitariis ebracteatis, involucri squamis ovatis acuminatis canaliculatis patentibus spinosis basi fimbriatis summis apice obtusis ciliato-incisis.

C. eryngioides. *Lam. Dict. v.* 1. 675. *Willd. Sp. Pl. v.* 2321. *De Cand. Prodr. v.* 6. 590. *No.* 136.

Carduus eryngioides, capite spinoso. *Alpin. Exot.* 158. *Tourn. Inst.* 441.

Prope Athenas. ♃.

Tota *herba* lanugine canescente arachnoideâ obducta. *Caulis* ascendens, pedalis vel

minor, angulatus, versus apicem flexuosus et in ramos paucos monocephalos divisus. *Folia radicalia* petiolata, *caulina* sessilia amplexicaulia; omnia oblongo-lanceolata, pinnata, laciniis lanceolatis, acutis, inferioribus minoribus integris, superioribus pinnatifido-incisis, sensìm versus apicem decrescentibus; *ramea* lanceolata, basi angustata, indivisa. *Capitula* facie Cardui Mariani, sed minora, pedunculata, ebracteata; *flosculis* purpureis, involucro vix duplò longioribus. *Involucrum* subrotundo-ovatum, glabrum, pollicem latum, basi squamulis in pedunculum descendentibus auctum; *squamæ mediæ* ovatæ, fimbriatæ, patentes, concavæ, in acumen spinosum canaliculatum extensæ; *supremæ* apice appendice rotundatâ, dilatatâ, ciliato-incisâ auctæ.

Plantam descripsi qualem in herbario Sibthorpiano et Baueri icone invenitur: forma Græca autem a Sinaicâ rupestri cl. Boveo inventâ notis pluribus discrepat; nempè staturâ rigidâ et humiliore, superficie lanatâ, necnon foliis multò brevioribus et latioribus. Easdem tamen species credo loco naturali et casu quodam mutatas.

a. Involucri pars, receptaculum floribus orbatum a latere ostendens. *b*. Flosculus radii.
c. Flosculus disci, cum ovario suo.

TABULA 914.

CENTAUREA COLLINA.

Centaurea caule erecto corymboso foliisque subasperis, foliis rigidis radicalibus pinnatifidis laciniis linearibus obtusis integris aut lobatis superioribus sessilibus summis linearibus integerrimis, involucri squamis margine pallidis fimbriatis in spinam erecto-patulam squamâ sæpiùs breviorem acuminatis.

C. collina. *Linn. Sp. Pl.* 1298. *Willd. Sp. Pl. v.* 3. 2322. *De Cand. Prodr. v.* 6. 588.
C. cicùtæfolia. *Horn. Hort. Hafn. v.* 2. 849. fide Candollii.
Calcitrapa collina. *Lam. Fl. Fr. v.* 2. 33.
Carduus luteus centauroides segetum. *Tourn. Inst.* 441.

In Peloponneso, et insulâ Cretâ? ♃.

Herba viridis, pubescens, scabra. *Caulis* erectus, angulatus, rigidus, apice tantum corymboso-ramosus. *Folia* rigida; *radicalia* petiolata, laxiùs villosa, altè pinnatifida, laciniis linearibus aut lineari-oblongis, obtusis, sæpiùs integerrimis, nunc bilobis, nullis minoribus interjectis; *caulina* similia, sessilia, gradatìm apicem versus minùs divisa, denique juxta capitula integerrima. *Capitula* solitaria, pedunculata, ovata, glabra; *flosculis* luteis, duplò longioribus, omnibus quinquefidis. *Involucrum* ultra pollicem longum; *squamæ* atro-virides, oblongæ, obtusæ, margine pallido, inciso, in spinam patulam v. squarrosam, nunc squamâ breviorem, nunc longiorem, producto; *intimæ* appendice membranaceâ, subrotundâ, ciliatâ auctæ.



Centaurea collina.

Centaurea rutifolia.

Centaurea rupestris.

Variat involucri spinarum longitudine, quæ nunc rigidæ erectæ squamas adæquant, nunc debiliores abbreviantur, nunc elongatæ faciem *C. eryngioidis* induunt. Staturam quoque parùm certam invenio; in humilibus folia duplò latiora et breviora.

a. b. c. d. Involucri squamæ variæ.
e. Flosculus radii.
f. Flosculus disci.
g. Receptaculum.

TABULA 915.

CENTAUREA RUPESTRIS.

Centaurea caule decumbente basi tantùm ramoso, foliis rigidis inferioribus petiolatis laciniis linearibus apice spinulosis summis sessilibus, capitulis pedunculatis, involucri glabri squamis ovatis acutissimis appressis apice sphacelatis margine fimbriatis scariosis.

C. rupestris. *Linn. Sp. Pl.* 1298. *Willd. Sp. Pl. v.* 3. 2322. *De Cand. Prodr. v.* 6. 588. *No.* 122.

C. arachnoidea. *Vivian. Ann. Bot. v.* 1. 2. 185.

In monte Athô. ♃.

Herba lanugine laxâ deciduâ vestita. *Caulis* decumbens, angulatus, pennæ corvinæ crassitie, basi tantùm in ramos longos, simplices, apice nudos monocephalos, divisus. *Folia* longè petiolata, rigida, pinnata; *laciniis* linearibus apice spinulosis, terminali infimorum lanceolatâ grossè dentatâ; *summa* sæpiùs pinnatifida, nunc simplicia, a capitulo distantia. *Capitula* subrotundo-ovata, solitaria, ascendentia; *flosculis* aureis, involucri duplò longioribus, radii trifidis. *Involucrum* semipollicem longum; *squamis* ovatis, acutissimis, glabris, apice sphacelatis, margine pallidis, scariosis, fimbriatis; *intimis* apice membranaceis, dilatatis, fuscis, incisis. *Achænia* lævia; *pappo* brevi, fusco.

a. b. c. Involucri squamæ.
d. D. Flosculus radii, magnitudine naturali, et auctus.
e. E. Flosculus disci.
f. F. Achænium maturum, magnitudine naturali, et auctum.

TABULA 916.

CENTAUREA RUTIFOLIA.

Centaurea caulibus erectis paniculatis foliisque utrinque incanis densè tomentosis, foliis inferioribus sessilibus pinnatis, laciniis pinnatifidis lobis inæqualibus obtusis, summis

indivisis, capitulis ad apices ramorum 2—4 foliis floralibus involucratis, involucri ovati squamis dorso striatis supernè brevitèr ciliatis apice mucronatis, pappo fructu breviore.

C. rutifolia. *Prodr. v.* 2. 205. *De Cand. Prodr. v.* 6. 602. *No.* 217.

C. pannosa. *De Cand. l. c. v.* 6. 582. *No.* 90.

Circa Byzantium. ♃.

Herba lanugine densissimâ cinereâ undique obducta. *Caulis* erectus, 2—3-pedalis, angulatus, corymboso-ramosus; *ramis* simplicibus, vel sæpiùs apice divisis. *Folia* mollia, formâ varia, laciniis obtusis; *radicalia* petiolata, lyrata, laciniâ terminali spathulatâ margine hic illic grossè dentata; *inferiora* sessilia, pinnata, laciniis pinnatifidis, lobis valdè inæqualibus, infimo haud rarò proximo superiore majore; *superiora* pinnatifida, amplexicaulia, lobo ultimo lateralibus triplò longiore; *ramea* oblongo-linearia, patula, integerrima. *Capitula* foliis summis involucrata, ideòque sessilia; *flosculis* pallidè carneis, laxè patulis. *Involucrum* ovatum, semunciam longum, junius lanatum, maturum glabratum; *squamis* ovatis, dorso striatis, arctè imbricatis, fimbriatis, apice spinâ brevi mucronatis, intimis linearibus apice ciliatis. *Achænium* olivaceum, pubescens; *pappo* brevi, candido, inæquali, basi sordido.

a. Involucrum. *b*. Flosculus radii. *c*. Flosculus disci, cum ovario suo.

TABULA 917.

CENTAUREA RAPHANINA.

Centaurea calycibus ciliatis spinosis, foliis sublyratis petiolatis nudis margine scabris, floribus radicalibus subsessilibus. *Prodr. v.* 2. 205.

C. raphanina. *De Cand. Prodr. v.* 6. 591. *No.* 144.

In Cretæ montibus Sphacioticis. ♃.

Radix fusiformis, crassa. *Flores* sæpiùs bini, pallidè purpurei; *flosculis* marginalibus pulchrè sanguineo-venosis. *J. E. Smith.*

Hujus varietas, subcaulescens et integrifolia, est Jacea cretica saxatilis, glasti folio, flore purpurascente, *Tourn. Cor.* 31, ex auctoris herbario. *J. E. Smith.*

Deest in herbario Sibthorpiano.

a. Involucrum. *b*. *c*. *d*. Ejusdem squamæ.
e. E. Flosculus radii; *f*. F. disci; magnitudine naturali, et auctus.
g. G. Achænium maturum, magnitudine naturali, et auctum. *h*. Receptaculum.

Centaurea raphanina.



Centaurea galactites



Centaurea pumila.

****** *Involucri spinis simplicibus*, Crocodiloidea.

TABULA 918.

CENTAUREA PUMILA.

Centaurea caule brevissimo tomentoso, foliis pinnatis suprà incanis subtùs tomentosis: lobis inæqualibus angulatis petiolatis terminali rhomboideo-cordato subdentato, capitulis pedunculatis, involucri oblongi squamis glabris margine integris argenteis scariosis apice spinâ simplici terminatis.

C. pumila. *Linn. Sp. Pl.* 1300. *Willd. Sp. Pl. v.* 3. 2326. *De Cand. Prodr. v.* 6. 591. *No.* 142. *Vent. Hort. Malm. t.* 9.

C. mucronata. *Forsk. Fl. Ægypt. Arab.* 151.

Prope Athenas. ♃.

Radix lignosa, perpendicularis, nodosa. *Caulis* tomentosus, sæpiùs brevissimus, nunc palmaris. *Folia* omnia radicalia, petiolata, tomentosa, suprà cæsia, subtùs incana, pinnata, laciniis valdè inæqualibus, subrhombeis, angulatis; terminali multò majore, cordatâ, subhastatâ, rhomboideâ, imò lanceolatâ. *Capitula* oblonga, in pedunculis tomentosis elevata, unciam longa; *flosculis* pallidè purpureis, radiantibus ampliatis. *Involucrum* glabrum, basi obtusissimum; *squamis* viridibus, margine integro argenteo scarioso cinctis; *infimis* rotundatis, muticis; *intermediis* ovatis spinulâ mucronatis; *intimis* apice dilatatis, membranaceis, submuticis. *Ovarium* sericeo-villosum; *pappo* longo, tenui, molli, piloso, inæquali.

a. Involucrum. *b. c.* Ejusdem squamæ. *d.* Flosculus radii. *e.* Flosculus disci.

TABULA 919.

CENTAUREA GALACTITES.

Centaurea involucris setaceo-spinosis, foliis decurrentibus sinuatis spinosis subtùs tomentosis, pappo deciduo plumoso, staminibus monadelphis.

C. Galactites. *Linn. Sp. Pl.* 1300. *Desf. Fl. Atl. v.* 2. 303. *Willd. Sp. Pl. v.* 3. 2327.

Galactites tomentosa. *Mœnch. Meth.* 558. *De Cand. Prodr. v.* 6. 616.

Calcitrapa Galactites. *Lam. Fl. Fr. v.* 2. 30.

Carduus Galactites. *Tourn. Inst.* 441.

In Peloponneso, et Archipelagi insulis, haud infrequens. ♃.

Deest in Herbario.

a. b. c. d. e. Involucri squamæ. *f.* Flosculus radii. *g.* Flosculus disci, cum ovario suo. *h.* Stylus, cum staminibus monadelphis.

IV. POLYGAMIA NECESSARIA.

CALENDULA.

Linn. Gen. Pl. 446. *Juss. Gen. Pl.* 183. *Gærtn. t.* 168. *De Cand. Prodr. v.* 6. 451.

Receptaculum nudum. *Pappus* nullus. *Involucrum* polyphyllum æquale. *Achænia* disci membranacea.

TABULA 920.

CALENDULA ARVENSIS.

Calendula foliis pubescentibus subdentatis imis oblongo-subspathulatis superioribus cordato-lanceolatis amplexicaulibus, achæniis omnibus arcuatis marginalibus involucro duplò longioribus dorso longè echinatis apice rostratis: interioribus marginatis annularibus dorso muricatis.

C. arvensis. *Linn. Sp. Pl.* 1303. *Willd. Sp. Pl. v.* 3. 2339. *De Cand. Prodr. v.* 6. 452.
Caltha arvensis. *Tourn. Inst.* 499.

In arvis et ruderatis Græciæ et Archipelagi frequens. ☉.

Caulis pubescens, staturâ varius, nunc sesquipedalis, ramosus, diffusus, nunc pollicaris simplicissimus. *Folia radicalia* lanceolata, basi angustata, subdentata, imò sinuata, pubescentia, scabra; *caulina* sessilia, amplexicaulia, oblongo-linearia. *Capitula* solitaria, pedunculata, ebracteata. *Involucrum* pubescens, subæquale; *squamis* herbaceis, linearibus, biserialibus, exterioribus paululùm longioribus. *Flosculi radii* 12—13, ligulati, tridentati, involucro duplo longiores, fœminei, *stylo* bipartito, *ovario* arcuato, dorso muricato, apice setis quibusdam brevibus coronato; *disci* masculi, tubulosi, 5-dentati, *ovario* effœto, calvo. *Achænia* involucro reflexo longiora, dorso muricata et glandulosa; *exteriora* in rostrum apice lacerum producta; *proxima* circularia, marginata.

a. A. Flosculus radii; *b*. B. disci, magnitudine naturali, et auctus.
C. Receptaculum, involucro reflexo, achænio unico tantùm in situ suo remanente.
d. Achænium marginale seorsìm.

Calendula arvensis.



Filago exigua.



Filago pygmaea.

FILAGO.

Linn. Gen. Pl. 450. *Juss. Gen. Pl.* 179. *Willd. Sp. Pl. v.* 3. 2387.

Evax. *Gærtn. t.* 165. *De Cand. Prodr. v.* 5. 458.

Receptaculum paleaceum. *Pappus* nullus. *Involucrum* imbricatum. *Flosculi* fœminei inter squamas involucri locati.

TABULA 921.

FILAGO PYGMÆA.

Filago foliis floralibus obovatis obtusis, involucri squamis acuminatis glabris.

F. pygmæa. *Linn. Sp. Pl.* 1311. *Willd. Sp. Pl. v.* 3. 2357.

F. acaulis. *All. Fl. Ped. n.* 620.

Gnaphalium pygmæum. *Lam. Dict. v.* 2. 761.

Evax umbellata. *Gærtn. Fr. v.* 2. 393. *t.* 165.

Evax pygmæa. *Pers. Synops. v.* 2. 422. *De Cand. Prodr. v.* 5. 458.

Micropus pygmæus. *Desf. Fl. Atl. v.* 2. 307.

Filago maritima, capite folioso. *Tourn. Inst.* 454.

In Archipelagi insulis; necnon in agro Eliensi et Messeniaco. ⊙.

In Herbario deest.

a. Capitulum. A. Idem, magnitudine auctum, foliolis involucri fœmineis, discoque masculo.
B. Unum ex involucri foliolis, flosculo fœmineo in gremio. *c.* C. Flosculus masculus disci.
d. D. Achænium.

TABULA 922.

FILAGO EXIGUA.

Filago foliis obovato-lanceolatis, involucro extùs lanato. *Prodr. v.* 2. 207.

Micropus exiguus. *D'Urv. Enum.* 109. *n.* 802.

Evax exigua. *De Cand. Prodr. v.* 5. 458.

In Archipelagi insulis, cum priore. ⊙.

Radix annua, gracilis, ramosa. *Caulis* uncialis, filiformis, a basi simplicitèr ramosus; *ramis* filiformibus, lanatis, discoloribus, aphyllis, apice glomerulos gerentibus. *Folia* cinerea, lanata, indivisa; *radicalia* spathulato-lanceolata, acuta; *floralia* capitula involucrantia, obtusa, lanâ immersa. *Capitula* in axillis foliorum floralium aggregata, subrotunda, foliis breviora, globosa, pisi minimi magnitudine. *Involucrum* imbricatum, polyphyllum; *squamis* lineari-lanceolatis, spinâ acuminatis, margine pallidis, intùs glabris, extùs villosissimis. *Flosculi* radii, tenuissimi, filiformes, pallidi, squamis breviores, fœminei; *disci* minimi, masculi, 4-dentati, nec, ut in icone nostrâ, 5-dentati; *ovario* effœto, calvo.

a. A. Involucrum. *b*. B. Ejusdem squamæ, cum flosculo radii;
c. C. Flosculus disci; omnes magnitudine naturali, et aucti.



Echinops sphaerocephalus.

SYNGENESIA POLYGAMIA SEGREGATA.

ECHINOPS.

Linn. Gen. Pl. 453. *Juss. Gen. Pl.* 175. *Gærtn. t.* 160.

Involucellum 1-florum. *Corollæ* tubulosæ, hermaphroditæ. *Receptaculum* setosum. *Pappus* obsoletus.

TABULA 923.

ECHINOPS SPHÆROCEPHALUS.

Echinops foliis bipinnatifidis spinosis suprà viscoso-pilosis subtùs incano-tomentosis: laciniis angustè triangularibus divaricatis, involucelli squamis filiformibus quam intimæ plus duplò brevioribus: mediis apice rhombeis serratis, intimis lineari-lanceolatis elongatis margine serrulatis.

E. sphærocephalus. *Linn. Sp. Pl.* 1314? *Willd. Sp. Pl. v.* 3. 2396?
E. viscosus. *De Cand. Prodr. v.* 6. 525.
E. spinosus. *D'Urvill. Enum. Pl. Or.* 113.
Echinopus major. *Tourn. Inst.* 463.
E. orientalis, cardui lanceolati folio, capite magno cœruleo. *Tourn. Cor.* 34?
Κροκοδείλιον *Diosc.*?

In Græciâ vulgaris. ♃.

Caulis erectus, subangulatus, purpureus, pilis crassis tortuosis viscosis patulis densè vestitus; ramis simplicibus monocephalis. *Folia* amplexicaulia, glanduloso-pilosa, viscosa, suprà viridia, subtùs incana, lanata, bipinnatifida; *laciniis* angustis, triangularibus, convexis, in spinam longam rigidam pallidam acuminatis. *Capitula* solitaria, sphærica, pedunculata. *Receptaculum* oblongum, areolatum, nudum. *Involucrum* reflexum; squamis spathulatis subpinnatifidis, apice acutis, incisis, corneis. *Flosculi* pallidè cyanei. *Involucelli* foliola extima piliformia; intermedia cuneata, elongata, apice acuta, spinuloso-serrata, in medio in spinam producta; intima lineari-lanceolata, acuminata, margine minutè denticulata. Cætera in exemplare solitario quod coràm est desunt.

a. b. Involucri squamæ.
c. Flosculus, involucello cinctus.
d. Flosculus involucelli orbatus.
e. Receptaculum, squamis extimis deflexis, alterâque abscissâ.

TABULA 924.

ECHINOPS SPINOSUS.

Echinops caule albo-lanato, foliis sessilibus amplexicaulibus pinnatifidis subtùs incano-tomentosis suprà glabriusculis: laciniis triangularibus spinosis incisis margine revolutis, involucelli squamis piliformibus intermediis æqualibus v. subnullis: mediis intimisque acuminatis ciliato-spinulosis dorso glabris.

E. spinosus. *Linn. Mantiss.* 119.? *Prodr. v.* 2. 209.

E. Ritro. *Willd. Sp. Pl. v.* 3. 2397. *De Cand. Prodr. v.* 6. 524.

Echinopus creticus, capite magno aculeato. *Tourn. Cor.* 34.

In Cypro et Archipelagi insulis. ♃.

Caulis erectus, albo-lanatus, angulatus. *Folia* sessilia, amplexicaulia, sinuato-pinnatifida, margine revoluta, suprà viridia, glabriuscula, subtùs lanata, incana; *laciniis* spinosis, dentatis, lobis inferioribus reflexis sæpè dentiformibus. *Involucri* squamæ reflexæ, lineares, apice dilatatæ, cuneatæ, laceræ. *Involucelli* squamæ piliformes intermediarum longitudine, sæpè ferè deficientes; intermediæ spathulatæ, apice rhombeæ, acutæ, corneæ, margine obsoletè denticulatæ; intimæ ultimis duplò longiores, lineari-lanceolatæ, canaliculatæ, acuminatæ, basi serrulatæ. *Flosculi* albi.

Hanc inter speciem et *Echinopem Ritro* auctorum nullum verum invenio discrimen. In icone equidèm capitula solito majora depinguntur; sed, quantùm ex herbarii fragmentis dijudicare licet, a formâ vulgari vix diversa sunt.

a. Flosculus, involucello cinctus.
b. c. d. Involucelli squamæ.
e. Flosculus, involucello dempto.
f. Involucellum maturum, defloratum.

TABULA 925.

ECHINOPS LANUGINOSUS.

Echinops foliis pinnatifidis utrinque cauleque arachnoideis: laciniis lanceolatis subincisis ciliato-spinulosis, involucelli squamis piliformibus brevissimis mediis inciso-serratis intimis serrato-ciliatis dorso villosis.

E. lanuginosus. *Herb. Sibth.*

E. microcephalus. *Prodr. v.* 2. 209. *De Cand. Prodr. v.* 6. 523.

Circa Byzantium. ♃.

Caulis ramosissimus, angulatus, pilis longis mollibus villosus, ad apices ramorum usque



Echinops spinosus.

Echinops sanguinosus.



Echinops tenuissimus

foliatus. *Folia* villosa, subtùs densiùs, amplexicaulia, pinnatifida, viridia; *laciniis* planis, incisis, apice spinâ gracili armatis et ciliato-spinulosis. *Capitula* in genere parva, pallidè cyanea, sessilia. *Involucri* foliola oblanceolata, incisa, apice spinosa. *Involucelli* pentagoni *squamæ* piliformes, brevissimæ et solito latiores, reliquæ imbricatæ, gradatìm longiores, acuminatæ, margine pectinatæ.

a. A. Involucellum, magnitudine naturali, et auctum. B. C. D. E. Involucelli squamæ, auctæ.
f. Flosculus. *g*. Pedunculi apex, cum receptaculo et involucro reflexo.

TABULA 926.

ECHINOPS TENUISSIMUS.

Echinops foliis bipinnatifidis suprà glabriusculis subtùs incano-tomentosis: laciniis linearibus rigidis spinosis margine revolutis spinoso-denticulatis, involucelli squamis exterioribus planis abbreviatis: cæteris serrato-ciliatis, intimis in tubum pentagonum concretis.

E. tenuissimus. *Herb. Sibth.*

E. lanuginosus. *Prodr. v. 2. 209. Lam. Dict. v. 2. 336. Ic. t. 79. f. 2. Willd. Sp. Pl. v. 3. 2398.*

E. græcus. *Mill. Dict. v. 3. De Cand. Prodr. v. 6. 526.*

Echinopus græcus, tenuissimè divisus et lanuginosus, capite minori cæruleo. *Tourn. Cor. 34.*

Ἄκανθα λευκὴ *Diosc.?*

Circa Athenas. 2/

Caulis erectus, villosissimus, ramosissimus, foliis ad ramorum apicem usque densè tectus. *Folia* cinerea, sessilia, amplexicaulia, bipinnatifida; *laciniis* linearibus, tenuibus, spinosis, margine revolutis, denticulatis, suprà pilosis, subtùs incano-tomentosis. *Capitula* sessilia, cærulea, solitaria. *Involucri* foliola linearia, acuminata, spinosa, basi latiora, margine pectinata, aut spinoso-dentata. *Involucelli* squamæ angustissimæ, spathulatæ, acutæ, breves, mox in majores carinatas serratas incisasque transeuntes; interiores lanceolatæ, semipinnatifidæ, spinosæ; intimæ in tubum concretæ, intùs discolorem, ovarium arctè cingentem.

a. Involucellum cum flosculo. *b. c*. Ejusdem squamæ.
d. Flosculus seorsìm. *e*. Involucrum reflexum, cum receptaculo flosculis orbato.

GYNANDRIA MONANDRIA.

* Anthera adnata, subterminalis.

ORCHIS.

Linn. Gen. Pl. 461. *Juss. Gen. Pl.* 65.

Perianthium pentaphyllum, sepalo superiore fornicato. *Labellum* basi subtùs calcaratum. *Anthera* terminalis adnata.

TABULA 927.

ORCHIS UNDULATIFOLIA.

Orchis foliis oblongo-lanceolatis undulatis obtusis, spicâ crassâ subcorymbosâ, sepalis acuminatis, labello calcare pendulo incurvo triplò longiore : laciniis omnibus linearibus acuminatis, bracteis brevissimis. *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 273.

O. undulatifolia. *Bivon. Bernard. Sic. cent.* 2. 44. *t.* 6.

O. tephrosanthos, β. undulatifolia. *Bot. Reg. t.* 375.

O. tephrosanthos. *Desfont. Fl. Atl. v.* 2. 318.

Οὐρὰ τῦ ἀλεπῦ *hodiè apud Cyprios.*

Σαρκινοβοτάνι *Messeniensium.*

In Caramaniâ, agro Messeniaco, et insulâ Cypro, haud infrequens. 2.

Radix e tuberculis duobus constans ovalibus, indivisis, et fibris pluribus simplicibus carnosis intermixtis. *Caulis* erectus, pedalis ad sesquipedalem, basi foliatus, sursùm vaginis foliaceis cinctus, apice nudus. *Folia* plura, erecto-patula, oblonga, obtusa, undulata, caule multò breviora. *Racemus* densus, pyramidatus, 1—2-pollices longus. *Flores* rosei. *Sepala* ovata, acuta, striata, erecto-patula; postico minore. *Petala* obtusa, sepalis multò minora, supra antheram conniventia. *Labellum* dependens, oblongum, 5-fidum, medio album, sanguineo-punctatum, pubescens; *laciniis* linearibus, duabus lateralibus, tribusque terminalibus, quarum intermedia minor, subulata; *calcare* limbo breviore, recto, obtuso, pendulo, apice emarginato.

a. Flos integer, a fronte visus.

b. Flos a latere visus, sepalis petalisque abscissis.

Orchis undulatifolia.

Orchis papilionacea.

TABULA 928.

ORCHIS PAPILIONACEA.

Orchis scapo basi præcipuè folioso, foliis lineari-lanceolatis acutis arctè vaginatis, sepalis oblongis acutis, labello crenulato unguiculato calcari conico incurvo pendulo æquali.
Lindl. Gen. et Sp. Orchid. 266.
O. papilionacea. *Prodr. v.* 2. 213. nec Linnæi. *Bot. Reg. t.* 1155.
O. rubra. *Jacq. Ic. Rar. v.* 1. *t.* 183. *Willd. Sp. Pl. v.* 4. 24.
O. expansa. *Tenore, Syllog.* 455.
O. orientalis et lusitanica, flore maximo, papilionem referente. *Tourn. Cor.* 30.
O. montana humilis, flore majore. *Buxb. Cent.* 3. 3. *t.* 3.
Ὄρχις *Dioscoridis.*
Σαρκινοβοτάνι *hodiè.*
Σαλέπι *vulgò.*

In saxosis et sabulosis Græciæ, ut a Dioscoride traditur, frequentissima. ♃.

Radix e tuberculis duobus sphæricis constans, et fibris pluribus carnosis simplicibus. *Caulis* palmaris, basi foliatus, supra folia vaginis duabus arctè appressis cinctus. *Folia* suberecta, tria inferiora lineari-lanceolata, canaliculata, duo superiora breviora et latiora. *Racemus* pauciflorus, laxus. *Bracteæ* magnæ, lanceolatæ, obtusiusculæ, erectæ, purpurascentes, ovario longiores. *Sepala* ovata, fusco-sanguinea, firma, obtusiuscula, cum petalis supra antheram conniventia. *Labellum* roseum, oblongum, indivisum, concavum, basi angustatum, margine crispum et crenulatum. *Calcar* teres, obtusum, pendulum, levitèr flexuosum, labelli longitudine.

a. Floris anthera et labellum, cum calcare suo.

OPHRYS.

Linn. Gen. Pl. 462. *Juss. Gen. Pl.* 65. *Brown. apud Ait. Hort. Kew. ed.* 2. *v.* 5. 195.

Perianthium pentapetalum, patens. *Labellum* e basi columnæ, ecalcaratum, patens. *Anthera* terminalis adnata.

TABULA 929.

OPHRYS TENTHREDINIFERA.

Ophrys labello integerrimo subquadrato cuneato villoso appendiculato basi auriculato cornuto sub apice barbato disco glabro: appendice inflexâ, petalis ovatis acutis tomentosis, bracteis florum longitudine. *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 376.

O. tenthredinifera. *Willd. Sp. Pl. v.* 4. 67. *Bivon. Bernard. Sic. cent.* 2. 39. *t.* 4. *Bot. Reg. t.* 205. 1093. *Bot. Mag. t.* 1093.

O. villosa. *Desfont. in Ann. Mus. v.* 10. 225. *t.* 14.

O. grandiflora. *Tenore, Append. Alt.* 83. *Fl. Napolit. t.* 94.

Orchis orientalis, calyptrâ purpureâ, petalo inferiori atro-purpurascente, scuto ferri equini formâ. *Tourn. Cor.* 30.?

In insulâ Cypro. ♃.

Speciei hujus pulcherrimæ nihil in herbario restat nisi fragmenta quædam vermibus erosa. Tubercula radicum tomento induuntur.

TABULA 930.

OPHRYS FUSCA.

Ophrys labello mutico velutino oblongo trilobo: lobis lateralibus nanis intermedio emarginato, petalis glabris. *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 373.

O. fusca. *Link, in Schrad. Diar. Bot.* 1799. *v.* 2. 324. *Willd. Sp. Pl. v.* 4. 69. *Tenore, Fl. Napolit. v.* 2. 303. *t.* 92.

O. lutea. *Bivon. Bernard. Sic. cent.* 2. 41. *t.* 5.

Orchis fucum referens, flore subvirente. *Tourn. Inst.* 434.

Ophrys tenthredinifera.

Ophrys fusca.

Serapias Lingua.

O. serapias secundus minor. *Dod. Pempt.* 238.

In agro Messeniaco et Argolico. ♃.

Ex herbario Sibthorpiano amissa est species, præcedenti similis, sed sepalorum et petalorum colore, labelli figurâ et glabritie majore, satis diversa.

A. Anthera a fronte visa, cum stigmate suo excavato, et petalis duobus, magnitudine aucta.
B. Eadem, a latere.

SERAPIAS.

Linn. Gen. Pl. 462. *Juss. Gen. Pl.* 65. *Brown. apud Ait. Hort. Kew. ed.* 2. *v.* 5. 194.

Perianthium connivens. *Labellum* ecalcaratum; basi concavum; lobo terminali maximo, dependente, indiviso.

TABULA 931.

SERAPIAS LINGUA.

Serapias labello ovato-lanceolato, epichilio basi pubescente, bracteis floribus brevioribus. *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 377.

S. Lingua. *Linn. Sp. Pl.* 1344. *Willd. Sp. Pl. v.* 4. 70. *Hooker, Exot. Fl. t.* 11.

Helleborine Lingua. *Pers. Synops. v.* 2. 512.

Orchis montana italica, linguâ oblongâ, altera. *Tourn. Inst.* 434.

Λόγχιτις *Dioscoridis.*

In apricis montibus Græciæ, necnon in Zacyntho insulâ. ♃.

Tubercula radicis subrotunda, integerrima, per collum elongatum cum caulis basi connata. *Caulis* palmaris ad pedalem, basi foliosus. *Folia* linearia, oblonga, canaliculata, obtusa, suberecta; scapo folium solitarium vaginans cucullatum in medio gerente. *Racemus* subspiralis, pauciflorus; *bracteis* oblongo-lanceolatis, canaliculatis, acuminatis, pallidè virentibus, margine et venis purpurascentibus, florum longitudine. *Flores* bilabiati. *Sepala* ovato-lanceolata, acuminata, bractearum colore, supra columnam in galeam conniventia et agglutinata. *Petala* conformia, sepalis adhæ-

rentia, angustiora et magìs acuminata, serrata, basi subcarnosa. *Labellum* ovato-lanceolatum, basi caudatum, medio pilis longis articulatis villosum, constrictum, et quasi bipartitum ; *hypochilio* petalis breviore, cucullato, basi bilamellato, marginibus rotundatis atropurpureis ; *epichilio* lanceolato, pendulo, sepalis multò longiore. *Columna* acuminata, lamellis longior, apice virecens.

a. Labelli facies, hypochilii marginibus vi deflexis, columnam et lamellas ostendentibus.
b. Labellum a latere, partibus suis in situ naturali.

TABULA 932.

SERAPIAS CORDIGERA.

Serapias labello cordato-ovato glanduloso-piloso, floribus congestis bractearum longitudine.
Lindl. Gen. et Sp. Orch. 377.

S. cordigera. *Linn. Sp. Pl.* 1345. *Willd. Sp. Pl. v.* 4. 71. *Bot. Repos. t.* 475.

Helleborine cordigera. *Sebast. et Maur. Prodr. Fl. Rom. t.* x.

Serapias ovalis. *L. C. Richard, Orch. Europ. Annot.* 32.

Orchis montana italica, flore ferrugineo, linguâ oblongâ. *Tourn. Inst.* 434.

Σατύριον ἐρυθρόνιον *Dioscoridis? Sibth.*

In apricis montibus Græciæ ; etiam inter Byzantium et pagum Belgrad. ♃.

Species pulcherrima, in herbario deficiens, *S. Linguæ* notis pluribus distincta ; præsertìm *caule* altiore et basi maculato, *bracteis* floribus brevioribus, *petalis* duplò minoribus, integerrimis, nec acuminatis serratis hypochilio longioribus, labelli denique pilis longioribus per totam partis mediæ superficiem ad marginem usque conspersis.

a. Labellum a fronte visum, cum petalis, lamellis et columnâ.
b. Labellum a latere, cum petalis.
c. Columna, cum labelli lamellis, verosimilitèr separabilibus.

Serapias cordigera.

Epipactis rubra.

** *Anthera terminalis opercularis.*

EPIPACTIS.

Brown apud Ait. Hort. Kew. ed. 2. v. 5. 201.

Serapias. *Gærtn. t. 14.*

Anthera persistens. *Labellum* infernè ventricosum, medio constrictum.

TABULA 933.

EPIPACTIS RUBRA.

Epipactis foliis lanceolatis horizontalibus, bracteis infimis flore longioribus, sepalis patentibus, petalis erectis conniventibus, labelli epichilio cordato-hastato acuminato venis elevatis cristato.

E. rubra. *Willd. Sp. Pl. v. 4. 86.*

E. purpurea. *Crantz. Stirp. Austr. 457.*

Serapias rubra. *Linn. Syst. Veg. ed. 14. 816. Eng. Bot. t. 437.*

Cephalanthera rubra. *Rich. Orch. Europ. Annot. 38.*

Helleborine montana angustifolia purpurascens. *Tourn. Inst. 436.*

In montis Parnassi sylvosis. ♃.

Radix fibrosa, repens. *Caulis* pedalis ad sesquipedalem, ascendens, striatus, basi glaber, sursùm pubescens. *Folia* ensiformia, canaliculata, horizontalia, glabra, striata, basi amplexicaulia; infima latiora, breviora, imò squamiformia, vaginantia. *Racemus* tomentosus, gracilis, multiflorus, quaquaversus; *bracteis* lineari-lanceolatis, acuminatis, foliaceis, pubescentibus; infimâ flore suo longiore, cæteris brevioribus, summis setaceis. *Ovarium* pedicellatum, tomentosum. *Flores* purpurei. *Sepala* lineari-lanceolata, basi æqualia, patentia, dorso pubentia. *Petala* conformia, erecta, supra columnam conniventia, apice patula. *Labellum* pallidius et minùs purpureo-marginatum; *hypochilio* basi saccato, erecto, columnâ breviore, angulis suis acutiusculis; *epichilio* cordato-hastato, acuminato, pendulo, undulato, venis cristatis. *Columna* libera, semiteres, erecta. *Anthera* oblonga, terminalis, opercularis, biloculares; *loculis* parallelis, approximatis, per medium lineâ elevatâ bipartitis. *Stigma* infundibulare, levitèr prominens.

a. Labellum et columna, a latere, sepalo dorsali remanente

b. Labellum et columna, obliquè a fronte visæ.

GYNANDRIA HEXANDRIA.

ARISTOLOCHIA.

Linn. Gen. Pl. 467. *Juss. Gen. Pl.* 73. *Gærtn. t.* 14.

Calyx tubulosus, ligulatus, basi ventricosus. *Corolla* 0. *Capsula* 6-locularis, polysperma, infera.

TABULA 934.

ARISTOLOCHIA SEMPERVIRENS.

Aristolochia foliis cordatis oblongis acuminatis coriaceis nitidis sempervirentibus, caule prostrato flexuoso subscandente, calyce incurvo infundibulari: limbo ovato acuto basi emarginato tubo breviore.

A. sempervirens. *Linn. Sp. Pl.* 1363. *Bot. Mag. t.* 1116. *Willd. Sp. Pl. v.* 4. 158.

Pistolochia cretica. *Bauh. Pin.* 307.

A. Pistolochia altera. *Tourn. Inst.* 162.

Pistolochia altera. *Clus. Hist. v.* 2. 260.

In insulâ Cretâ, ad sepes. ♃.

Caulis debilis, filiformis, angulatus, pallidè viridis, scandens, glaberrimus. *Folia* subcoriacea, nitida, glaberrima, sempervirentia, utrinque atro-viridia, cordata, sinu rotundato, acuminata; *petiolo* laminâ duplò breviore. *Flores* solitarii, axillares, nutantes, pedunculo apice decurvo petiolo longiore. *Calyx* sesquipollicaris, lutescens, purpureo-vittatus et limbatus, basi ovatus, ventricosus, angularis, tubo incurvo, apice in limbum ovatum, obliquum, apiculatum, basi emarginatum, tubo multò breviorem dilatato, intùs hirsuto, basi imâ atropurpureo. *Columna* brevis, sexdentata; *antheris* totidem, subrotundis, distantibus, dentibus oppositis.

Cum hac specie Aristolochiam glaucam, *Desfont. Atlant. t.* 252, et *Curt. Mag. t.* 1115, proculdubiò confudit Linnæus. *J. E. Smith.*

a. Flos, longitudinalitèr sectus, partes interiores ostendens.
B. Ovarium, cum columnâ stamineâ, magnitudine auctum.

B

a

Aristolochia sempervirens.

Aristolochia pallida.



Aristolochia parvifolia.

TABULA 935.

ARISTOLOCHIA PARVIFOLIA.

Aristolochia foliis cordatis obtusis emarginatis glaberrimis, caulibus decumbentibus flexuosis, calycis labio elongato torto. *Prodr. v. 2. 222.*

Aristolochia longa, folio minori subrotundo, flore tenuissimo. *Tourn. Cor.* 8, ex charactere.

A. Clematitis, No. 5. *Wheler, It.* 414, *cum ic.*

Ἀριστολόχια μακρὰ *Dioscoridis.*

Circa Athenas vulgaris; sed infrequens per totam Græciam. ♃.

Radix fusiformis, longa. *Caulis* debilis, prostratus, vix ultra pedem longus, angulatus, glaberrimus, pallidè viridis, flexuosus. *Folia* cordata, obtusa, magnitudine et formâ varia, glaberrima, subtùs glauca, venis elevatis reticulata, petiolis suis longiora, nunc subrotunda semipollicaria, nunc pollicaria basi dilatata. *Flores* solitarii, axillares; *pedunculo* ovarioque decurvis petiolo longioribus. *Calyx* fuscus, duos ferè pollices longus, gracilis, basi ventricosus; *tubo* arcuato, apice paululùm dilatato, intùs hirsuto; *limbo* lineari, acuto, plano, flexuoso, tubo duplò longiore, basi venoso, dilatato. *Columna* sexdentata, in cavitate atropurpureâ abscondita, *antheris* oblongis, approximatis. *Capsula* ficûs parvæ magnitudine et facie, virescens, purpureo-vittata; *pericarpio* coriaceo, sexvalvi; *seminibus* atris compressis, crassis, verrucosis, hinc sulcatis.

a. Flos integer. *b.* Ejusdem pars inferior, per longitudinem divisa.
C. Ovarium, cum columnâ stamineâ, magnitudine auctum.
d. Capsula, adhùc indehiscens.

TABULA 936.

ARISTOLOCHIA PALLIDA.

Aristolochia foliis subrotundo-reniformibus obtusissimis petiolatis: lobis divaricatis, caule erectiusculo flexuoso, pedunculis solitariis unifloris, calycibus erectis: limbo linguiformi obtuso tubo quatèr breviore.

A. pallida. *Willd. Sp. Pl. v.* 4. 162. *Waldst. et Kit. Pl. Hungar. v.* 3. *t.* 240.

A. rotunda β. *Linn. Sp. Pl.* 1364.

A. rotunda, flore ex albo purpurascente. *Tourn. Inst.* 162.

A. rotunda altera. *Clus. Hist. v.* 2. 70.

Ἀριστολόχια στρογγύλη *Dioscoridis.*

In sylvis et umbrosis Græciæ. ♃.

Radix rotunda, carnosa. *Caules* erecti, v. prostrati, flexuosi, pedales ad sesquipedales, angulati, levissimè pubescentes. *Folia* glaucescentia, sesquipollicem longa, subrotundo-reniformia, obtusissima, sinubus baseos latis rotundatis, petiolis suis duplò longiora, utrinque pilis minutissimis pubentia. *Flores* ferè 2-pollicares, erecti, solitarii, axillares, ovario quam petiolus longiore. *Calyx* viridis, rectus, basi conicus inflatus; *tubo* clavato, intùs glabro et purpureo vittato, apice constricto; *limbo* linguiformi, obtuso, apice unicolori, tubo quatèr breviore, nunc erecto, nunc inflexo. *Columna* alba, sexdentata, medio stigmate purpureo umbonata; *antheris* cuique denti oppositis, oblongis, loculis sejunctis. *Capsula* immatura viridis, obovata, ficûs facie, pendula.

a. Flos, per longitudinem sectus. B. Columna staminea, magnitudine aucta.

TABULA 937.

ARISTOLOCHIA HIRTA.

Aristolochia foliis sinu lato auriculato-cordatis oblongis obtusis pubescentibus petiolatis, caule erecto hirto, pedunculis solitariis unifloris, calyce in seipsum reflexo: limbo dilatato concavo cordato apiculato hirsuto.

A. hirta. *Linn. Sp. Pl.* 1365. *Willd. Sp. Pl. v.* 4. 163.

Aristolochia longa subhirsuta, folio oblongo, flore maximo. *Tourn. Cor.* 8. *voy. v.* 1. 147. *cum icone.*

In insulâ Cypro. ♃.

Caulis pedalis et ultrà, pilosus, erectus, teres, simplex; junior hirsutior. *Folia* petiolata, hirsuta, sinu lato cordata, acuminata, obtusa, 2—3-pollices longa, atro-viridia, rugosa, subtùs venis elevatis pallida et hirsutiora; lobis lateralibus dilatatis, rotundatis. *Flores* in foliorum inferiorum axillis solitarii, pedunculo piloso deflexo penduli. *Ovarium* teretiusculum, angulatum, hirsutum, pedunculo duplò brevius. *Calyx* hirsutus, fusco-castaneus, sigmoideus, in seipsum recurvus; *tubo* ferè 3-unciali, hexangulari, basi ventricoso, subconico, olivaceo, intùs atropurpureo villoso; *limbo* dilatato, obliquo, cordato, apiculato, 2 pollices lato, atropurpureo, villosissimo. *Stamina* 6, in columnam capitatam, truncatam, sexcrenatam, pallidè flavam connata; *antheris* totidem, bilocularibus; lobis linearibus, basi divergentibus, columnæ faciebus adnatis. *Stigma* verticale, sexradiatum, planum; *radiis* columnæ crenis oppositis. *Capsula* (ex icone) subrotundo-oblonga, hirsuta, castanea, 2 pollices longa.

Staturâ variat, caule nunc palmari, nunc sesquipedali, foliis floribusque multò minoribus.

a. Flos integer, longitudinalitèr divisus, partes interiores ostendens.
B. Columna staminea, cum stigmate verticali sexradiato, magnitudine aucta
C. Capsula.



Aristolochia hirta.

Cytinus Hypocistis.

GYNANDRIA OCTANDRIA.

CYTINUS.

Linn. Gen. Pl. 566. *Juss. Gen. Pl.* 73.

Hypocistis. *Tourn. t.* 477.

Flores monoici. *Calyx* campanulatus, 4-fidus. *Corolla* 0. *Filamenta* connata; *antheræ* 8, biloculares. *Stylus* 1. *Stigma* capitatum, 8-sulcatum. *Bacca* 8-locularis, polysperma.

TABULA 938.

CYTINUS HYPOCISTIS.

Cytinus Hypocistis. *Linn. Syst. Nat. ed.* 12. *v.* 2. 602. *Cav. ic.* 2. 55. *t.* 171. *Desf. Fl. Atl. v.* 2. 326. *Tenore, Giorn. Encic. di Napol. v.* 1. 16. *cum ic. Brongniart in Ann. Sc. v.* 1. 29. *t.* 4.

Asarum Hypocistis. *Linn. Sp. Pl.* 633.

Asarum aphyllum squamosum. *Sauvag. Monsp.* 4.

Hypocistis flore luteo. *Tourn. Cor.* 46.

Ὑποκιστὶς *Dioscoridis.*

Ad Cistorum fruticosorum radices, in Græciâ et insulâ Cretâ. ♃.

Deest in Herbario.

a. Una e squamis, foliorum loco caulem vestientibus.
b. Flos masculus integer, bracteis binis oppositis suffultus.
c. Floris masculi integri pars, limbi laciniis tribus bracteisque abscissis, columnam stamineam ostendens.
D. Calycis masculi tubus, cum columnâ stamineâ, magnitudine auctus.

MONŒCIA PENTANDRIA.

MOMORDICA.

Linn. Gen. Pl. 506. *Juss. Gen. Pl.* 395. *Gærtn. t.* 88.

Masculi. *Calyx* 5-fidus. *Corolla* 5-partita. *Filamenta* 3.

Fœminei. *Calyx* 5-fidus. *Corolla* 5-partita. *Stylus* trifidus. *Pepo* elasticè dissiliens.

TABULA 939.

MOMORDICA ELATERIUM.

Momordica peponibus ellipticis hirsutis pedunculum vi expellentibus, foliis cordatis hispidis obtusis angulatis dentatis, caule cirrhis nullis.

M. Elaterium. *Linn. Sp. Pl.* 1434. *Willd. Sp. Pl. v.* 4. 605. *Curt. Mag. t.* 1914. *De Cand. Prodr. v.* 3. 311.

Elaterium cordifolium. *Mœnch. Meth.* 563.

Ecbalium officinale. *Nees et Ebermaier, Handb. der Off. Pfl. v.* 3. 101.

Cucumis sylvestris asininus dictus. *Tourn. Inst.* 104.

Σίκυς ἄγριος *Dioscoridis.*

Ἀγριαγκουριὰ *hodiè.*

In ruderatis ad pagos, Græciæ et Archipelagi, vulgaris. ⊙.

Caulis prostratus, hispidus, teres, carnosus; internodiis foliis brevioribus. *Folia* hispida, sinu lato cordata, angulata, sæpè subhastata, dentata, suprà rugosa, subtùs cinerea, venis elevatis scabris. *Flores fœminei* solitarii, axillares, erecti, pedunculo petiolis breviore; *masculi* corymbo denso paucifloro pedunculato congesti. *Sepala* viridia, linearia, acuminata, hispida. *Corolla* viridi-straminea, campanulata, venis viridibus picta; *limbo* patulo, 5-partito. *Stamina* 3, distincta; *antherarum* lobis connectivo carnoso tenui sejunctis, reniformibus, aurantiacis. *Stigmata* 3, linearià, acuta, bis bifida. *Ovarium* ovale, pilis adpressis hispidum. *Pepo* pendulus, virescens, pilis rigidis hispidus, sesquipollicem longus, maturus a pedunculo deciduus et sponte suâ semina pulpâ muciligineâ intermixta vehementèr ejaculans.

a. Ovarium, calyce stigmatibusque coronatum. *b.* Calyx masculus, cum staminibus.
c. Anthera, magnitudine aucta.

Momordica Elaterium.

Bryonia cretica.

BRYONIA.

Linn. Gen. Pl. 508. *Juss. Gen. Pl.* 394. *Gærtn. t.* 88. *De Cand. Prodr. v.* 3. 304.

Masculi. *Calyx* 5-dentatus. *Corolla* 5-partita. *Filamenta* 3.

Fœminei. *Calyx* 5-dentatus. *Corolla* 5-partita. *Stylus* 3-fidus. *Bacca* subglobosa, polysperma.

TABULA 940.

BRYONIA CRETICA.

Bryonia dioica, foliis digitatis palmatisque muricato-scabris: laciniis incisis, petiolis glabris, pedunculis masculis effusis multifloris, fructibus racemosis congestis sphæricis viridibus albo-maculatis.

B. cretica. *Linn. Sp. Pl.* 1439.? *Prodr. v.* 2. 236.

Ἄμπελος λευκὴ *Dioscoridis, omninò*; *Sibth.*

Ἀγριόκληµα, ἢ ἀγριοκολοκυθιὰ *hodiè.*

In sepibus Græciæ, et insularum circumjacentium, frequens. ♃.

Caules filiformes, angulati, pilis muricatis in sicco candidis parcè armati. *Cirrhi* simplices, spirales. *Folia* utrinque callis duris in sicco candidis scabra; nunc palmata, cordata, incisa, omninò *Vitis viniferæ* figurâ; nunc digitata, laciniis angustis acutis trifidis vel in junioribus indivisis. *Flores masculi* in racemo laxo, foliis longiore, dispositi; *corollæ* laciniis obtusis, pallidè virentibus, venosis. *Antheræ* 3, connatæ, pubescentes, biloculares; *loculis* sigmoideo-flexis: cruribus longioribus parallelis approximatis. *Flores fœminei* in racemo compacto brevi ordinati; *calycis* tubo stipitiformi, limbo basi intruso, 5-fido, glabro, laciniis linearibus obtusis. *Corolla* maris. *Stylus* filiformis, glaber, calyce longior; *stigma* 3-partitum, laciniis basi emarginatis. *Fructus* virides, pisiformes, albo maculati.

De verâ hujus plantæ synonymiâ dubius sum. *B. creticæ*, ex descriptione in *Horto Cliffortiano*, retulit cel. Smithius, nec sine causâ; speciei tamen Fontanesii, sub hoc nomine in libris receptæ, omninò diversa videtur, floribus fœmineis racemosis necnon foliorum lobis incisis. Nec *B. acutæ* Fontanesii, cujus exemplar ex Algeriâ coràm habeo, referenda; cui folia parùm calloso-muricata, figurâ loborum valdè disi mili.

A. Staminum columna, magnitudine aucta.
B. Unus e loculis antherarum seorsìm, auctus.
C. Flos fœmineus, corollâ orbatus, auctus.

MONŒCIA POLYANDRIA.

THELYGONUM.

Linn. Gen. Pl. 494. *Juss. Gen. Pl.* 405. *Nees ab Esenb. Gen. Pl. t.* 69.

Masculi. *Calyx* 2-fidus. *Corolla* 0. *Stamina* 6—20.

Fœminei. *Calyx* bibracteolatus, spathaceus, membranaceus, dorso ruptus. *Corolla* 0. *Stylus* basalis. *Achænium* coriaceum, 1-loculare, 1-spermum.

TABULA 941.

THELYGONUM CYNOCRAMBE.

Thelygonum Cynocrambe. *Linn. Sp. Pl.* 1411. *Willd. Sp. Pl. v.* 4. 420.
Cynocrambe Dioscoridis. *Tourn. Cor.* 52.
Κυνία, ἢ κυνοκράμβη, *Dioscoridis.*
Τζινγάκι, ἢ ξινκόχορτον, *hodiè.*

In ruderatis umbrosis, vel rupium fissuris, Græciæ et insulæ Cretæ. ⊙.

Radix annua, fibrosa. *Caulis* decumbens, vel prostratus, teres, rubescens, carnosus, infra nodos pubescens, cæterùm glaber. *Folia* subsucculenta, viridia, nitida, ciliata, petiolata, ovata; *petiolo* alato, basi dilatato, amplexicauli, sæpiùs in axillâ prolifero. *Flores* monœci, axillares, intra petioli basin absconditi. Masculi. *Calyx* tubulosus, bilabiatus, membranaceus; *labiis* revolutis indivisis, superiori acuminato dentato. *Stamina* ex icone Baueri sex, filamentis debilibus, tubo calycis longioribus. Fœminei in pedicellum minimum tuberculiformem elevati, utrinque bracteolâ minutâ acuminatâ stylo proximâ suffulti. *Calyx* membrana simplex, tenuis, pistillum totum vestiens, demùm sub antheræ dorso rupta et circa styli basin collapsa. *Ovarium* obovatum; *stylo* simplici, laterali; *ovulo* solitario erecto. *Achænium* obovatum, pedicello fungoso elevatum, subcarnosum, vel coriaceum, sub epidermide copiâ crystallorum acicularium maximâ in fasciculis ordinatâ verrucosum; *endocarpio* subcrustaceo. *Semen*

Thelygonum Cynocrambe.

Poterium villosum.

erectum, reniforme, funiculo suo intruso et testæ cavitatem ferè bipartiente; *albumen discolor*, carnosum; *embryo* hippocrepicus, in albuminis medio, *radiculâ* tereti *cotyledonibus* compressis planis æquali.

A. Flos masculus; B. fœmineus, cum bracteolis suis; magnitudine aucti.
c. C. Achænium, magnitudine naturali et auctum.

POTERIUM.

Linn. Gen. Pl. 495. *Juss. Gen. Pl.* 336.

Pimpinella. *Gærtn. t.* 32.

Masculi. *Bracteæ* 4. *Calyx* 4-partitus. *Corolla* 0. *Stamina* 30—50.

Fœminei. *Bracteæ* et *Calyx* maris. *Carpella* 2. *Fructus* carnosus, e tubo calycis indurato.

TABULA 942.

POTERIUM VILLOSUM.

Poterium inerme, caulibus sulcato-angulosis hirtis, foliolis oblongis dentato-incisis, capitulis globosis. *Prodr. v.* 2. 238. *De Cand. Prodr. v.* 2. 595.
Pimpinella orientalis villosissima. *Tourn. Cor.* 8.

Circa Byzantium. ♃.

Caules sesquipedales, erecti, sulcati, pilis longis mollibus hirti, eglandulosi, apice paniculati. *Folia* sessilia, villosa, pinnata, 7—8-juga, exstipulata, saltèm stipulis nullis à foliolis distinguendis; *foliolis* viridibus, oblongis, incisis, basi integris; *jugis* inferioribus approximatis, superioribus inter se distantibus; *suprema* sensìm in bracteis parvis simplicibus mutata. *Flores* in capitulis parvis globosis ordinati, *pedunculo* longo, minùs villoso, nudo, sæpiùs simplici insidentibus; basi masculis, apice fœmineis. *Bracteæ* quaternatìm sub floribus dispositæ, membranaceæ, obovatæ, pilosæ. Masculi: *calyce* coriaceo, viridi, quadripartito, extùs pubescente; *staminibus* plurimis, *filamentis* tenuibus debilibus, *antheris* subrotundis. Fœminei: *calyce* minore, tubo tetragono, limbo 4-partito, viridi, intùs glabro; *stigmate* exserto, purpureo, penicillato. *Fructus* ovatus, corrugatus, tetragonus, glaber, e tubo calycis indurato achænium includente compositus.

A. Bracteæ, quaternatìm dispositæ, magnitudine auctæ.
b. B. Flos fœmineus; *c.* C. masculus, magnitudine naturali et aucti.

TABULA 943.

POTERIUM SPINOSUM.

Poterium fruticosum, ramis intricatis spinescentibus, foliis multijugis, foliolis subrotundis incisis convexis glabris, spicis oblongis, calycis tubo baccato.

P. spinosum. *Linn. Sp. Pl.* 1412. *Willd. Sp. Pl. v.* 4. 423. *De Cand. Prodr. v.* 2. 594.
Stœbe legitima, Dioscoridis. *Clus. Hist. v.* 2. 303.
Pimpinella spinosa, seu sempervirens. *Tourn. Inst.* 157.
Στοιβὴ *Dioscoridis.*
Αστοῖβη, ἢ *αφάννα hodiè.*

In collibus siccis, ad mare, Græciæ et Archipelagi, vulgaris. ♄.

Frutex ramosus, rigidus, intricatus, 1—2 pedes altus. *Rami* adulti calami scriptorii magnitudine, fusci, corticis epiphlœo deciduo lacero vestiti; juniores pubescentes, nunc in parte fruticis superiori floridi, nunc in inferiori in spinis furcatis abeuntes. *Folia* coriacea, pinnata, angustissima, atroviridia; *stipulis* rigidis, dentiformibus, apice herbaceis; *foliolis* multijugis, subrotundis, incisis, convexis, suprà glabriusculis, subtùs villosis. *Flores* unisexuales, spicati, basi discreti; *pedunculo* communi aphyllo, piloso insidentes. *Bracteæ* quaternæ, ovatæ, pilosæ, pallidè virides, margine sanguineæ. *Calycis limbus* 4-partitus, glaber; *laciniis* oblongis, apiculatis, convexis, margine coloratis, membranaceis, in tubum pubescentem ipsis breviorem reflexis. *Stamina* indefinita, *filamentis* exsertis, debilibus, roseis, *antheris* subrotundis, luteis. *Ovaria* sæpiùs cuique calyci 2, *stylis* filiformibus, *stigmatibus* exsertis, penicillatis, roseis. *Fructus* spicati, testacei, sphærici, grani piperis magnitudine, carnosi, limbo calycis toto deciduo, *achœnia* omninò includentes.

a. Bracteæ magnitudine auctæ. *b*. B. Flos masculus; *c*. C. fœmineus, magnitudine naturali, et aucti.
d. Fructuum racemus. *e*. Fructus seorsìm.

Poterium spinosum.

Quercus coccifera.

QUERCUS.

Linn. Gen. Pl. 495. *Juss. Gen. Pl.* 410. *Gærtn. t.* 37.

Masculi. *Calyx* 5-fidus ferè. *Corolla* 0. *Stamina* 5—10.

Fœminei. *Calyx* superus, obsoletè 5-fidus. *Corolla* 0. *Styli* 2—5. *Nux* coriacea, cupulâ persistente basi cincta.

TABULA 944.

QUERCUS COCCIFERA.

Quercus foliis oblongis spinoso-dentatis basi cordatis utrinquè glabris, cupulâ sessili hemisphæricâ squamis linearibus induratis patulis, glande elongatâ basi angustatâ cupulam longè superante.

Q. coccifera. *Linn. Sp. Pl.* 1413. *Willd. Sp. Pl. v.* 4. 433.

Ilex aculeata cocciglandifera. *Tourn. Inst.* 583.

Πρῖνος *Dioscoridis.*

Πρινὰρι *hodiè.*

In Græciâ omni, et insulis vicinis, vulgatissima hujus generis species. ♄.

Rami rigidi, glabri, cinerei; *ramuli* pube stellatâ scabri. *Folia* petiolo brevi pubescente inserta, coriacea, oblonga, spinoso-serrata, basi cordata aut rotundata, internodiis multò longiora. *Spicæ masculæ* villosæ, pallidè virides, aggregatæ, 1½—2 pollices longæ; *calycibus* 5-partitis: *staminibus* laciniis calycis oppositis. *Cupulæ* sessiles, geminatæ, induratæ, glandulis triplò breviores; *squamis* linearibus, patulis, rigidis, obtusis, sericeis. *Glandes* oblongæ, basi angustatæ, ultra pollicem longæ.

a. A. Flos masculus, magnitudine naturali et auctus.
b. Cupula.
c. Glans.
d. Eadem, transversìm secta.

PLATANUS.

Linn. Gen. Pl. 498. *Juss. Gen. Pl.* 410. *Gærtn. t.* 90.

Masculi. *Amentum* globosum. *Calyx* 0. *Stamina* cuneata, paleis intermixta.

Fœminei. *Amentum* globosum. *Calyx* 0. *Carpella* paleis intermixta. *Ovarium* pilosum, 1-loculare; *ovulum* pendulum; *stylus* conicus, apice attenuatus, uncinatus. *Achænia* obovata, uncinata, basi pilis circumdata, a receptaculo areolato decidua.

TABULA 945.

PLATANUS ORIENTALIS.

Platanus foliis 5-partitis palmatis basi cuneatis truncatisque; laciniis lanceolatis incisis.
P. orientalis. *Linn. Sp. Pl.* 1417. *Willd. Sp. Pl. v.* 4. 473.
P. orientalis verus. *Tourn. Inst.* 590.
Πλάτανος *Dioscoridis.*
Πλατάνος *hodiè.*

In humidis, ad fluviorum ripas, Græciæ et insularum adjacentium. ♄.

Arbor vasta, corticis epiphlœo osseo, in laminas angulatas decidente. *Rami* cinereo-testacei, flexuosi, teretes, *juniores* villosi. *Folia* magna, *petiolo* longo, pubescente, tereti, basi tumido inserta, palmata, semiquinquepartita, utrinque glabra, suprà lævia, subtùs reticulata, pube secus venas parcâ; basi nunc omninò truncata, nunc petiolum versus paulò producta, nunc longè cuneata et secus venas densè barbata; *laciniis* altè et inæqualitèr incisis. *Amenta fructifera* sphærica 3—4 secus pedunculum pubescentem pendulum equidistantèr disposita, villosa, mucronibus rigidis achæniorum muricata.

a. A. Flos fœmineus, magnitudine naturali et auctus.
b. Receptaculum fructûs achæniis omnibus amotis.
c. C. Achænium, magnitudine naturali, et auctum.

Platanus orientalis

B C a D

Arum Dioscoridis.

a

Arum Dracunculus.

ARUM.

Linn. Sp. Pl. 470. *Juss. Gen. Pl.* 24. *Gærtn. t.* 84.

Spatha monophylla, cucullata. *Spadix* suprà nudus, infernè fœmineus, medio stamineus.

TABULA 946.

ARUM DRACUNCULUS.

Arum foliis pedatis integerrimis petiolo maculato multò brevioribus: laciniis lanceolatis undulatis, spadice tereti acuminato obtuso spathâ glabrâ apertâ acuminatâ erectâ breviore.

A. Dracunculus. *Linn. Sp. Pl.* 1367. *Willd. Sp. Pl. v.* 4. 478.

Dracunculus vulgaris. *Schott et Endlich. Meletem. Botan. p.* 17.

Dracunculus polyphyllus. *Tourn. Inst.* 160.

Δρακόντιον *Dioscoridis.*

Δρακοντιὰ, ἢ φιδόχορτον *hodiè.*

In umbrosis, ad sepes Græciæ, frequens. ♃.

Deest in herbario Sibthorpiano.

a. Spadix seorsìm.

TABULA 947.

ARUM DIOSCORIDIS.

Arum acaule, foliis hastatis integerrimis: lobis acutis divaricatis, spathâ obliquâ acuminatâ.

Prodr. v. 2. 245.

Ἄρον *Dioscoridis.*

Ἀγριοκολυκυθιὰ *hodiè.*

In insulæ Cypri cultis, inter segetes, vulgaris. ♃.

Radix cocta esculenta. *J. E. Smith.*

Hujus speciei vestigium nullum inter Sibthorpii plantas siccas restat. Verum est *Arum* secundum Schottii systema, *A. maculato* vulgatissimo proximum, sed staturâ multò majore, foliis verè hastatis acuminatis, necnon spathâ apertâ acuminatâ intùs maculatâ quasi *Dracunculum* æmulante satìs diversum.

a. Spadix, spathâ abscissâ.
C. Ovarium, auctum.
B. Anthera, magnitudine aucta.
D. Paranthium, seu ovarium abortivum, auctum.

TABULA 948.

ARUM ARISARUM.

Arum acaule, foliis tenuibus oblongis subundulatis hastato-sagittatis, lobis obtusis, spadice cylindraceo incurvato, spathâ cucullatâ striatâ apice inflexâ: limbo tubo integro æquali spadice longiore.

A. Arisarum. *Linn. Sp. Pl.* 1370. *Willd. Sp. Pl.* 4. *p.* 485. *Jacq. Hort. Schönbr. v.* 2. 34. *t.* 192.

Arisarum vulgare. *Schott et Endlich. Meletem. Botan. p.* 16.

Arisarum latifolium majus. *Bauh. Pin.* 196. *Tourn. Inst.* 161.

Ἄρισαρον *Dioscoridis.*

Δρακοντιὰ *hodiè.*

In umbrosis montosis Græciæ, haud infrequens. ♃.

Tubera subrotunda, carnosa, nucis Avellanæ magnitudine, nunc solitaria, nunc in corpus moniliforme rhizomate mediante connexa. *Folia* tenera, pallidè viridia, hastato-cordata, petiolis pluriès breviora: *lobis* lateralibus obtusis, intermedio acuto. *Scapus* spatham elevans petiolis æqualis. *Spatha* albida, venis roseis vittata, duos circitèr pollices longa; *tubo* integerrimo, nec lateralitèr fisso et convoluto, *limbo* oblongo inflexo spadice longiore æquali. *Spadix* albus, gracilis, incurvus, spathâ brevior; basi fœmineus, sursùm stamineus, ultra medium clavatus et nudus. *Stamina* plurima, distantia, spadici ferè perpendicularia; *filamento* subulato; *antherâ* subrotundâ, rimâ obliquâ unilaterali dehiscente. *Paranthia* nulla. *Ovaria* pauca, viridia, depressa, pentagona, verticillis duobus ad spadicis basin disposita. *Pericarpia* matura olivacea, spathâ libera, subrotunda, pentagona, vertice depresso-conica, stigmatis vestigiis umbonata, papyracea, unilocularia; *semine* solitario erecto, aliisque abortivis corrugatis; matura non vidi.

a. Spadix, spathâ abscissâ.

a

Arum Arisarum.



Pinus maritima?

MONŒCIA MONADELPHIA.

PINUS.

Linn. Gen. Pl. 499. *Juss. Gen. Pl.* 414. *Gærtn. t.* 91.

Masculi. *Flores* nudi, monandri, in spicâ densâ dispositi. *Antheræ* biloculares, cristatæ.

Fœminei. *Flores* nudi, basi bracteati, carpello explanato ovulisque inversis nudis; in *strobilum* ligneum coadunati. *Semina* alâ membranaceâ aucta.

TABULA 949.

PINUS MARITIMA.

Pinus foliis geminis tenuissimis serrulatis pallidè viridibus, strobilis ovatis obtusis glabris subsessilibus, squamarum apice rhombeo depresso glabro plano medio cinereo.

P. maritima. *Lambert Monogr. Pin.* 13. *t.* 10. *Willd. Sp. Pl. v.* 4. 497. *Steven, in Mem. Mosqu. p.* 48.

P. halepensis. *Ait. Kew. v.* 3. 367. *Willd. Sp. Pl. v.* 4. 496. *Lambert Monogr. Pin.* 15. *t.* 11.

Πεύκη *Dioscoridis.*

Πεῦκος *hodiè.*

In depressis arenosis siccis Græciæ ubiquè occurrit. In Elide præcipuè luxuriat. *D. Hawkins.* ♄.

Folia gemina, tenuia, glaberrima, margine cartilagineo-serrulata. *Spicæ* masculæ aggregatæ, basi squamulis deciduis scariosis ciliatis cinctæ. *Antheræ* horizontales, biloculares, apice cristâ membranaceâ ascendente obsoletè serrulatâ rotundatâ auctæ. *Strobilus* pendulus, subsessilis, vix 2 pollices longus, ovatus, obtusus, castaneus; squamis rhomboideis, nunc angulis lateralibus truncatis hexagonis, depressis, limbo lucidis, disco cinereis opacis, omninò planis, nisi linea minuta elevata transversa.

Materiam navalem optimam, usitatissimam, necnon picem et terebinthum, præbet. Hæc unica hujusce generis species in Cypro invenitur. *Sibth.*

a. Spica mascula.
b. Bracteæ ad basin ejusdem sitæ, auctoribus quibusdam pro calyce habitæ.
C. Spicæ talis pars superior, magnitudine aucta.
D. E. Antheræ, magnitudine auctæ.

CROTON.

Linn. Gen. Pl. 502. *Juss. Gen. Pl.* 389. *Gærtn. t.* 107.

Masculi. *Calyx* cylindricus, 5-dentatus. *Petala* 5. *Stamina* 10—15.

Fœminei. *Calyx* polyphyllus. *Petala* 0. *Styli* 3, bifidi. *Capsula* 3-locularis. *Semen* 1.

TABULA 950.

CROTON TINCTORIUM.

Croton foliis ovato-rhombeis repandis obtusis basi integerrimis utrinquè canis, racemis terminalibus axillaribusque basi fœmineis, capsulis lepidotis pubescentibus pendulis.

C. tinctorium. *Linn. Sp. Pl.* 1425. *Willd. Sp. Pl. v.* 4. 538.

Crozophora tinctoria. *Adr. Juss. Euphorb. Monogr.* 27. *Nees ab Esenb. Gen. Pl. cum icone.*

Heliotropium tricoccum. *Bauh. Pin.* 253.

Ricinoides ex quâ paratur *Tournesol* Gallorum. *Tourn. Inst.* 655.

Ἀγριοφασιὰ *Lemniorum.*

In Cretâ et Lemno insulis. ⊙.

Radix annua, fibrosa. *Caulis* palmaris, erectus, ramosus, teres, basi pubescens, sursùm pilis stellatis hispidus. *Folia* longè petiolata, obtusa, rhombea, repanda aut ovata, subundulata et levitèr sinuata, juniora cum petiolis incana, stellatìm pilosa, adulta cinereo-glauca, glabrata. *Racemi* terminales et axillares, erecti, basi fœminei, apice masculi. Masculi: *Calyx* stellatìm pilosus, 5-partitus, æstivatione valvatâ. *Petala* 5, lineari-lanceolata, calyce longiora, lutea. *Stamina* 10, monadelpha. Fœminei: *Calyx* 10-partitus, laciniis linearibus acutis, lanugine maris. *Petala* nulla. *Styli* 3, lineares, bifidi. *Fructus* in herbario desideratur.

a. A. Flos masculus, magnitudine naturali et auctus.
B. Flos fœmineus, magnitudine auctus.
d. Una e capsulæ valvulis, semiloculo altero seminifero.
b. Flores duo fœminei.
c. Capsula matura.
e. Semen.

Croton tinctorium

Croton villosum.

TABULA 951.

CROTON VILLOSUM.

Croton foliis ovatis repandis canis, pedunculis fructiferis elongato-deflexis, capsulis squamatis, floribus pentandris. *Prodr. v.* 2. 249.

Ricinoides ex quâ paratur *Tournesol* Gallorum, folio oblongo et villoso. *Tourn. Cor.* 45.

Ἡλιοτρόπιον τὸ μικρὸν *Dioscoridis.*

Ἡλιοτρόπιον *hodiè.*

Circa Athenas. ⊙.

Radix annua, subsimplex, albida. *Caulis* spithamæus, a basi ramosus, pilis stellatis densis canus; *ramis* brachiatis, rigidis. *Folia* ovata, acuta, plana, margine inæqualia, vix autèm dentata, pilis stellatis densè villosa, petiolis suis longiora. *Racemi* axillares, multiflori, basi feminei, apice masculi. *Flores* Fœminei longè pedunculati, divaricati; *sepalis* 9, inæqualibus, linearibus, erectis, villosissimis; *ovario* squamis latis, albidis, circularibus densè tecto; *stylis* 3, stellato-pilosis, bipartitis, erectis. *Flores* Masculi sessiles, aggregati. *Sepala* 5, linearia. *Petala* totidem lutea, linearia, apice revoluta, sepalis paulò longiora. *Stamina* in columnam centralem connata, ovarii rudimento nullo. *Capsula* calyce suffulta, 3-cocca, fusca, glabra, squamis distantibus circularibus lepidota.

a. A. Flos fœmineus. *b*. B. Flos masculus, magnitudine naturali et aucti.
c. Pili stellati quibus partes omnes virides vestiuntur.
d. Staminum columna.
e. Capsula.
f. Ejusdem coccus alter.
g. G. Semen, magnitudine naturali et auctum.

RICINUS.

Linn. Gen. Pl. 503. *Juss. Gen. Pl.* 388. *Gærtn. t.* 107. *Adr. de Juss. Euphorbiac.* 36.

Masculi. *Calyx* 5-partitus. *Corolla* nulla. *Stamina* numerosa.

Fœminei. *Calyx* 3-partitus. *Corolla* nulla. *Styli* 3, bifidi. *Capsula* 3-locularis, 3-sperma.

TABULA 952.

RICINUS COMMUNIS.

Ricinus foliis peltatis palmatis: lobis lanceolatis serratis, caule flexuoso herbaceo pruinoso, stigmatibus tribus, capsulis echinatis.

R. communis. *Linn. Sp. Pl.* 1430. *Willd. Sp. Pl. v.* 4. 564. *Nees et Eberm. Pl. Med. t.* 140.

R. vulgaris. *Tourn. Inst.* 532. *Blackw. Herb. t.* 148.

Κίκι, ἢ κρότων *Dioscoridis.*

Κροτωνεῖα *Cypriorum.*

Κολλοκικι *Eliensium.*

In Cretâ et Cypro; necnon in variis Græciæ locis; in ruderatis suburbanis. ⊙.

Caulis erectus, robustus, ramosus, annulatus, brevè articulatus; undiquè pruinâ glaucâ persistente tectus, *medullâ* cylindraceâ, fistulosâ farctus. *Folia* palmata, peltata, petiolis breviora, utrinquè glaberrima, viridia; *lobis* lanceolatis, inæqualitèr serratis, acuminatis, *serraturis* sub apice in paginâ inferiore materiem viscidam secernentibus. *Petioli* pruinosi, sub apice glandulâ orbiculari concavâ notati, basi *stipularum* cicatrice annulati. *Stipulæ* oblongæ, convexæ, in unam oppositifoliam deciduam connatæ. *Partes* reliquæ in herbario deficiunt.

a. Flos fœmineus.
b. Flos masculus.
c. Capsula immatura.
d. Semen.

Ricinus communis.

Andromeda Tetrapetala.

ANDRACHNE.

Linn. Gen. Pl. 509. *Juss. Gen. Pl.* 387. *Gærtn. t.* 108. *Adr. de Juss. Euphorbiac.* 24.

Masculi. *Sepala* 5. *Petala* 5, interjectis squamulis 5 bipartitis aut nullis. *Stamina* totidem monadelpha.

Fœminei. *Sepala* 5. *Petala* nulla aut squamiformia. *Styli* 3. *Capsula* 3-locularis, 6-sperma. *Semina* punctata.

TABULA 953.

ANDRACHNE TELEPHIOIDES.

Andrachne caulibus prostratis, foliis ovalibus auctis, petalis omnibus emarginatis.

A. Telephioides. *Linn. Sp. Pl.* 1439. *Vahl. Symb. v.* 2. 99. *Willd. Sp. Pl. v.* 4. 628.

Limeum humile. *Forsk. Descript.* 79.

Eraclissa hexagyna. *Forsk. Descript.* 208.

Telephioides græca humifusa, flore albo. *Tourn. Cor.* 50.

In petrosis insularum Græcarum. ⊙.

Deest in herbario.

a. A. Flos masculus. *b.* B. Flos fœmineus, magnitudine naturali et aucti.
C. Ovarium, cum petalis squamæformibus, a vertice inspectum, magnitudine auctum.
d. Capsula calyce cincta. E. Capsula seorsìm, aucta.
f. F. Semen, magnitudine naturali et auctum.

DIŒCIA TRIANDRIA.

OSYRIS.

Linn. Gen. Pl. 515. *Juss. Gen. Pl.* 75. *Endlich. Gen. Pl. No.* 2078.

MASCULI. *Calyx* trifidus. *Corolla* nulla.

FŒMINEI. *Calyx* trifidus. *Corolla* nulla. *Stylus* 1. *Stigma* subsimplex. *Pericarpium* baccatum, inferum, uniloculare.

TABULA 954.

OSYRIS ALBA.

OSYRIS alba. *Linn. Sp. Pl.* 1450. *Willd. Sp. Pl. v.* 4. 715. *Koch. Fl. Germ.* 623. *Nees ab Esenb. Gen. Pl. c. ic.*

Casia poëtica monspeliensium, an Theophrasti. *Tourn. Inst.* 664.

Ὄσυρις *Dioscoridis*?

Πλευροτόξυλον *hodiè*.

In Græciâ et Archipelagi insulis; etiam in monte Athô. ♄.

Frutex humilis, junceus, glaber, glaucescens; *ramis* vetustis tortuosis, erectis, atrofuscis, breviarticulatis; *ramulis* angulatis, striatis, strictissimis, sæpè apice priusquàm basi defoliatis. *Folia* alterna, linearia, apiculata, basi angustata, vix semipollicem longa, suprà lævia avenia, subtùs obsoletè carinata, petioli brevissimi torsione verticalia, internodiis paulò longiora. *Flores* et *Fructus* in herbario desunt.

a. A. Flos masculus, magnitudine naturali et auctus.
b. Ramulus cum fructu.
c. Fructûs sectio transversalis.
d. Semen.



Osyris alba.

Ruscus Hypoglossum.

RUSCUS.

Linn. Gen. Pl. 534. *Juss. Gen. Pl.* 42. *Gærtn. t.* 16. *Endlich. Gen. n.* 1188. *Nees ab Esenb. Gen. c. ic.*

Masculi. *Sepala* 3. *Petala* 3. *Stamina* in cylindrum connata centrale, ovatum, apice perforatum.

Fœminei. *Sepala* et *Petala* maris. *Ovarium* 3-loculare. *Stylus* brevis. *Bacca* abortu unilocularis, submonosperma.

TABULA 955.

RUSCUS HYPOGLOSSUM.

Ruscus ramis foliaceis oblongis multinerviis utrinquè acuminatis ramulum similem multò minorem basi uniflorum e medio proferentibus.

R. Hypoglossum. *Linn. Sp. Pl.* 1474. *Willd. Sp. Pl. v.* 4. 875. *Koch Fl. Germ.* 706.

R. angustifolius, fructu folio innascente. *Tourn. Inst.* 79.

Δάφνη Ἀλεξανδρεῖα *Dioscoridis.*

In dumetis ad mare Euxinum; necnon in monte Athô. ♃.

Rhizoma breve, carnosum, pallidè testaceum, radices longas simplices annuas proferens, fabricâ internâ omninò endogeneâ: fasciculis fibro-vascularibus per materiem medullarem subæqualitèr conspersis. *Caules* annui, erecti, spithamæi, ultra medium aphylli, mòx angulati, flexuosi; *ramis* planis, multinerviis, ovalibus, aut oblongis, utrinquè acuminatis, viridibus, omninò folia referentibus, nùnc oppositis, imò verticillatis, sæpiùs tamen alternis; *ramulis*, si adsunt, ejusdem formæ et coloris, e medio ramorum erumpentibus, solitariis, basi floridis. *Folia* squamæformia, linearia, sicca, scariosa, basi ramorum sita, ramulorum deficientia. *Flores* dioici, parvi, pallidè virides, e gremio ramulorum inter squamulas scariosas imbricatas producti, pedicellati, fasciculati; unico tantùm eodem tempore aperto. Cætera in herbario deficiunt.

a. Rami et ramuli masculi, floriferi.
b. B. Flos masculus, magnitudine naturali, et auctus.
c. Bacca.
d. Unum e seminibus.

DIŒCIA PENTANDRIA.

PISTACIA.

Linn. Gen. Pl. 518.

Terebinthus. *Tourn. t.* 345. *Juss. Gen. Pl.* 371.

MASCULI. *Calyx* 5-fidus. *Corolla* nulla.

FŒMINEI. *Calyx* 3-fidus. *Corolla* nulla. *Styli* 3. *Drupa* monosperma.

TABULA 956.

PISTACIA TEREBINTHUS.

PISTACIA foliis impari-pinnatis 3—5-jugis, foliolis oblongis mucronulatis utrinquè rotundatis.

P. Terebinthus. *Linn. Sp. Pl.* 1455. *Willd. Sp. Pl. v.* 4. 752. *De Cand. Prodr. v.* 2. 64.
Terebinthus vulgaris. *Tourn. Inst.* 579.
Τέρμινθος *Dioscoridis.*
Τετράμιθος *hodiè.*
Κοκκορέτζα, ἢ κοκκοροβιθιὰ, vulgò in Peloponneso.

In Græciâ et Archipelagi insulis, vulgaris. ♄.

Arbor parvus, dioicus, glaber; *ramulis* punctis elevatis quibusdam subasperis. *Folia* impari-pinnata, coriacea, decidua; *foliolis* sæpiùs septenis, nunc novenis undenisque, oblongis, sessilibus, utrinquè obtusis, apice mucronulatis, ultimo sæpiùs cæteris minore; novellis pulchrè rubescentibus. *Flores* paniculati cum foliis novis aut ociùs nascentes, in masculis densi, fœmineis laxiores. MASCULI *sepalis* 5, subulatis, pilosis, *petalis* nullis, *staminibus* quinque, sepalis oppositis, *filamentis* debilibus brevibus, *antheris* tetragonis, 2-locularibus, longitudinalitèr dehiscentibus. FŒMINEI *sepalis* 3, subulatis, pilosis, *petalis* nullis, *ovario* obovato, glabro, styli glabri longitudine, *stigmatibus* 3, obovatis, dilatatis, hispidiusculis. *Drupæ* parvæ, siccæ, obovatæ, mucronulatæ, compressæ, pisi magnitudine, pallidè flavæ, sanguineo-suffusæ, uniloculares, monospermæ.

a. Ramulus, cum paniculâ masculâ.
b. Panicula fœminea, cum ramulo suo et foliis novellis.
c. Paniculæ fructiferæ pars.
d. D. Flos masculus, magnitudine naturali, et auctus.
e. Flos fœmineus.
F. Ejusdem sepala, aucta.
G. Pistillum, auctum.

Pistacia Terebinthus.

Pistacia Lentiscus.

TABULA 957.

PISTACIA LENTISCUS.

Pistacia foliis abruptè pinnatis perennantibus 3—4-jugis, foliolis oblongis sessilibus mucronulatis basi angustatis, petiolo alato.

P. Lentiscus. *Linn. Sp. Pl.* 1455. *Blackw. Herb. t.* 195. *Willd. Sp. Pl. v.* 4. 65. *De Cand. Prodr. v.* 2. 65.

Lentiscus vulgaris. *Tourn. Inst.* 580.

Σχῖνος *Dioscoridis.*

Σχῖνος *hodiè.*

In Græciâ et Archipelagi insulis, ubiquè copiosissima. ♄.

Arbor parvus, dioicus, sempervirens, *ramulis* glabris, novellis sanguineis, maturis subangulatis, punctis elevatis scabriusculis. *Folia* perennantia, coriacea, abruptè pinnata, juniora rubescentia, adulta atroviridia, subtùs multò pallidiora et venis elevatis obsoletè reticulata. *Flores* in spicis axillaribus foliis brevioribus ordinati. Masculi, *calyce* brevi, 5-dentato, *petalis* nullis, *staminibus* 5, *filamentis* quàm antheræ oblongæ longitudinalitèr dehiscentes brevioribus. Fœminei, *calyce* 3-fido, *ovario* subrotundo, glabro, *stylo* brevi, *stigmatibus* 3, spathulatis, reflexis, sanguineis, hispidis. *Drupæ* siccæ, rubro-fulvæ, obovatæ, subtriangulares, uniloculares, monospermæ: loculis duobus alteris abortientibus.

a. Ramus masculus floridus; *b*. fœmineus. *c*. Spica fructifera.
d. D. Flos masculus, magnitudine naturali, et auctus. *e*. E. Flos fœmineus, magnitudine naturali, et auctus.
f. Drupa, à vertice visa. *g*. Semen.

DIŒCIA HEXANDRIA.

TAMUS.

Linn. Sp. Pl. 524. Endlich. Gen. n. 1202.

Tamnus. *Tourn. t.* 28. *Juss. Gen. Pl. 43.*

MASCULI. *Perianthium* 6-partitum.

FŒMINEI. *Perianthium* maris. *Stylus* 3-fidus. *Bacca* 3-locularis, infera. *Semina* 2.

TABULA 958.

TAMUS CRETICA.

TAMUS foliis cordatis integris trilobisque: lobis lateralibus rotundatis reticulatis, intermedio lanceolato acuminato trinervi multò longiore.

T. cretica. *Linn. Sp. Pl.* 1458. *Willd. Sp. Pl. v.* 4. 772.

Tamnus cretica, trifido folio. *Tourn. Cor. 3.*

In sylvis et sepibus Cretæ et Cypri, necnon in Græciâ, haud infrequens. ♃.

Caulis volubilis, longè scandens, glaber, teres. *Folia* tenera, pallidè viridia, glaberrima, petiolo suo longiora, sinu lato cordata, palmivenia, nunc acuminata integerrima, nunc triloba; *lobis* lateralibus rotundatis, subundulatis, reticulatis, intermedio lanceolato acuminatissimo trinervi pluriès brevioribus. *Flores* MASCULI in racemis axillaribus, furcatis, divaricatis, foliis longioribus, quorum brachium alterum breve, fasciculatìm ordinati, luteo-virides. *Perianthium* duplici ordine tripartitum, stellatum; *foliolis* linearibus, obtusiusculis, æqualibus. *Stamina* 6. *Ovarii* rudimentum nullum.—Planta fœminea desideratur.

Turiones cocti apud Cyprios hodiè esculenti.

a. Florum masculorum fasciculus.
b. Stamina.
C. Flos masculus, magnitudine auctus.



Tamus cretica.

Smilax aspera.

SMILAX.

Linn. Gen. Pl. 524. *Juss. Gen.* 42. *Gærtn. t.* 16.

MASCULI. *Perianthium* 6-phyllum.

FŒMINEI. *Perianthium* maris. *Styli* 3. *Bacca* supera, 3-locularis. *Semina* 2.

TABULA 959.

SMILAX ASPERA.

SMILAX caule aculeato angulato, foliis cordatis nunc subhastatis lanceolatis 7—9-nerviis aculeato-dentatis integrisque.

S. aspera. *Linn. Sp. Pl.* 1458. *Willd. Sp. Pl. v.* 4. 773. *Koch Fl. Germ.* 706.

S. aspera, fructu rubente. *Tourn. Inst.* 654.

Σμίλαξ τραχεῖα *Dioscoridis.*

Ἀκρουδόβατος *hodiè.*

Ξυλόβατος *Cypriorum.*

In palustribus et asperis Græciæ et Archipelagi, etiam in Cretâ et Cypro, copiosè. ♄.

Planta perennis, scandens. *Caules* flexuosi, herbacei, angulati, glabri, nunc aculeis rectis compressis acutis obsiti, nunc ferè inermes. *Folia* sempervirentia, atroviridia, coriacea, reticulata, cordata, v. auriculis dilatatis subhastata, lanceolata, acuminata, spinoso-dentata, aut omninò inermia, sæpiùs 7-nervia; *petiolis* aculeatis. *Cirrhi* gemini, stipulacei, spiraliter torti. *Flores* dioici, albi, in racemis terminalibus axillaribusque flexuosis fasciculatis dispositi; *pedicellis* rubescentibus, inarticulatis, quam ipsi flores paulò longioribus. MASCULI. *Perianthium* 6-partitum, stellato-patens; *petalis* linearibus, acutis, quam sepala paulò minoribus. *Stamina* 6. FŒMINEI. *Perianthium* omninò masculorum. *Staminum* rudimenta quædam decidua. *Ovarium* superum, ovale, 3-loculare; *stigmatibus* 3, linearibus, reflexis; *ovulis* 2 cuique loculo, suspensis. *Baccæ* coccineæ, pisiformes, 1—3-spermæ.

Foliorum formâ, necnon aculeorum præsentiâ et abundantiâ variare videtur, ideoque S. nigra, *Willd.* vix species diversa habenda est.

a. A. Flos masculus, magnitudine naturali, et auctus.
C. Flos fœmineus, seorsìm, magnitudine auctus.
b. Racemus florum fœmineorum.
d. Baccarum racemus.
e. f. Semina.

DIŒCIA DODECANDRIA.

DATISCA.

Linn. Gen. Pl. 530. *Juss. Gen. Pl.* 445. *Gærtn. t.* 30. *Endlich. Gen. n.* 5016.

Masculi. *Calyx* 5-phyllus. *Corolla* nulla. *Antheræ* sessiles, oblongæ, 15.

Fœminei. *Calyx* 3—5-dentatus. *Corolla* nulla. *Styli* 3. *Capsula* 3-angularis, 3-cornis, 1-locularis, pervia, polysperma, infera.

TABULA 960.

DATISCA CANNABINA.

D. cannabina. *Linn. Sp. Pl.* 1469. *Willd. Sp. Pl. v.* 4. 833.
Cannabina cretica florifera, etiam fructifera. *Tourn. Cor.* 52.

In monte Sipylo, Phrygiæ. ♃.

Herba erecta, lætè viridis, glaberrima, 3-pedalis et ultra. *Caules* teretes, ramosi, striati, solidi, medullâ farcti, *ligno* radiato exteriùs magis compacto. *Folia* alterna, exstipulata, reticulata, inferiora impari-pinnata, 2—3-juga, superiora simplicia; *foliolis* ovato-lanceolatis, serratis, apice longè acuminatis integrisque. *Flores* Masculi axillares et secus ramulos fasciculati, foliis floralibus linearibus acuminatis suffulti. *Sepala* 5, viridia, subulata, glabra. *Petala* nulla. *Stamina* 11—13, subsessilia, erecta, oblongo-linearia, 2-locularia, longitudinalitèr dehiscentia. Fœminei *calyce* supero, 3-dentato, dentibus carpellis oppositis. *Petala* nulla. *Capsula* infera, 1-locularis, apice dehiscens; *placentis* 3, linearibus, parietalibus, polyspermis, dentibus calycinis alternis. *Semina* minuta, anatropa, oblonga, teretia, reticulata, exalbuminosa; *embryone* semini conformi, *cotyledonibus* plano-convexis, radiculæ longitudine.

a. A. Floris masculi calyx, magnitudine naturali, et auctus.
c. Capsularum fasciculi.
e. Semen.

b. B. Stamina.
d. Capsula seorsìm.
E. Idem auctum.

Datisca cannabina.



Ephedra distachya.

DIŒCIA MONADELPHIA.

EPHEDRA.

Tourn. t. 477. Linn. Gen. Pl. 532. Juss. Gen. Pl. 411. Endlich. Gen. n. 1804.

Masculi. *Calyx* 2-valvis. *Corolla* nulla. *Stamina* 1—8 in columnam concreta. *Antheræ* 2—4-loculares.

Fœminei. *Involucrum*, *Calycis* et *Corollæ* loco, diphyllum. *Ovula* gemina, nuda, apice pervia, nuclei apice elongato styliformi. *Semina* gemina, opposita, nuda, plano-convexa, extùs coriaceo-carnosa.

TABULA 961.

EPHEDRA DISTACHYA.

Ephedra vaginis articulorum bidentatis obtusis, amentis oppositis verticellatisque sessilibus.

E. distachya. *Linn. Sp. Pl.* 1472? *Prodr. v.* 2. 265.

E. fragilis. *Desf. Fl. Atl. v.* 2. 372. *Willd. Sp. Pl. v.* 4. 860.

E. maritima minor. *Tourn. Inst.* 663.

Πολυκόμπτος *hodiè.*

In maritimis Græciæ; in monte Athô; et ad vias inter Smyrnam et Bursam. ♄.

Hujus plantæ ne fragmentum quidem in herbario Sibthorpiano restat. Si Baueri iconi fides sit habenda, ob amenta sessilia E. fragilis, *Desf.* potiùs videtur quàm E. distachya, *Linn.*

a. Amentum masculum.

A. Idem auctum.

B. Flos masculus, seorsìm, cum calyce suo bivalvi et staminibus monadelphis, magnitudine auctus.

POLYGAMIA MONŒCIA.

ATRIPLEX.

Linn. Gen. Pl. 545. *Juss. Gen. Pl.* 85. *Gærtn. t.* 75. *Endlich. Gen. n.* 1912.

HERMAPHR. *Calyx* 5-phyllus. *Corolla* nulla. *Stamina* 5. *Stylus* 2-partitus. *Utriculus* depressus. *Semen* solitarium, horizontale.

FŒMINEI. *Calyx* 2-phyllus. *Corolla* nulla. *Stamina* nulla. *Stylus* 2-partitus. *Utriculus* compressus. *Semen* solitarium, verticale.

TABULA 962.

ATRIPLEX HALIMUS.

ATRIPLEX caule fruticoso, foliis alternis glaucis ovatis obtusis subsessilibus integerrimis, calycis fœminei valvulis denticulatis.

A. Halimus. *Linn. Sp. Pl.* 1492. *Willd. Sp. Pl. v.* 4. 957.

A. latifolia, sive Halimus fruticosus. *Tourn. Inst.* 505.

In Cypro, et Archipelagi insulis; etiam in Peloponnesi littore. ♃.

Deest in herbario. Ex icone *A. Halimo* vero foliis ovatis nec rhombeis paululùm differt.

a. A. Flos fœmineus; *b*. B. masculus, magnitudine naturali, et aucti.

Atriplex Halimus.

Atriplex grisea.

TABULA 963.

ATRIPLEX GRÆCA.

ATRIPLEX caule fruticoso (?) ascendente, foliis albo-glaucis oblongis hastatis sinuatis floralibus linearibus, floribus racemoso-paniculatis, calyce fructifero dentato.

A. græca. *Willd. Sp. Pl. v.* 4. 958.? *Prodr. v.* 2. 267.

A. græca fruticosa humifusa, halimi folio. *Tourn. Cor.* 38.

In Eubœæ maritimis. ♄.

Caules decumbentes, basi lignosi, duri, et forsitàn fruticosi; *ramis* ascendentibus, dealbatis, ramulosis, apice in racemum compositum abeuntibus. *Folia* albo-glauca, opposita alternaque, omnia oblonga, hastata, sinuata, obtusa, petiolis suis longiora, supremis exceptis sub paniculæ ramis, quæ linearia, integerrima, obtusa. *Flores* in herbario desunt.

Species hùc, præeunte cel. Smithio, relata, non obstantibus foliis magìs sinuatis longiùsque petiolatis quàm apud Willdenovium invenies; et forsitàn, si caulis reverà fruticosus sit, haud injustè. Notandum tamen cauli lignoso quem in herbario Sibthorpiano conservatur vix fruticis indolem tribueres.

a. A. Flos masculus; *b*. B. fœmineus, magnitudine naturali, et aucti.
c. Calyx fructifer.

CRYPTOGAMIA FILICES.

ACROSTICHUM.

Linn. Gen. Pl. 559. *Juss. Gen. Pl.* 15. *Willd. Sp. Pl. v.* 5. 100.

Sporangia sparsa, discum totum inferiorem folii vel ejus partem occupantia.
Indusium nullum.

TABULA 964.

ACROSTICHUM MARANTÆ.

Acrostichum foliis bipinnatis, pinnis inferioribus oppositis, pinnulis oblongis obtusis integerrimis superioribus coadunatis inferioribus subpinnatifidis, subtùs paleaceis, petiolo hirsuto.

A. Marantæ. *Linn. Sp. Pl.* 1527. *Schkuhr. Crypt. v.* 4. *t.* 4. *Willd. Sp. Pl. v.* 5. 122.
Nothochlæna Marantæ. *R. Brown Prodr.* 146. *Kaulf. Filic.* 136. *Presl. Pteridogr.* 224.
Cincinalis Marantæ. *Desv. in Berl. Mag. v.* 5. 312.
Ceterach Marantæ. *DeCand. Fl. Fr. v.* 2. 567.
Asplenium ramosum. *Tourn. Inst.* 544.
Ἡμιονῖτις *Dioscoridis.*

In Cretâ et Cypro insulis; etiam in monte Athô. ♃.

Rhizoma horizontale, densissimè paleaceum. *Petioli* atropurpurei, nitidi, ramentis ferrugineis hirsuti, folio ipso longiores. *Folium* bipinnatum, circumscriptione lanceolatâ; *pinnis* ovatis, obtusis, infimis semper oppositis, superioribus alternis, demùm coadunatis; *pinnulis* ovalibus, subtùs densissimè ramentis ferrugineis vestitis, supremis coadunatis, infimis subpinnatifidis. *Venæ* ramentis abrasis conspicuæ, pinnatìm ordinatæ, bi-tripartitæ, in margine pinnularum equidistantes evanescentes. *Sporangia* globosa, subsessilia, annulo verticali elastico cincta, ramentis margini proximis axillaria.

Acrostichum Marantæ.

Acrostichum velleum.

TABULA 965.

ACROSTICHUM VELLEUM.

Acrostichum foliis bipinnatis, pinnulis ellipticis obtusis superioribus confluentibus utrinquè cum petiolo longissimè lanuginosis.

A. velleum. *Hort. Kew. v. 3.* 457. *Willd. Sp. Pl. v.* 5. 122.
Nothochlæna lanuginosa. *Desv. Encycl. Bot. Suppl. v.* 4. 110. *Kaulf. Filic.* 139.
N. vellea. *Desv. Journ. Bot. v.* 1. 92. nec *R. Br.*
A. lanuginosum. *Desfont. Atlant. v.* 2. 400. *t.* 256.

In insulâ Zacyntho. ♃.

Rhizoma breve, repens, foliis densissimè onustum. *Petioli* castanei, nitidi, juniores villosi, folio ipso multò breviores. *Folium* circumscriptione lanceolatâ, erectum, bipinnatum, obtusum, suprà villosum, subtùs densissimè lanuginosum, senectute calvescens et albescens; *pinnis* oblongis 4—5-jugis; *pinnulis* subrotundis, distantibus, integerrimis, nunc obsoletè trilobis. *Sporangia* pallida, subglobosa, compressa, annulo verticali testaceo cincta, lanugine pinnulorum abdita, margini proxima.

CHEILANTHES.

Swartz. Fil. 5. Willd. Sp. Pl. v. 5. 455.

Sori punctiformes, discreti, marginales, tecti *Indusio* squamiformi marginali interiùs dehiscente.

TABULA 966.

CHEILANTHES SUAVEOLENS.

Cheilanthes foliis bipinnatis glabris, pinnulis oblongis obtusis crenatis infimis pinnatifidis laciniis rotundatis, petiolo piloso.

Ch. suaveolens. *Prodr. v. 2. 278.* nec *Swartzii.*

Ch. odora. *Swartz. Synops. Filic. 127. Schkuhr. Crypt. 115. t. 123. Willd. Sp. Pl. v. 5. 457. Presl. Pteridogr. 160.*

Pteris acrosticha. *Balbis. Addit. ad Fl. Pedem. 98.*

In insulæ Cypri rupibus. ♃.

Petioli cæspitosi, ascendentes, purpureo-castanei, juniores villosi, adulti pilosi, vetusti calvi, folio ipso longiores. *Folium* circumscriptione ovatum, pallidè viride, glabrum, bipinnatum; *pinnis* folio conformibus, sed minoribus; *pinnulis* oblongis, basi latioribus, obtusis, crenatis, pinnatifidis pinnatisque, laciniis rotundatis. *Venæ* pinnatæ, simplices aut furcatæ, in sporangio desinentes. *Indusia* e margine oriunda, semicircularia, inflexa. *Sporangia* cuique indusio 1—2, incurva, subglobosa, pedicello elongato, et annulo verticali elastico.



Cheilanthes suaveolens.

APPENDICES.

APPENDIX PRIMA;

SISTENS

NOMINA AUCTORUM COMPENDIARIA IN HOC OPERE CITATORUM

FUSIUS EXPOSITA.

Ach. Lichenogr.—Erik Acharii, Eq. Aur. &c., Lichenographia Universalis. *Gottingæ*. 4to. 1810. Cum tab. 14 coloratis.

—— *Meth.*—Ejusdem Methodus Lichenum. *Stockholmiæ*. 8vo. vol. 2. 1803. Cum tab. 8 coloratis, et Supplemento.

—— *Syn.*—Ejusdem Synopsis methodica Lichenum. *Lundæ*. 8vo. 1814.

Act. Holm.—Kongl. Vetenskaps Academiens nya Handlingar. *Stockholm*. 8vo. 1780—1815.

—— *Linn. Soc.*—Transactions of the Linnæan Society. *London*. 4to. vol. 1—11. 1791—1815.

—— *Nov. Helvet.*—Nova Acta Helvetica. *Basileæ*. 4to. 1787.

—— *Petrop.*—Acta Academiæ Scientiarum Imperialis Petropolitanæ. *Petrop*. 4to. 1777—1790.

—— *Soc. Hist. Nat. Paris.*—Actes de la Société d' Histoire Naturelle de Paris. *Paris*. fol. vol. 1. 1792.

—— *Taurin.*—Mémoires de l' Académie Royale des Sciences. vol. 5. *Turin*. 4to. 1793.

Ait. Hort. Kew.—Hortus Kewensis, by William Aiton. Ed. 1. *London*. 8vo. vol. 3. 1789. Ed. 2. by William Townsend Aiton. *London*. 8vo. vol. 5. 1810—1813.

Allgemeine Literatur-Zeitung, von Jahre 1807. Junius. Num. 130—135. *Leipzig*.

Allion. Auct.—Caroli Allionii Auctarium ad Floram Pedemontanam. *Augustæ Taurinorum*. 4to. 1789.

—— *Pedem.*—Ejusd. Flora Pedemontana. *Ibid.* fol. vol. 3. 1785.

—— *Specim.*—Ejusd. Rariorum Pedemontii Stirpium Specimen primum. *Ibid.* 4to. 1755.

Alpin. Ægypt.—Prosperi Alpini de Plantis Ægypti Liber. *Patavi*. 4to. 1640.

—— *Exot.*—Ejusd. De Plantis Exoticis libri duo. *Venetiis*. 4to. 1656.

Ambros. Phyt.—Hyacinthi Ambrosini Phytologia. *Bononiæ*. folio. 1666.

Amm. Ruth.—Stirpium Rariorum in Imperio Rutheno spontè provenientium Icones et Descriptiones, collectæ ab Joanne Ammano, M.D. *Petrop*. 4to. 1739.

Andr. Repos.—The Botanist's Repository, by Henry Andrews. *London*. 4to. 10 vol. 1797, &c.

Ann. of Bot.—Annals of Botany. Editors, Charles Konig, F.L.S., and John Sims, M.D., F.L.S. *London*. 8vo. 2 vol. 1805, 1806.

Annal. du Mus. d' Hist. Nat.—Annales du Muséum National d' Histoire Naturelle. *Paris*. 4to. vol. 20. 1803, &c.

Arduin. Spec.—Petri Arduini Animadversionum Botanicarum Specimen. *Patavii*. 4to. 1759. Ejusdem operis Specimen alterum. *Venetiis*. 1763.

Barrel. Ic.—Plantæ per Galliam, Hispaniam et Italiam observatæ, iconibus æneis exhibitæ, a R. P. Jacobo Barreliero. *Paris*. folio. vol. 3. 1714.

Batsch.—A. J. G. C. Batsch Elenchus Fungorum. *Halæ Magdeb*. 4to. 1783, 1784.

Bauh. Hist.—J. Bauhini Historia universalis Plantarum. *Ebroduni*. fol. vol. 3. 1650.

—— *Pin.*—Caspari Bauhini Pinax Theatri Botanici. *Basileæ*. 4to. 1671.

—— *Prodr.*—Ejusd. Prodromus. Cum priore.

—— *Theatr.*—Ejusd. Theatri Botanici liber primus. *Basileæ*. fol. 1658.

Besl. Eyst.—Hortus Eystettensis Basilii Besleri. folio maj. 1613.

Bess. Hort. Crem. Cat.—Wilib. Besseri Catalogus Horti Botanici Wolhyniensis Cremenici. *Cremen*. 8vo. 1811—1816.

Bieberst. Fl. Taurico-cauc.—Flora Taurico-caucasica, exhibens stirpes phænogamas in Chersoneso Taurica et regionibus Caucasicis spontè crescentes, Auctore L. B. Friderico Marschall a Bieberstein. Equ. aur. *Charkoviæ.* 8vo. vol. 1, 2. 1808. vol. 3. 1819.

Bieb. Fl. Taur.—Idem opus.

Billard. Syr.—Icones Plantarum Syriæ Rariorum, auctore Jacobo Juliano La Billardière, M.D. *Paris.* 4to. decad. 5. 1791, &c.

Bivona Cent.—Sicularum Plantarum Centuria Prima et Secunda, Antonii Bivona Bernardi. *Panorm.* 4to. 1806.

—— *Tolpis.*—Ejusd. Monografia delle Tolpidi. *Palermo.* fol. 1809.

Blackwell Herb.—A curious Herbal, by Elizabeth Blackwell. *London.* fol. 2 vol. 1737.

Bocc. Mus.—Museo di Piante Rare, di Don Paulo Boccone. *Venet.* 4to. 1697.

Bocc. Sic.—Ejusd. Icones et Descriptiones Rariorum Plantarum Siciliæ, &c. *Oxon.* 4to. 1674.

Boerh. Lugd.-Bat.—Index alter Plantarum quæ in Horto Academico Lugduno-Batavo aluntur, conscriptus ab Hermanno Boerhaave. *Lugd-Bat.* 4to. 1727.

Bolt. Fung.—History of Funguses, by James Bolton. *Halifax.* 4to. 4 vol. 1788.

Bové Plant. exsicc.—Plantarum exemplaria exsiccata in oriente collecta et divulgata a Nicolao Bové ; sub anno 1834.

Brot. Lusit.—Felicis Avellar Broteri Flora Lusitanica. *Olissip.* 4to. vol. 2. 1804.

Brown Prodr.—Prodromus Floræ Novæ Hollandiæ et insulæ van Diemen, exhibens characteres plantarum quas annis 1802—1805 per oras utriusque insulæ collegit et descripsit Robertus Brown. *Londini.* 8vo. 1810.

Bulliard.—Herbier de la France, par M. Bulliard. *Paris.* fol. vol. 5. 1776—1780.

Burm. Geran.—Specimen Inaug. Botanicum de Geraniis, auctore Nicolao Laurentio Burmanno. *Lugd.-Bat.* 4to. 1759.

Buxb. Cent.—Plantarum minùs cognitarum Centuriæ quinque, per J. C. Buxbaum. *Petrop.* 4to. 1728.

Camer. Epit.—De Plantis Epitome, a Joachimo Camerario.—*Francofurti ad Mœnum.* 4to. 1586.

—— *Hort.*—Ejusd. Hortus medicus et philosophicus. *Ibid.* 4to. 1588.

Cass. Dict. Sc. Nat.—Cassini Henricus, in opere dicto Dictionnaire des Sciences Naturelles. *Paris et Strasb.* 8vo. 1816 *et seq.*

Cavan. Diss.—Monadelphiæ Classis Dissertationes Decem, auctore Antonio Josepho Cavanilles. *Matriti.* 4to. 1790.

—— *Ic.*—Ejusd. Icones et Descriptiones Plantarum. *Ibid.* fol. vol. 6. 1791—1801.

Clus. Hist.—Caroli Clusii Rariorum Plantarum Historia. *Antverpiæ.* fol. 1601.

Clus. Pannon.—Ejusd. Rariorum aliquot Stirpium per Pannoniam, Austriam, &c. observatarum Historia. *Antv.* 8vo. 1683.

Column. Ecphr.—Fabii Columnæ Ecphrasis. *Romæ.* 4to. 1616.

—— *Phytob.*—Ejusd. Phytobasanos. *Neapoli.* 4to. 1592.

Comm. Goett.—Novi Commentarii Societatis Regiæ Scientiarum Gottingensis. *Gotting.* 4to. 1771, &c.

Commel. Hort.—Hortus Medicus Amstelodamensis, auctore Joanne Commelino. *Amstel.* fol. vol. 2. 1697.

—— *Rar.*—Caspari Commelin, M.D. Plantæ rariores et exoticæ. *Lugd.-Bat.* 4to. 1706.

Compend. Fl. Brit.—Compendium Floræ Britannicæ, auctore Jacobo Edvardo Smith, Eq. Aur. ed. 2. *Lond.* 8vo. 1816.

Crantz Austr.—H. I. N. Crantz Stirpium Austriacarum Fasciculi 1—3. *Viennæ Austr. et Lips.* 8vo. 1762—1767.

Cupani Panph. ed. 1.—Panphyton Siculum R. P. Francisci Cupani. *Panorm.* 4to. 1713.

———— *ed.* 2.—Ejusdem operis ed. alt. tab. 168, curâ Antonini Bonanni Gervasii. *Ibid.* 1719.

Curt. Lond.—Flora Londinensis, by William Curtis. *London.* fol. fasc. 1—6. 1777, &c.

—— *Mag.*—Ejusd. Botanical Magazine. *Ibid.* 8vo. 1787, &c. vol. 1—14. Continued by John Sims, M.D. vol. 15—42.

Cyrill. Pl. Rar.—Domenici Cyrilli Plantarum rariorum Neapolitanarum fasciculus.

Dalech. Hist.—Historia Generalis Plantarum. *Lugd.* fol. vol. 2. 1587.

Decandolle Pl. Grasses.—A. P. De Candolle, Histoire des Plantes Grasses. *Paris.* 4to. 1799.

—— *Syst.*—Ejusd. Regni vegetabilis systema naturale. *Paris.* 8vo. 2 vol. 1818 et 1821.

—— *Prodr.*—Ejusd. Prodromus systematis naturalis regni vegetabilis. *Paris.* 8vo. 1824 *et seqq.*

—— *Fl. Fr.*—Ejusd. Flore Française, 3me édition. *Paris.* 8vo. 1805.

Desfont in Ann. du Mus.—Renatus Desfontaines—vide Annal. du Mus.

—— *Atlant.*—Ejusd. Flora Atlantica. *Paris.* 4to. vol. 2. 1798.

Desv. Journ. Bot.—N. A. Desvaux, Journal de Botanique. *Paris.* 8vo. 1808 *et seqq.*

Dicks. Crypt.—Jacobi Dickson, Fasciculi Plantarum Cryptogamicarum Britanniæ .—4. *Londini.* 4to. 1785—1801.

—— *Dr. Pl.*—Ejusd. Collection of Dried Plants. *Ibid.* fol. fasc. 1—4. 1789—1791.

Dill. Elth.—Hortus Elthamensis, auctore Johanne Jacobo Dillenio, M.D. *Londini.* fol. vol. 2. 1732.
—— *Musc.*—Ejusd. Historia Muscorum. *Oxon.* 4to. 1741.
Dillw. Conf.—British Confervæ, by Lewis Weston Dillwyn. *Lond.* 4to. 1809.
Diosc.—Pedacii Dioscoridis Opera, ex interpretatione Jani-Antonii Saraceni. fol. 1598.
Dod. Pempt.—Remberti Dodonæi Pemptades Sex. *Antverp.* fol. 1616.
Don. Fl. Nep.—D. Don Prodromus Floræ Nepalensis. *Lond.* 12mo. 1825.
Duby et De Cand. Bot. Gall.—J. E. Duby et A. P. De Candolle Botanicon Gallicum. *Paris.* 8vo. 1828.
Duby Bot. Gall.—Idem opus.
D'Urv. Enum.—Enumeratio plantarum quas in insulis Archipelagi aut littoribus Ponti Euxini, annis 1819 et 1820, collegit atque detexit J. Dumont D'Urville; in libro dicto Mémoires de la Société Linnéenne de Paris, vol. 1, p. 255 *et seq.* *Paris.* 1822, 8vo.
Duhamel Arb.—Traité des Arbres et Arbustes, par M. Duhamel du Monceau. *Paris.* 4to. vol. 2. 1755.

Ehrh. Beitr.—Frederici Ehrhart, Beiträge. *Hannov.* et *Osnabrück.* 8vo. fasc. 7. 1787—1792.
—— *Crypt.*—Ejusd. Plantæ Cryptogamicæ exsiccatæ. fol. Dec. 1–24.
—— *Herb.*—Ejusd. Herbæ exsiccatæ. fol. Dec. 1–12.
—— *Phytoph.*—Ejusd. Phytophylacium. fol. Dec. 1–8.
—— *Pl. Select.*—Ejusd. Plantæ Selectæ exsiccatæ. fol. Dec. 1.—.....
Engl. Bot.—English Botany, by James Edward Smith; the figures by James Sowerby. *London.* 8vo. 36 vol. 1790—1814.
Endlich. Gen. Pl.—Stephani Endlicher Genera Plantarum. *Viennæ.* 4to. 1836 *et seq.*
Esper Ic. Fucor.—Eugenii Joh. Christoph. Esper Icones Fucorum. *Nuremberg.* 4to. 1797, &c.
Exot. Bot.—Exotic Botany, by James Edward Smith; the figures by James Sowerby. *London.* 8vo. or 4to. 2 vol. 1804, 1805.

Fl. Brit.—Flora Britannica, auctore Jacobo Edvardo Smith. *Londini.* 8vo. vol. 3. 1800, 1804.
—— *Dan.*—Flora Danica. *Hafniæ.* fol. vol. 7. 1761—1794.
—— *Suec.*—Caroli Linnæi Flora Suecica. ed. 2. *Stockholmiæ.* 8vo. 1755.
—— *Oxon.*—Flora Oxoniensis, auctore Joanne Sibthorp, M.D. *Oxon.* 8vo. 1794.
—— *Zeyl.*—Caroli Linnæi Flora Zeylanica. *Holmiæ.* 8vo. 1747.
Forsk. Ægypt.-Arab.—Petri Forskall, Flora Ægyptiaco-arabica. *Hafniæ.* 4to. 1775.
—— *Desc.* ibid.
Fresen. Mus. Senk.—Georgii Fresenii Museum Senkenbergianum. *Francofurti ad Mænum.* 4to. 1833 *et seq.*
Fuchs. Hist.—Leonhardi Fuchsii Historia Stirpium. *Basileæ.* fol. 1542.

G. Pl.—Caroli v. Linné Genera Plantarum. ed. 6. *Holmiæ.* 8vo. 1764.
Gærtn.—Josephus Gærtner, M.D. De Fructibus et Seminibus Plantarum. *Stutgardiæ.* 4to. vol. 2. 1788, 1791.
Garidel Aix.—Histoire des Plantes qui naissent aux environs d'Aix, par M. Garidel. *Aix.* fol. 1715.
Gerard. Gallopr.—Ludovici Gerardi, M.D. Flora Galloprovincialis. *Paris.* 8vo. 1761.
Ginann. Adriat.—Opere Postume del Conte Giuseppe Ginanni. *Venezia.* fol. vol. 2. 1755, 1757.
Gmel. Fuc.—Samuel Gottlieb Gmelin, Historia Fucorum. *Petropoli.* 4to. 1768.
—— *It.*—Joannis Georgii Gmelin, Reise durch Sibirien. *Gotting.* 8vo. vol. 4. 1751, 1752.
—— *Sib.*—Ejusd. Flora Sibirica. *Petropoli.* 4to. vol. 4. 1747—1769.
Gooden. et Woodw.—Observations on the British Fuci, by the Rev. S. Goodenough, LL.D., and T. J. Woodward, Esq.—Tr. of Linn. Soc. v. 3. 84.
Gouan Illustr.—Antonii Gouan Illustrationes et Observationes Botanicæ. *Tiguri.* fol. 1773.
—— *Obs.* idem opus.
Guettard Obs.—Observations sur les Plantes, par M. Guettard. *Paris.* 12mo. vol. 2. 1747.
Gussone Plant. Rar.—Plantæ rariores quas in itinere per oras Ionii ac Adriatici maris et per regiones Samnii ac Aprutii collegit Joannes Gussone, M.D., præfectus H. R. Botanici in Boccadifalco. *Neapoli.* 4to. 1826.

Hall. Helvet.—Alberti Haller Enumeratio Methodica Stirpium Helvetiæ. *Gotting.* fol. vol. 2. 1742.
—— *Hist.*—Ejusd. Historia Stirpium Indigenarum Helvetiæ. *Bernæ.* fol. vol. 3. 1768.
—— *Nomencl.*—Ejusd. Nomenclator ex Historiâ Plantarum Indigenarum Helvetiæ. *Ibid.* 8vo. 1769.

Haworth Tr. of L. Soc.—A new Arrangement of the Genus Aloe, by A. H. Haworth.—Tr. of Linn. Soc. v. 7. 1.

Hedw. Crypt.—Descriptio et Adumbratio Muscorum Frondosorum, auctore Joanne Hedwig, M.D. *Lipsiæ*. fol. vol. 4. 1787—1797.

—— *Fund.*—Ejusd. Fundamentum Historiæ naturalis Muscorum Frondosorum. *Ibid.* 4to. 1782.

—— *Sp. Musc.*—Ejusd. Species Muscorum Frondosorum, opus posthumum. *Ibid.* 4to. 1801.

—— *Theor.*—Ejusd. Theoria Generationis et Fructificationis Plantarum Cryptogamicarum Linnæi. *Petrop.* 4to. 1784.

Herm. Hort. Lugd.-Bat.—Horti Academici Lugduno-Batavi Catalogus, auctore Paulo Hermanno. *Lugd.-Bat.* 8vo. 1687.

—— *Parad.*—Ejusd. Paradisus Batavus. *Ibid.* 4to. 1698.

Hoffm. Germ.—Geo. Franc. Hoffmann, Deutschlands Flora. *Erlang.* 8vo. 1800.

—— *Pl. Lich.*—Ejusd. Descriptio et Adumbratio Plantarum quæ Lichenes dicuntur. *Lipsiæ*. fol. vol. 3. 1790—1801.

—— *Sal.*—Ejusd. Historia Salicum. *Ibid.* fol. fasc. 1—5. 1785—1791.

Hooker Jung. Brit.—A Monograph of the British Jungermanniæ, by W. J. Hooker. *London.* 4to. fasc. 1—17. 1812—1814.

Hort. Cliff.—Hortus Cliffortianus, auctore Carolo Linnæo. *Amstelædami.* fol. 1737.

—— *Upsal.*—Ejusd. Hortus Upsaliensis. *Stockholmiæ.* 8vo. 1748.

Host Gram. Austr.—Nicolai Thomæ Host, M.D. Icones et Descriptiones Graminum Austriacorum. *Vindobonæ.* fol. vol. 4. 1801—1809.

Huds.—Gulielmi Hudsoni Flora Anglica; ed. 2. *Londini.* 8vo. vol. 2. 1778.

Jacq. Austr.—Nicolai Josephi Jacquin Flora Austriaca. *Viennæ Austriæ.* fol. vol. 5. 1773—1778.

—— *Coll.*—Ejusd. Collectanea ad Botanicam, Chemiam et Historiam Naturalem spectantia. *Ibid.* 4to. vol. 5. 1786, &c.

—— *Enum. Vind.*—Ejusd. Enumeratio Stirpium Agri Vindob. *Ibid.* 8vo. 1762.

—— *Hort. Schoenbr.*—Ejusd. Plantarum rariorum Horti Cæsarei Schoenbrunnensis Descriptiones et Icones. *Ibid.* fol. vol. 4. 1797, &c.

—— *Hort. Vind.*—Ejusd. Hortus Botanicus Vindobonensis. *Ibid.* fol. vol. 3. 1770, &c.

—— *Ic. Rar.*—Ejusd. Icones Plantarum Rariorum. *Ibid.* fol. vol. 3. 1781—1793.

—— *Misc. Austr.*—Ejusd. Miscellanea Austriaca. *Ibid.* 4to. vol. 2. 1778, 1781.

—— *Obs.*—Ejusd. Observationes Botanicæ. *Ibid.* fol. fasc. 4. 1764—1771.

Juss.—Antonii Laurentii de Jussieu Genera Plantarum. *Paris.* 8vo. 1789.

Kaulf. Filic.—Georg. Frid. Kaulfuss Enumeratio Filicum. *Lipsiæ.* 8vo. 1824.

Knapp. Gram. Brit.—Gramina Britannica, by J. L. Knapp, Esq. *London.* 4to. 1804.

Koch Fl. Germ.—Guil. Dan. Jos. Koch. Synopsis Floræ Germanicæ et Helveticæ. *Francofurti ad Mænum.* 8vo. 1837.

Labillard. Dec. Pl. Syr.—Jac. Jul. Labillardière Icones plantarum Syriæ rariorum; Decades V. *Paris.* 4to. 1791 *et seqq.*

Lachenal in Act. Nov. Helvet.—Emendationum et Auctariorum ad Hall. Hist. Stirp. Helvet. Specimen primum. Vide *Act.*

Lamarck. Dict.—Lamarck Dictionnaire Encyclopédique de Botanique. *Paris.* 4to. vol. 8. 1789—1808.

—— *Encycl.* idem opus.

—— *Ic.* Ejusd. Illustration des Genres. *Paris.* 4to. tab. 1—900. 1791—1800.

—— *Fl. Fr.*—Ejusd. Flore Française. *Paris.* 8vo. 3 vol. 1778.

Lambert Pin.—Description of the genus Pinus, by A. B. Lambert, Esq. *London.* fol. maj. 1803.

Lamouroux in Ann. du Mus. Vide *Ann.*

Leers.—J. D. Leers Flora Herbonensis. *Herb. Nassov.* 8vo. 1775.

Lessing. Synops.—Chr. Fr. Lessing, Synopsis generum Compositarum earumque dispositionis novæ Tentamen. *Berolini.* 8vo. 1832.

L'Herit. Geraniol.—Caroli Ludovici L'Heritier Geraniologia. *Paris.* fol. 1787, 1788.

—— *Stirp. Nov.*—Ejusd. Stirpes novæ aut minùs cognitæ. *Ibid.* fol. fasc. 1—6. 1784, 1785.

Lightf.—Flora Scotica, by the Rev. John Lightfoot. *London.* 8vo. 2 vol. 1777.

Link. Enum.—Henr. Frid. Link Enumeratio Plantarum Horti regii botanici Berolinensis. *Berol.* 8vo. 2 vol. 1823.

Linn.—Vide Fl. Suec. et Zeyl. G. Pl. Hort. Cliff. et Upsal. Mant. Sp. Pl. Syst. Nat. et Syst. Veg.

—— *fil. Dec.*—Caroli Linnæi filii Decas prima, et secunda, Plantarum. *Stockh.* fol. 1762, 1763.

—— *Suppl.*—Ejusdem Supplementum Plantarum. *Brunsv.* 8vo. 1781.

Lob. Ic.—Icones Stirpium, seu Plantarum, tam exoticarum quam indigenarum. *Antverp.* 4to oblong. 1591.

Loefl. Hisp.—Petri Loefling Iter Hispanicum. *Stockholm.* 8vo. 1758.

Magn. Hort.—Hortus Regius Monspeliensis, a Petro Magnol. *Monspelii.* 8vo. 1697.
—— *Monsp.*—Ejusd. Botanicum Monspeliense. *Ibid.* 8vo. 1688.
Mant.—Caroli a Linné Mantissæ Plantarum. *Holmiæ.* 8vo. 1767, 1771.
Mart. Rust.—Flora Rustica, by Thomas Martyn, B.D. *London.* 8vo. 1791, &c.
Matth. Valgr.—P. A. Matthioli Commentarii, apud Valgrisium. *Venetiis.* fol. vol. 2. 1583.
Meerb. Ic.—Afbeeldingen van Zeldzaame Gewassen, door Nicolaas Meerburgh. *Leyden.* fol. 1775.
Mérat Fl. Paris.—F. V. Mérat, Nouvelle Flore des environs de Paris. *Paris.* 8vo. 1812.
Meyer. Enum. Plant. Casp.—Carl Anton Meyer Verzeichniss der pflanzen welche in Caucasus und in den Provinzen am Westlichen Ufer des Caspischen Meeres gefunden und eingesammelt worden sind. *Petrop.* 4to. 1831.
Mentz. Pug.—Christiani Mentzelii Pugillus Rariorum Plantarum. Cum *Indice* ejus editus. *Berol.* fol. 1682.
Mich. Gen.—P. A. Michelii Nova Plantarum Genera. *Florent.* fol. 1729.
Mill. Dict.—The Gardener's Dictionary, by Philip Miller, edition 8th. *London.* fol. 1768.
—— *Ic.*—Ejusd. Figures of Plants adapted to the Gardener's Dictionary. *Ibid.* fol. 2 vol.
—— *Illustr.*—Illustratio Systematis Sexualis Linnæi, per Johannem Miller. *Ibid.* fol. 1777.
Mœnch. Meth.—Conrad Mœnch Methodus plantas horti et agri Marburgensis describendi. *Marburg.* 8vo. 1794.
Moris.—Plantarum Historia Universalis, auctore Roberto Morison. *Oxon.* fol. vol. 2 et 3. 1680, 1699.
Murray in Comm. Goett.—Vide *Comm. Goett.*

Nees ab Esenb. Gen. Pl.—Theod. Frid. Lud. Nees ab Esenbeck Genera Plantarum Floræ Germanicæ iconibus et descriptionibus illustrata. *Bonnæ.* 8vo. 1835 *et seqq.*
Nees et Eberm. Pl. Med.—T. F. L. Nees v. Esenbeck aliorumque Plantæ Medicinales. *Dusseldorf.* fol. 1828 *et seqq.*
Nees et Ebermaier, Handb. der Off. Pfl.—Ejusdem, cum Car. H. Ebermaier, Handbuch der medicinisch-pharmaceutischen Botanik. *Dusseldorf.* 8vo. 3 vol. 1830—1832.

Olivier It.—Travels in the Ottoman Empire, &c. by G. A. Olivier, translated from the French. *London.* 4to. 1801.
Osbeck It.—Ostindisk Resa af Pehr Osbeck. *Stockholm.* 8vo. 1757.

Pall. It.—Petr. Sim. Pallas Reise. *Petersburg.* 4to. vol. 3. 1776.
—— *Ross.*—Ejusd. Flora Rossica. *Ibid.* fol. 1784.
Persoon in Ust. Annal.—C. H. Persoon, apud Usteri Annalen der Botanik. *Zurich.* 8vo. fasc. 1—21. 1791—1797.
—— *Syn.*—Ejusd. Synopsis Methodica Fungorum. *Gotting.* 8vo. 1801.
—— *Synops.*—Ejusd. Synopsis plantarum, seu Enchiridion Botanicum. *Paris.* 12mo. 2 vol. 1805—1807.
Picot. Lapeyr. Pyren.—Figures de la Flore des Pyrénées, par Philippe Picot Lapeyrouse. *Paris.* fol. 1795.
Pluk. Phyt.—Leonardi Plukenetii Phytographia. *Lond.* 4to. 1691.
Pococke It.—A Description of the East, by Richard Pococke. *Ibid.* fol. vol. 2. 1743, 1745.
Poir. Suppl.—Th. M. Poiret Encyclopédie Méthodique, Dictionnaire de Botanique, Supplément. *Paris.* 4to. 1810 *et seqq.*
Pollich Palat.—Johannis Adami Pollich Historia Plantarum in Palatinatu Electorali spontè nascentium. *Mannhemit.* 8vo. vol. 3. 1776.
Pon. Bald.—Monte Baldo descritto da Giovanni Pona. *Venetia.* 4to. 1617.
Ponted. Compend.—Julii Pontederæ Compendium Tabularum Botanicarum. *Patavii.* 4to. 1718.
Presl. Fl. Sicul.—C. B. Presl., Flora Sicula. 8vo. *Pragæ.* 1826.
—— *Pteridogr.*—Ejusd. Tentamen Pteridographiæ, seu genera Filicacearum præsertìm juxta venarum decursum et distributionem exposita. *Pragæ.* 8vo. 1836.

Raii Syn.—Johannis Raii Synopsis methodica Stirpium Britannicarum ; ed. 3. *Lond.* 8vo. 1724.
—— *Syll. Exter.*—Ejusd. Stirpium Europæarum extra Britannias nascentium Sylloge. *Lond.* 8vo. 1694.
Rauwolf. It.—Leonharti Rauwolff Reiss inn die Morgenländer. *Laugingen.* 4to. 1583.
Redout. Liliac.—Les Liliacées par P. J. Redouté. *Paris.* fol. vol. 1—7. 1802, &c.
Rees Cyclop.—Vide *Sm.*
Reichenb. Fl. Excurs.—Ludovici Reichenbach, M.D., Flora Germanica excursoria. *Lipsiæ.* 12mo. 1830—1832.
Renealm. Spec.—Pauli Renealmi, M.D. Specimen Historiæ Plantarum. *Paris.* 4to. 1611.

Retz. Obs.—Andr. Joh. Retzii Observationes Botanicæ. *Lipsiæ.* fol. fasc. 6. 1789—1791.

—— *Prodr.*—Ejusd. Floræ Scandinaviæ Prodromus. ed. altera. *Ibid.* 8vo. 1795.

Riv. Monop. Irr.—Augusti Quirini Rivini Ordo Plant. fl. irreg. monopetalo. *Ibid.* fol. 1690.

—— *Pentap. Irr.*—Ejusd. Ord. pl. fl. irreg. pentapetalo. *Ibid.* fol. 1699.

—— *Suppl.*—Ejusd. Supplementum ineditum, (vide præf. p. 1,) apud Bibliothecam Banksianam.

—— *Tetrapp. Irr.*—Ejusd. Ord. Pl. fl. irreg. tetrapetalo. *Lipsiæ.* fol. 1691.

Roth Catal.—Catalecta Botanica ab Alberto Gulielmo Roth, M.D. *Ibid.* 8vo. fasc. 1. et 2. 1797, &c.

—— *Germ.*—Ejusd. Tentamen Floræ Germanicæ. *Ibid.* 8vo. vol. 3. 1788, &c.

—— *Fl. Germ.*—Idem opus.

Rottb. Gram.—Descriptionum et Iconum Rariores et Novas Plantas illustrantium Liber primus, a C. F. Rottböll, M.D. *Hafniæ.* fol. 1783.

Russell.—Vide *Soland.*

Salisb. Ann. of Bot.—Description of Nymphæēæ, by R. A. Salisbury, apud Ann. of Bot. v. 2. 69.

—— *Ic.*—Ejusd. Icones Stirpium Rariorum. *Lond.* fol. maj. 1791.

—— *Prodr.*—Ejusd. Prodromus Stirpium in Horto ad Chapel Allerton vigentium. *Ibid.* 8vo. 1796.

—— *Tr. of L. Soc. v.* 6.—Ejusd. Species of Erica.

Savi Fl. Pisan.—Gaetano Savi Flora Pisana. *Pisis.* 8vo. 1798.

Schæff. Fung.—Jacobi Christiani Schæffer Fungorum Icones. *Ratisbonæ.* 4to. vol. 4. 1762.

Scheuchz. Agr.—Agrostographia, authore Johanne Scheuchzero. *Tiguri.* 4to. 1719.

—— *Prodr.*—Ejusd. Agrostographiæ Helveticæ Prodromus. fol. 1708.

Schk. Car.—Christian Schkuhr Beschreibung und Abbildung von Riedgräsern. *Wittenberg.* 8vo. 1801.

Schkuhr. Crypt.—Ejusd. Deutschlands Kryptogamische gewächse. *Wittenb.* 4to. 1804.

Schmidel Ic.—Casimiri Christophori Schmidel Icones Plantarum et Analyses Partium. fol. 1762, &c.

Schott et Endlich. Meletem. Botan.—Meletemata Botanica. Auctoribus Henrico Schott et Stephano Endlicher. *Vindobonæ.* fol. 1832.

Schrad. Germ.—Flora Germanica, auctore Henrico Adolpho Schrader. vol. 1. *Gottingæ.* 8vo. 1806.

Schreb. Dec.—Joh. Christ. Dan. Schreberi Icones et Descriptiones Plantarum. Decas 1. *Halæ.* fol. 1766.

—— *Ic.*—Idem opus.

—— *Gen.*—Ejusd. Caroli a Linné Genera Plantarum, ed. 8. *Francof. ad Mænum.* 8vo. vol. 2. 1789, 1791.

—— *Gram.*—Ejusd. Beschreibung der Gräser. *Leipzig.* fol. 1769.

—— *Lips.*—Ejusd. Spicilegium Floræ Lipsicæ. *Ibid.* 8vo. 1771.

—— *Vertic. Unilab.*—Ejusd. Plantarum Verticillatarum Unilabiatarum Genera et Species. *Ibid.* 4to. 1774.

Scop. Carn.—Johannis Antonii Scopoli Flora Carniolica. ed. 2. *Vindob.* 8vo. vol. 2. 1772.

Sebast. et Maur. Prodr. Fl. Roman.—Ant. Sebastiani et Ern. Mauri Floræ Romanæ Prodromus. *Romæ.* 8vo. 1818.

Segu. Veron.—Johannis Francisci Seguierii Plantæ Veronenses. *Veronæ.* 8vo. vol. 3. 1745.

Shaw. Afric.—Catalogus Plantarum quas in variis Africæ et Asiæ partibus collegit Thomas Shavius. *Oxon.* fol. 1738.

—— *Cat.* Idem opus.

Sibth. Oxon.—Vide *Fl. Oxon.*

Sm. Compend.—Jacobi Edvardi Smith, Eq. Aur. Compendium Floræ Britannicæ. Vide *Compend.*

—— *Engl. Bot.*—Ejusd. English Botany.
—— *Exot. Bot.*—Ejusd. Exotic Botany.
—— *Fl. Brit.*—Ejusd. Flora Britannica.
} Vide in locis propriis.

Sm. Ic. Pict.—Ejusd. Icones Pictæ Plantarum Rariorum. *Lond.* fol. fasc. 3. 1790, &c.

—— *Plant. Ic.*—Ejusd. Plantarum Icones hactenus Ineditæ. *Ibid.* fol. fasc. 3. 1789—1791.

—— *Rees Cyclop.*—Ejusd. scripta varia botanica, apud Abrahami Rees Cyclopædiam. *Lond.* 4to. vol. 7. *et seq.*

—— *Spicil. Bot.*—Ejusd. Spicilegium Botanicum. Vide in loco proprio.

—— *Tour.*—Ejusd. Sketch of a Tour on the Continent. *Lond.* 8vo. 3 vol. 1793. ed. 2. *Ibid.* 1807.

Soland. in Russ. Alepp.—Natural History of Aleppo, by Alex. Russel, M.D. 2d edition. *Lond.* 4to. vol. 2. 1794.

Sowerb. Fung.—Coloured Figures of English Fungi, by James Sowerby. *Lond.* fol. vol. 3 et Suppl. 1797, &c.

Sp. Pl.—Caroli Linnæi Species Plantarum; ed. 2. *Holmiæ.* 8vo. vol. 2. 1762.

—— *ed.* 1.—Ejusdem operis ed. 1. *Ibid.* vol. 2. 1753.

Spicil. Bot.—Jacobi Edvardi Smith Spicilegium Botanicum. *Lond.* fol. fasc. 2. 1791, 1792.

Spreng. Pugill.—Curtii Sprengel Plantarum minus cognitarum pugillus primus. *Halæ.* 8vo. 1813.
—— *Syst.*—Ejusd. Systema vegetabilium. *Gotting.* 4 vol. 8vo. 1825 *et seqq.*
Sprengel in Act Holm.—Vide *Act. Holm.*
Stackh. Ner.—Nereis Britannica, by John Stackhouse, Esq. *Bathoniæ.* fol. 1795.
Swartz Fil.—Olai Swartz Synopsis Filicum. *Kiliæ.* 8vo. 1806.
—— *Synops. Filic.*—Idem opus.
—— *Musc. Suec.*—Ejusd. Dispositio Systematica Muscorum Frondosorum Sueciæ. *Erlangæ.* 8vo. 1799.
—— *Obs.*—Ejusd. Observationes Botanicæ. *Ibid.* 8vo. 1791.
—— *Prodr.*—Ejusd. Prodromus Descriptionum Vegetabilium Indiæ Occidentalis. *Holmiæ.* 8vo. 1788.
Syst. Nat. ed. 10.—Caroli Linnæi Systema Naturæ; ed. 10. *Ibid.* 8vo. 2 vol. 1758.
—— *ed.* 12.—Ejusdem operis ed. 12. *Ibid.* 8vo. 3 vol. 1766.
Syst. Veg. ed. 13.—Ejusd. auctoris Systema Vegetabilium, ed. 13, curâ J. A. Murray. *Gotting.* 8vo. 1774.
—— *ed.* 14.—Ejusd. operis ed. 14. *Ibid.* 8vo. 1784.

Tabern. Ic.—Jacobi Theodori Tabernæmontani Eicones Plantarum. *Francof. ad Mænum.* 4to. oblong. 1590.
—— *Kreuterbuch.*—Ejusd. Kreuterbuch. *Gedan.* fol. 1664.
Tenor. Prodr.—Mich. Tenore Prodromus Floræ Neapolitanæ. *Neap.* 8vo. 1811.
—— *Syllog. Plant. Neap.*—Ejusd. Sylloge Plantarum vascularium Floræ Neapolitanæ hucusque detectarum. *Neap.* 8vo. 1831.
—— *Fl. Neap.*—Ejusd. Flora Neapolitana. *Neap.* fol. 1811 *et seqq.*
—— *Fl. Med. Neap.*—Ejusd. Saggio sulle qualità medicinali delle piante della flora Napolitana. *Napoli* 8vo. 1820.
—— *Cat. Hort. Neap.*—Ejusd. Catalogo delle piante del giardino botanico del S. Ec. Bisignano. *Neap.* 4to. 1809.
Till. Hort. Pis.—Catalogus Plantarum Horti Pisani, auctore Michaele Angelo Tilli. *Florentiæ.* fol. 1723.
Tourn. Cor.—Josephi Pitton Tournefort Corollarium Institutionum Rei Herbariæ, cum sequente editum.
—— *Inst.*—Ejusd. Institutiones Rei Herbariæ. *Paris.* 4to. vol. 2. 1719.
—— *It.*—Ejusd. Rélation d'un Voyage du Levant. *Amsterdam.* 4to. vol. 2. 1718.
—— *Voy.*—Idem opus.
Tr. of Linn. Soc.—Vide *Act. Linn. Soc.*
Trew Ehret.—Plantæ Selectæ quarum Imagines pinxit G. D. Ehret, nominibus notisque illustravit C. J. Trew. *Norimb.* fol. 1750.
Turn. Hist. Fucor.—Fuci, by Dawson Turner. *Lond.* 4to. vol. 1—3, &c. 1808, &c.
—— *Musc. Hib.*—Ejusd. Muscologiæ Hibernicæ Spicilegium. *Yermuth.* 8vo. 1804.
Turr. Farset.—Farsetia Novum Genus; auctore Antonio Turra, M.D. *Venet.* 4to. 1765.

Vahl. Enum.—Martini Vahlii Enumeratio Plantarum. *Havniæ.* 8vo. vol. 2. 1804, 1805.
—— *Symb.*—Ejusd. Symbolæ Botanicæ. *Ibid.* fol. fasc. 3. 1790, &c.
Vaill. Paris.—Botanicon Parisiense, par feu M. Sebastien Vaillant. *Leide et Amst.* fol. 1727.
Vent. Jard. de Cels.—Déscription des Plantes cultivées dans le Jardin de J. M. Cels, par E. P. Ventenat. *Paris.* fol. 1800.
Villars Dauph.—Histoire des Plantes de Dauphiné, par M. Villars. *Grenoble.* 8vo. vol. 3. 1786.
—— *Delph.*—Idem opus.
Vivian. Fragment.—Dom. Viviani Floræ Italicæ fragmenta. *Genuæ.* 4to. 1808.
—— *Fl. Lib.*—Ejusd. Floræ Libycæ specimen. *Genuæ.* fol. 1824.

Wahlenb. Lapp.—Georgii Wahlenberg, M.D. Flora Lapponica. *Berolini.* 8vo. 1812.
Waldst. et Kitaib. Hungar.—Francisci Comitis Waldstein et Pauli Kitaibel, M.D. Descriptiones et Icones Plantarum Rariorum Hungariæ. *Viennæ.* fol. vol. 3. 1802—1812.
Wallr. Sched. Crit.—Fr. W. Wallroth Schedæ criticæ.
Wheler It —Sir George Wheler, Bart. Journey into Greece. *Lond.* fol. 1682.
Wiggers. Holsat.—Primitiæ Floræ Holsaticæ, auctore Frid. Henric. Wiggers. *Kiliæ.* 8vo. 1780.
Willden. Amaranth.—Caroli Ludovici Willdenow Historia Amaranthorum. *Turici.* fol. 1790.
—— *Sp. Pl.*—Ejusd. Caroli a Linné Species Plantarum. *Berol.* 8vo. 5 vol. 1797, &c.
—— *Enum.*—Ejusd. Enumeratio Plantarum Horti regii Berolinensis. *Berol.* 8vo. 1809.
With.—Arrangement of British Plants, by William Withering, M.D. ed. 3. *Birmingham.* 8vo. vol. 4. 1796.

Woodv. Med. Bot.—Medical Botany, by William Woodville, M.D. *Lond.* 4to. vol. 3, cum Suppl. 1790, &c.

Wulf. Crypt. Aquat.—Xaverii Wulfen Cryptogama Aquatica, apud Römer Archiv für die Botanik. Dritter Band. *Leipzig.* 1805.

—— *in Jacq. Coll.*—opera varia.

Zannoni Istor.—Istoria Botanica di Giacomo Zannoni. *Bologna.* fol. 1675.

APPENDIX SECUNDA;

SEU PLANTARUM OMNIUM QUAS IN GRÆCIA TERRISQUE VICINIS INVENIT SIBTHORPIUS, ENUMERATIO EMENDATA, SECUNDUM CANDOLLII SYSTEMA NATURALE, PAUCIS TANTUM MUTATIS, DIGESTA.

Jam sub Floræ Græcæ Prodromi titulo plantas omnes a Sibthorpio lectas secundum systema sexuale collegit et publici juris fecit beatus Smithius, operis pro ævo suo prædocti et summâ curâ confecti. Tot anni autem ab opere hoc incepto præterlapsi sunt, et tantus fuit Botanicæ systematicæ progressus, ut plantarum genera plurima certiores inter limites circumscribuntur, unde mutationes et emendationes multas effecerunt auctores recentiores. Operis magni Sibthorpiani omninò indignum videtur talia tantique momenti sub silentio præterire, ideòque Floram totam recensere, et secundum systema naturale, hodiè inter Botanicos undique receptum, ordinare, editoris esse muneris visum est. Plantæ igitur omnes quæ in Prodromo occurrunt cum auctorum recentiorum scriptis sedulo sunt comparatæ, emendationes certæ acceptæ, dubiæ prætermissæ, quædam nunc primùm indicatæ, omnes denique secundum Candollii systema, quod inter Botanicos maximè in usu est, omni diligentiâ redactæ. *Obs.* Numeri in Prodromo usurpati undique citantur.

Classis I. EXOGENÆ.

Sub-Classis I. THALAMIFLORÆ.

Ordo I. Ranunculaceæ.

Adonis æstivalis, *L.* 1262.
autumnalis, *L.* 1263.
Ranunculus Flammula, *L.* 1264.
Ficaria, *L.* 1265.
Thora, *L.* 1266.
trilobus, *Desf.* 1267.
auricomus, *L.* 1268.
sceleratus, *L.* 1269.
illyricus, *L.* 1270.
asiaticus, *L.* 1271.
montanus, *W.* 1272.
bulbosus, *L.* 1273.
hirsutus, *Sm.* 1274.
repens, *L.* 1275.
lanuginosus, *L.* 1276.
flabellatus, *Desf.* 1277.
millefoliatus, *Vahl.* 1278.
arvensis, *L.* 1279.
muricatus, *L.* 1280.
parviflorus, *L.* 1281.
grandiflorus, *L.* 1282.
falcatus, *L.* 1283.
aquatilis, *L.* 1284.
Isopyrum thalictroides, *L.* 1285.
Helleborus niger, *L.* 1286.
officinalis, *Salisb.* 1287.
Caltha palustris, *L.* 1288.
Pæonia officinalis, *L.* 1231.
corallina, *Retz.* 1232.
Delphinium Consolida, *L.* 1233.
tenuissimum, 1234.
peregrinum, *L.* 1235.
halteratum, 1236.
Staphisagria, *L.* 1237.
Aconitum Napellus, *L.* 1238.
Aquilegia vulgaris, *L.* 1239.
Nigella damascena, *L.* 1240.
aristata, 1241.
sativa, *L.* 1242.
arvensis, *L.* 1243.
Anemone Hepatica, *L.* 1244.
Pulsatilla, *L.* 1245.
pratensis, *L.* 1246.
coronaria, *L.* 1247.
hortensis, *L.* 1248.
nemorosa, *L.* 1249.
Apennina, *L.* 1250.
Clematis Viticella, *L.* 1251.
cirrhosa, *L.* 1252.
Vitalba, *L.* 1253.
Flammula, *L.* 1254.
recta, *L.* 1255.
Clematis integrifolia, *L.* 1256.
Thalictrum minus, *L.* 1257.
majus, *Jacq.* 1258.
angustifolium, *L.* 1259.
flavum, *L.* 1260.
Myosurus minimus, *L.* 755.
Garidella nigellastrum, *L.* 1039.
Actæa spicata, *L.* 1191.

Ordo II. Berberaceæ.

Leontice Chrysogonum, *L.* 806.
Leontopetalum, *L.* 807.
Berberis vulgaris, *L.* 832.
cretica, *L.* 833.
Epimedium alpinum, *L.* 364.

Ordo III. Nymphæaceæ.

Nymphæa alba, *L.* 1203.
Nuphar lutea, *Sm.* 1204.

Ordo IV. Papaveraceæ.

Papaver hybridum, *L.* 1197.
Argemone, *L.* 1198.
dubium, *L.* 1199.
Rhœas, *L.* 1200.
somniferum, *L.* 1201.
pilosum, 1202.

CHELIDONIUM majus, *L.* 1192.
GLAUCIUM luteum, *Scop.* 1193.
rubrum, 1194.
phœniccum, *Sm.* 1195.
ROMERIA hybrida, *DeCand.* (Glaucium violaceum, 1196.)
HYPECOUM procumbens, *L.* 377.
imberbe, 378.

Ordo V. FUMARIACEÆ.

CORYDALIS bulbosa, *DeCand.* (Fumaria solida, 1633.)
rutifolia, *DeCand.* (Fumaria, 1634.)
claviculata, *DeCand.* (Fumaria, 1638.)
FUMARIA officinalis, *L.* 1635.
capreolata, *L.* 1636.
densiflora, *DeCand.* (parviflora, 1637.)

Ordo VI. CRUCIFERÆ, vel BRASSICACEÆ.

* *Siliculosæ.*

MYAGRUM perfoliatum, *L.* 1473.
NESLIA paniculata, *Desv.* (Rapistrum, 1474.)
BUNIAS Erucago, *L.* 1475.
RAPISTRUM orientale, *DeCand.* (Bunias raphanifolia, 1477.)
perenne, *DeCand.* (Bunias, 1478.)
OCHTHODIUM ægyptiacum, *DeCand.* (Bunias, 1476.)
DIDESMIUS ægyptius, *DeCand.* (Bunias virgata, 1479.)
tenuifolius, *DeCand.* (Bunias, 1480.)
CAKILE maritima, *Scop.* (Bunias Cakile, 1481.)
ISATIS lusitanica, *L.* 1482.
CARRICHTERA Vellæ, *DeCand.* (Vella annua, 1483.)
DRABA aizoides, *L.* 1484.
hirta, *L.* 1486.
muralis, *L.* 1487.
EROPHILA vulgaris, *DeCand.* (Draba verna, 1485.)
HUTCHINSIA petræa, *R. Br.* (Lepidium petræum, 1488.)
LEPIDIUM spinosum, *L.* 1489, (et cornutum, 1491.)
sativum, *L.* 1490.
latifolium, *L.* 1492.
graminifolium, *L.* 1493.
Draba, *L.* (Cochlearia, 1501.)
ruderale, *L.* 1494.
campestre, *R. Br.* (Thlaspi, 1497.)
THLASPI arvense, *L.* 1495.
perfoliatum, *L.* 1498.
ÆTHIONEMA saxatilis, *R. Br.* (Thlaspi, 1496.)
CAPSELLA Bursa Pastoris, *DeCand.* (Thlaspi, 1499.)
CALEPINA Corvini, *Desv.* (Cochlearia lyrata, 1500.)
CORONOPUS Ruellii, *Gærtn.* 1502.
IBERIS sempervirens, *L.* 1503.
EUNOMIA chloræfolia, *DeCand.* (Iberis, 1504.)
TEESDALIA nudicaulis, *R. Br.* (Iberis, 1505.)
GLYCE maritima, *Lindl.* (Alyssum, 1506.)
ALYSSUM saxatile, *L.* 1507. t. 621.
alpestre, *L.* 1510. t. 623.
atlanticum, *Desf.* 1511.
orientale, *Ard.* 1512. t. 624.
ALYSSUM campestre, *L.* 1514. t. 622.
fulvesceus, 1515.
montanum, *L.* 1516.
FIBIGIA lunarioides, *Sm.* t. 625. (Alyssum, 1508.)
clypeata, *Med.* (Alyssum, 1517.)
BERTEROA obliqua, *DeCand.* (Alyssum, 1509. t. 626.)
incana, *DeCand.* (Alyssum, 1513.)
VESICARIA utriculata, *Lam.* (Alyssum, 1518.)
CAMELINA sativa, *Crantz.* (Alyssum, 1519.)
AUBRIETIA deltoidea, *DeCand.* (Alyssum, 1520.)
CLYPEOLA Ion Thlaspi, *L.* 1521.
BISCUTELLA Columnæ, *DeCand.* (apula, 1522.)
lævigata, *L.* 1523.
LUNARIA rediviva, *L.* 1524.
RICOTIA tenuifolia, 1525.

** *Siliquosæ.*

DENTARIA bulbifera, *L.* 1526.
CARDAMINE impatiens, *L.* 1527.
hirsuta, *L.* 1529.
amara, *L.* 1530.
PTERONEURON græcum, *DeCand.* (Cardamine, 1528.)
NASTURTIUM officinale, *R. Br.* (Sisymbrium Nasturtium, 1531.)
sylvestre, *R. Br.* (Sisymbrium, 1532.)
terrestre, *R. Br.* (Sisymbrium, 1533.)
DIPLOTAXIS tenuifolia, *DeCand.* (Sisymbrium, 1534.)
Barrelieri, *DeCand.* (Sisymbrium, 1537.)
SISYMBRIUM polyceratium, *L.* 1535.
torulosum, *Desf.* 1536.
Sophia, *L.* 1538.
Irio, *L.* 1539.
Columnæ, *Jacq.* (orientale, 1540.)
strictissimum, *L.* 1542.
officinale, *Scop.* (Erysimum, 1543.)
LEPTOCARPÆA Löselii, *L.* (Sisymbrium, 1541.)
BARBAREA vulgaris, *R. Br.* (Erysimum Barbarea, 1544.)
ALLIARIA officinalis, *DeCand.* (Erysimum Alliaria, 1545.)
ERYSIMUM repandum, *L.* 1546.
hieracifolium, *L.* 1547.
canescens, *Roth.* (diffusum, 1548.)
rupestre, *DeCand.* (Cheiranthus, 1551.)
CHEIRANTHUS Cheiri, *L.* 1549.
var. fruticulosus, *L.* 1550.
MALCOMIA maritima, *R. Br.* (Cheiranthus, 1552.)
flexuosa, *Sm.* (Cheiranthus, 1553.)
lyrata, *DeCand.* (Cheiranthus, 1554.)
MATHIOLA fenestralis, *R. Br.* (Cheiranthus, 1555.)
incana, *R. Br.* (Cheiranthus, 1556.)
tristis, *R. Br.* (Cheiranthus, 1557.)
varia, *DeCand.* (Cheiranthus, 1558.)
coronopifolia, *DeCand.* (Cheiranthus, 1559.)
lunata, *DeCand.*? (Cheiranthus bicornis, 1560.)
Pumilio, *DeCand.* (Cheiranthus, 1561.)
tricuspidata, *R. Br.* (Cheiranthus, 1562.)
sinuata, *R. Br.* (Cheiranthus, 1563.)
FARSETIA ægyptiaca, *Turr.* (Cheiranthus Farsetia, 1564.)
ARABIS verna, *R. Br.* (Hesperis, 1565.)
alpina, *L.* 1566.
thyrsoidea, 1567.
thaliana, *L.* 1568.
purpurea, 1569. (Aubrietia purpurea, *DeCand.*)
laxa, 1570.
TURRITIS glabra, *L.* 1571.
hirsuta, *L.* 1572.
MORICANDIA arvensis, *DeCand.* (Brassica, 1573.)
BRASSICA oleracea, *L.* 1574.
cretica, *Lam.* 1575.
fruticulosa, *Cyr.* (Sinapis radicata, 1581.)
ERUCA sativa, *DeCand.* (Brassica, 1576.)
SINAPIS arvensis, *L.* 1577.
alba, *L.* 1578.
nigra, *L.* 1579.
pubescens, *L.* 1580.
incana, *L.* (Cordylocarpus pubescens, 1584.)
RAPHANUS Raphanistrum, *L.* 1582.
ERUCARIA aleppica, *Gærtn.* (Cordylocarpus lævigatus, 1583.)

Ordo VII. CAPPARIDACEÆ.

CAPPARIS spinosa, *L.* 1189.
rupestris, *L.* 1190.
CLEOME ornithopodioides, *L.* 1585.

Ordo VIII. CISTACEÆ.

CISTUS villosus, *L.* 1206. (and 1209 incanus.)
laurifolius, *L.* 1207.
monspeliensis, *L.* 1208.
albidus, *L.* 1210.
creticus, *L.* 1211.
parviflorus, *Lam.* 1212.
salvifolius, *L.* 1213.
crispus, *L.* 1214.
HELIANTHEMUM lævipes, *W.* (Cistus, 1215.)
Fumana, *Mill.* (Cistus, 1216.)
alpestris, *Dun.* (Cistus, 1217.)
Tuberaria, *Mill.* (Cistus, 1208.)
guttatum, *Mill.* (Cistus, 1219.)
ledifolium, *W.* (Cistus, 1220.)
salicifolium, *L.* (Cistus, 1221.)
glutinosum, *Pers.* (Cistus thymifolius, 1222.)
pilosum, *Pers.* (Cistus, 1223.)
lavandulifolium, *DeCand.* (Cistus, 1224.)
racemosum, *Dun.* (Cistus, 1225.)
vulgare, *Gærtn.* (Cistus Helianthemum, 1226.)
hirtum, *Pers.* (Cistus, 1227.)
apenninum, *DeCand.* (Cistus, 1229.)
var. flavum. (Cistus ellipticus, 1230.)
arabicum, *Pers.* (Cistus, 1231.)

Ordo IX. VIOLACEÆ.

VIOLA hirta, *L.* 507.
odorata, *L.* 508.
canina, *L.* 509.
tricolor, *L.* 510.
calcarata, *L.* 512.
var. gracilis, 511.
cenisia, *L.* 513.

Ordo X. Droseraceæ.

Parnassia palustris, *L.* 729.

Ordo XI. Polygalaceæ.

Polygala vulgaris, *L.* 1639.
major, *Jacq.* 1640.
venulosa, 1641.
monspeliaca, *L.* (glumacea, 1642.)

Ordo XII. Frankeniaceæ.

Frankenia lævis, *L.* 835.
hispida, *DeCand.* (hirsuta, 836.)
pulverulenta, *L.* 837.

Ordo XIII. Caryophyllaceæ.

Saponaria Vaccaria, *L.* (Gypsophila, 940.)
officinalis, *L.* 951.
Smithii, *Ser.* (cæspitosa, 952.)
Gypsophila graminea, 941.
altissima, *L.* 942.
muralis, *L.* 943.
rigida, *L.* 944.
dianthoides, 945.
cretica, 946.
ochroleuca, 947.
ocellata, 949.
thymifolia, 950.
Velezia rigida, *L.* 953.
quadridentata, 954.
Dianthus carthusianorum, *L.* 955.
pinifolius, 956.
biflorus, 957.
prolifer, *L.* 958.
Armeria, *L.* 959.
corymbosus, 960.
diffusus, 961.
pubescens, 962.
tripunctatus, 963.
Caryophyllus, *L.* 964.
pallens, 965.
cinnamomeus, 966.
crinitus, *Sm.* 967.
serratifolius, 968.
strictus, 969.
gracilis, 970.
leucophæus, 971.
alpinus, *L.* 972.
arboreus, *L.* 973.
fruticosus, *L.* 974.
Silene lusitanica, *L.* 975.
quinquevulnera, *L.* 976.
nocturna, *L.* 977.
gallica, *L.* 978.
pendula, *L.* 979.
vespertina, *Retz.* 980.
discolor, 981.
thymifolia, 982.
cerastoides, *L.* 983.
dichotoma, *Ehr.* 984.
racemosa, *Otth.* (divaricata, 985.)
inflata, *Sm.* 986.
fabaria, 987.
Behen, *L.* 988.
cæsia, 989.
lævigata, 990.
rupestris, *L.* 991.
longipetala, *Vent.* 992.
inaperta, *L.* 993.

Silene juncea, 994.
mutabilis, *L.* 995.
cretica, *L.* 996.
conica, *L.* 997.
conoidea, *L.* 998.
noctiflora, *L.* 999.
leucophæa, 1000.
ramosissima, 1001.
rubella, *L.* 1002.
orchidea, *L.* 1003.
Armeria, *L.* 1004.
paradoxa, *L.* 1005.
italica, 1006.
mollissima, 1007.
fruticosa, *L.* 1008.
rigidula, 1009.
spinescens, 1010.
gigantea, *L.* 1011.
congesta, 1012.
nutans, *L.* 1013.
Otites, *Sm.* 1014.
linoides, *Otth.* (linifolia, 1015.)
staticifolia, 1016.
auriculata, 1017.
falcata, 1018.
Lychnis Githago, *Lam.* (Agrostemma, 1062.)
coronaria, *Lam.* (Agrostemma, 1063.)
Flos Jovis, *L.* (Agrostemma, 1064.)
Cœli Rosa, *Lam.* (Agrostemma, 1065.)
Flos Cuculi, *L.* 1066.
viscaria, *L.* 1067.
dioica, *L.* 1068.
Cerastium vulgatum, *L.* 1069.
viscosum, *L.* 1070.
semidecandrum, *L.* 1071.
pentandrum, *L.* 1072.
illyricum, *Ard.* (pilosum, 1073.)
arvense, *L.* 1074.
repens, *L.* 1075.
aquaticum, *L.* 1076.
grandiflorum, *W. & K.* (tomentosum, 1077.)
Spergula arvensis, *L.* 1078.
pentandra, *L.* 1079.
Stellaria media, *Sm.* 1019.
holostea, *L.* 1020.
cerastoides, *L.* 1021.
Alsine mucronata, *L.* 726.
segetalis, *L.* 727.
Sagina procumbens, *L.* 388.
Mœhringia stricta, 899.
Drypis spinosa, *L.* 728.
Holosteum umbellatum, *L.* 267.
Arenaria trinervis, *L.* 1022.
oxypetala, 1023.
ciliata, *L.* 1024.
umbellata, *Soland.* 1025.
serpyllifolia, *L.* 1026.
rubra, *L.* 1027.
marina, *Sm.* 1028.
picta, 1029.
verna, *L.* 1030.
tenuifolia, *L.* 1031.
thymifolia, 1032.
recurva, *All.* 1033.
lanceolata, *All.* 1034.
striata, *L.* 1035.
fastigiata, *Sm.* 1036.
fasciculata, *L.* 1037.
Cherleria sedoides, *L.* 1038.

Ordo XIV. Linaceæ.

Linum usitatissimum, *L.* 742.
viscosum, *L.* 743.
hirsutum, *L.* 744.
angustifolium, *Sm.* 745.
alpinum, *L.* 746.
gallicum, *L.* 747.
strictum, *L.* 748.
glandulosum, *α DeCand.* (arboreum, 749.)
cæspitosum, 750.
nodiflorum, *L.* 751.
catharticum, *L.* 752.
Radiola millegrana, *Sm.* 389.

Ordo XV. Malvaceæ.

Althæa officinalis, *L.* 1613.
cannabina, *L.* 1614.
hirsuta, *L.* 1615.
rosea, *Cav.* (Alcea, 1616.)
ficifolia, *Cav.* (Alcea, 1617.)
acaulis, *Cav.* (Alcea, 1618.)
Malva althæoides, *Cav.* 1619.
parviflora, *L.* 1620.
rotundifolia, *L.* 1621.
Sherardiana, *L.* 1622.
sylvestris, *L.* 1623.
crispa, *L.* 1624.
Tournefortiana, *L.* 1625.
Lavatera arborea, *L.* 1626.
olbia, *L.* 1627.
thuringiaca, *L.* 1628.
cretica, *L.* 1629.
punctata, *All.* 1630.
Malope malacoides, *L.* 1631.
Hibiscus Trionum, *L.* 1632.

Ordo XVI. Tiliaceæ.

Tilia europæa, *L.* 1205.

Ordo XVII. Hypericaceæ.

Hypericum calycinum, *L.* 1848.
Androsæmum, *L.* 1849.
olympicum, *L.* 1850.
hircinum, *L.* 1851.
empetrifolium, *W.* 1852.
repens, *L.* 1853.
quadrangulum, *L.* 1854.
perforatum, *L.* 1855.
crispum, *L.* 1856.
perfoliatum, *L.* 1857.
barbatum, *Jacq.* 1858.
montanum, *L.* 1859.
hirsutum, *L.* 1860.
lanuginosum, *Lam.* 1861.
origanifolium, *W.* 1862.
orientale, *L.* 1863.
pulchrum, *L.* 1864.
Coris, *L.* 1865.

Ordo XVIII. Aceraceæ.

Acer campestre, *L.* 895.
monspessulanum, *L.* 896.
creticum, *L.* 897.
obtusifolium, 898.

Ordo XIX. Æsculaceæ.

Æsculus Hippocastanum, *L.* 863.

Ordo XX. VITACEÆ.

VITIS vinifera, *L.* 561.

Ordo XXI. GERANIACEÆ.

ERODIUM supracanum, *L'Her.* (petræum, 1586.)
chrysanthum, *L'Her.* (absinthoides, 1587.)
crassifolium, β *L'Her.* (alpinum, 1588.)
ciconium, *W.* 1589.
cicutarium, *Sm.* 1590.
romanum, *W.* 1591.
moschatum, *Sm.* 1592.
laciniatum, *Sm.* 1593.
gruinum, *W.* 1594.
chium, *W.* 1595.
malacoides, *W.* 1596.
maritimum, *Sm.* 1597.
GERANIUM sanguineum, *L.* 1598.
tuberosum, *L.* 1599.
macrorhizum, *L.* 1600.
nodosum, *L.* 1601.
striatum, *L.* 1602.
sylvaticum, *L.* 1603.
pratense, *L.* 1604.
subcaulescens, *L'Her.* (asphodeloides, 1605.)
pyrenaicum, *L.* 1606.
lucidum, *L.* 1607.
molle, *L.* 1608.
rotundifolium, *L.* 1609.
dissectum, *L.* 1610.
columbinum, *L.* 1611.
robertianum, *L.* 1612.

Ordo XXII. OXALIDACEÆ.

OXALIS Acetosella, *L.* 1060.
corniculata, *L.* 1061.

Ordo XXIII. ZYGOPHYLLACEÆ.

ZYGOPHYLLUM album, *L.* 923.
TRIBULUS terrestris, *L.* 924.

Ordo XXIV. RUTACEÆ.

DICTAMNUS albus, *L.* 917.
RUTA graveolens, L. 918.
montana, *Ait.* 919.
chalepensis, *L.* 920.
APLOPHYLLUM patavinum, *A. de J.* (Ruta patavina, 921.)
spathulatum, *Lindl.* (Ruta, *Fl. Gr.* t. 370. linifolia, 922.)
PEGANUM Harmala, *L.* 1082.

SUB-CLASSIS II. CALYCIFLORÆ.

Ordo XXV. STAPHYLEACEÆ.

STAPHYLEA pinnata, *L.* 723.

Ordo XXVI. CELASTRACEÆ.

EUONYMUS latifolius, *W.* 557.

Ordo XXVII. AQUIFOLIACEÆ.

ILEX Aquifolium, *L.* 379.

Ordo XXVIII. RHAMNACEÆ.

RHAMNUS catharticus, *L.* 546.
infectorius, *L.* 547.
oleoides, *L.* 548.
prunifolius, 549.
saxatilis, *L.* 550.
alpinus, *L.* 551.
Sibthorpianus, *R. et S.* (pubescens, 552.)
Frangula, *L.* 553.
Alaternus, *L.* 554.
PALIURUS aculeatus, *Lam.* (Ziziphus Paliurus, 555.)
ZIZYPHUS vulgaris, *Lam.* 556.

Ordo XXIX. TEREBINTHACEÆ.

PISTACIA Terebinthus, *L.* 2307.
Lentiscus, *L.* 2308.
RHUS Coriaria, *L.* 716.
Cotinus, *L.* 717.

Ordo XXX. LEGUMINOSÆ seu FABACEÆ.

SPARTIUM junceum, *L.* 1643.
GENISTA Scorpius, *DeCand.* (Spartium, 1644.)
parviflora, *DeCand.* (Spartium angulatum, 1645.
acanthoclada, *DeCand.* (Spartium horridum, 1647.)
candicans, *L.* 1648.
tinctoria, *L.* 1649.
humifusa, *L.* 1650.
pilosa, *L.* 1651.
ONONIS arvensis, *L.* (antiquorum, 1652.)
var. spinosa, *L.* 1653.
Columnæ, *All.* 1654.
mitissima, *L.* 1655.
alopecuroides, *L.* 1656.
Cherleri, *W.* 1657.
Natrix, *L.* 1658.
breviflora, *DeCand.* (viscosa, 1659.)
ornithopodioides, *L.* 1660.
crispa, *L.* 1661.
ANTHYLLIS tetraphylla, *L.* 1662.
vulneraria, *L.* 1663.
montana, *L.* 1664.
Barba Jovis, *L.* 1665.
Hermanniæ, *L.* 1666.
LUPINUS hirsutus, *L.* 1667.
pilosus, *L.* 1668.
angustifolius, *L.* 1669.
luteus, *L.* 1670.
PISUM sativum, *L.* 1671.
arvense, *L.* 1672.
fulvum, 1673.
OROBUS lathyroides, *L.* 1675.
hirsutus, *L.* 1676.
luteus, *L.* 1677.
vernus, *L.* 1678.
tuberosus, *L.* 1679.
sessilifolius, 1680.
niger, *L.* 1681.
LATHYRUS Ochrus, *DeCand.* (Pisum, 1674.)
Aphaca, *L.* 1682.
Nissolia, *L.* 1683.
amphicarpos, *L.* 1684.
LATHYRUS Cicera, *L.* 1685.
sativus, *L.* 1686.
setifolius, *L.* 1687.
angulatus, *L.* 1688.
purpureus, *Desf.* (alatus, 1689.)
grandiflorus, 1691.
annuus, *L.* 1692.
hirsutus, *L.* 1693.
Clymenum, *L.* 1694.
pratensis, *L.* 1695.
sylvestris, *L.* 1696.
latifolius, *L.* 1697.
VICIA pisiformis, *L.* 1698.
dumetorum, *L.* 1699.
variegata, *W.* 1700.
tenuifolia, *Roth.* (polyphylla, 1701.)
Cracca, *L.* 1702.
onobrychoides, *L.* 1703.
benghalensis, *L.* 1704.
canescens, *Lab.* 1705.
ciliaris, 1706.
sativa, *L.* 1707.
lathyroides, *L.* 1708.
lutea, *L.* 1709.
hybrida, *L.* 1710.
tricolor, *Sebast.* (melanops, 1711.)
peregrina, *L.* 1712.
scpium, *L.* 1713.
bithynica, *L.* 1714.
narbonensis, *L.* 1715.
ERVUM monanthos, *L.* (Lathyrus, 1690.)
tetraspermum, *L.* 1716.
vicioides, *Desf.* 1717.
hirsutum, *L.* 1718.
Ervilia, *L.* 1719.
Lens, *L.* (Cicer, 1721.)
CICER arietinum, *L.* 1720.
ADENOCARPUS intermedius, *DeCand.* (Cytisus divaricatus, 1722.)
CYTISUS lanigerus, *DeCand.* (Spartium villosum, 1646.)
ponticus, *W.* 1723.
sessilifolius, *L.* 1724.
hirsutus, *Sm.* nec *L.* 1725.
triflorus, *L'Her.* 1726.
COLUTEA arborescens, *L.* 1727.
GLYCYRRHIZA echinata, *L.* 1728.
glabra, *L.* 1729.
CORONILLA Emerus, *L.* 1730.
glauca, *L.* 1731.
minima, *L.* 1732.
varia, *L.* 1734.
cretica, *L.* 1735. (et parviflora, 1736.)
SECURIGERA Coronilla, *DeCand.* (Coronilla securidaca, 1733.)
ORNITHOPUS compressus, *L.* 1737.
ASTROLOBIUM scorpioides, *DeCand.* (Ornithopus, 1738.)
HIPPOCREPIS unisiliquosa, *L.* 1739.
multisiliquosa, *L.* 1740.
comosa, *L.* 1741.
SCORPIURUS vermiculata, *L.* 1742.
lævigata, 1743.
acutifolia, *Viv.* (sulcata, 1744.)
ALHAGI maurorum, *Tourn.* (Hedysarum Alhagi, 1745.)
HEDYSARUM spinosissimum, *L.* 1746.
flexuosum, *L.* 1747.
ONOBRYCHIS venosa, *DeCand.* (Hedysarum, 1748.)
saxatilis, *All.* (Hedysarum, 1749.)

ONOBRYCHIS Caput Galli, *DeCand.* (Hedysarum, 1750.)
Crista Galli, *DeCand.* (Hedysarum, 1751.)
æquidentata, *DeCand.* (Hedysarum, 1752.)
GALEGA officinalis, *L.* 1753.
PHACA bœtica, *L.* 1754.
ASTRAGALUS Christianus, *L.* 1755.
tenuifolius, *L.* 1757.
Cicer, *L.* 1758.
glycyphyllos, *L.* 1759.
hamosus, *L.* 1760.
contortuplicatus, *L.* 1761.
bœticus, *L.* 1762.
Stella, *L.* 1763.
sesameus, *L.* 1764.
epiglottis, *L.* 1765.
Glaux, *L.* 1766.
barbatus, *Lam.* 1767.
monspessulanus, *L.* 1769.
incanus, *L.* 1770.
depressus, *L.* 1771.
caprinus, *L.* 1772.
lanigerus, *Desf.* 1773.
massiliensis, *Lam.* (angustifolius, 1774.)
aristatus, *W.* 1775.
creticus, *Lam.* 1776.
OXYTROPIS pilosa, *DeCand.* (Astragalus, 1756.)
montana, *DeCand.* (Astragalus, 1768.)
BISERRULA Pelecinus, *L.* 1777.
PSORALEA bituminosa, *L.* 1778.
EBENUS cretica, *L.* 1779.
Sibthorpii, *DeCand.* (pinnata, 1780.)
MELILOTUS messanensis, *Desf.* (Trifolium, 1781.)
sulcata, *Desf.* (Trifolium mauritanicum, 1782.)
spicata, *Lindl.* (Trifolium, 1783.)
officinalis, *W.* (Trifolium, 1784.)
italica, *Lam.* (Trifolium, 1785.)
cretica, *Lindl.* (Trifolium, 1786.)
TRIFOLIUM Lupinaster, *L.* 1787.
hybridum, *L.* 1788.
Vaillantii, *Lam.* 1789.
repens, *L.* 1790.
subterraneum, *L.* 1791.
globosum, *L.* 1792.
Cherleri, *L.* 1793.
lappaceum, *L.* 1794.
rotundifolium, 1795.
rubens, *L.* 1796.
pratense, *L.* 1797.
alpestre, *L.* 1798.
pannonicum, *L.* 1799.
ochroleucum, *L.* 1800.
incarnatum, *L.* 1801.
angustifolium, *L.* 1802.
arvense, *L.* 1803.
stellatum, *L.* 1804.
clypeatum, *L.* 1805.
scabrum, *L.* 1806.
uniflorum, *L.* 1807.
spumosum, *L.* 1808.
resupinatum, *L.* 1809.
tomentosum, *L.* 1810.
fragiferum, *L.* 1811.
montanum, *L.* 1812.
speciosum, *W.* 1813.
TRIFOLIUM agrarium, *L.* 1814.
procumbens, *L.* 1815.
TETRAGONOLOBUS purpureus, *DeCand.* (Lotus tetragonolobus, 1816.)
LOTUS edulis, *L.* 1817.
angustissimus, *L.* 1818.
ornithopodioides, *L.* 1821. (et 1819, diffusus.)
arabicus, *L.* 1820.
creticus, *L.* 1822.
corniculatus, *L.* 1825.
major, *Scop.* 1826.
DORYCNIUM hirsutum, *DeCand.* (Lotus, 1823.)
rectum, *DeCand.* (Lotus 1824.)
suffruticosum, *Vill.* (Lotus Dorycnium, 1827.)
latifolium, *W.* (Lotus 1828.)
TRIGONELLA corniculata, *L.* 1829.
elatior, 1830.
spicata, 1831.
hamosa, *L.* 1832.
monspeliaca, *L.* 1833.
Fœnum-Græcum, *L.* 1834.
MEDICAGO arborea, *L.* 1836.
radiata, *L.* 1836.
circinata, *L.* 1837.
sativa, *L.* 1838.
falcata, *L.* 1839.
lupulina, *L.* 1840.
orbicularis, *W.* 1841.
scutellata, *W.* 1842.
maculata, *W.* 1843.
coronata, *W.* 1844.
muricata, *W.* 1845.
marina, *L.* 1846.
minima, *W.* 1847.
CERATONIA Siliqua, *L.* 562.
SOPHORA alopecuroides, *L.* 914.
ANAGYRIS fœtida, *L.* 915.
CERCIS Siliquastrum, *L.* 916.

Ordo XXXI. ROSACEÆ.

PRUNUS Laurocerasus, *L.* 1138.
Mahaleb, *L.* 1139.
Cerasus, *L.* 1140.
domestica, *L.* 1141.
insititia, *L.* 1142.
spinosa, *L.* 1143.
prostrata, *Lab.* 1144.
AMYGDALUS communis, *L.* 1135.
græca, *Lindl.* (incana 1136, nec Pallasii. Hujus diagnosis erit *A. græca* ramis spinosis tomentosis, foliis obovatis retusis serratis subtùs et margine tomentoso-niveis, calycibus tubulosis.)
nana, *L.* 1137.
RUBUS idæus, *L.* 1170.
tomentosus, *W.* 1171.
cæsius, *L.* 1172.
fruticosus, *L.* 1173.
FRAGARIA vesca, *L.* 1174.
sterilis, *L.* 1175.
POTENTILLA supina, *L.* 1176.
recta, *L.* 1177.
argentea, *L.* 1178.
hirta, *L.* 1179.
astracanica, *W.* 1180.
aurea, *L.* 1181.
opaca, *L.* 1182.
POTENTILLA Tormentilla, *Nestl.* 1185.
reptans, *L.* 1183.
speciosa, *W.* 1184.
GEUM urbanum, *L.* 1186.
rivale, *L.* 1187.
coccineum, 1188.
AGRIMONIA Eupatoria, *L.* 1088.
Agrimonoides, *L.* 1089.
ALCHEMILLA vulgaris, *L.* 374.
alpina, *L.* 375.
arvensis, *L.* 376.
SANGUISORBA officinalis, *L.* 363.
POTERIUM Sanguisorba, *L.* 2256.
villosum, 2257.
spinosum, *L.* 2258.
ROSA spinosissima, *L.* 1164.
villosa, *L.* 1165.
pulverulenta, *M.B.* (glutinosa, 1166.)
rubiginosa, *L.* 1167.
sempervirens, *L.* 1168.
canina, *L.* 1169.
MESPILUS germanica, *L.* 1145.
CRATÆGUS Pyracantha, *Pers.* (Mespilus, 1146.)
torminalis, *L.* (Pyrus, 1155.)
Oxyacantha, *L.* (Mespilus, 1147.)
var. monogyna, *Jacq.* (Mespilus, 1148.)
Azarolus, *L.* (Mespilus, 1149.)
tanacetifolia, *Pers.* (Mespilus, 1150.)
orientalis, *Bosc.* (Mespilus tanacetifolia β. 1150.)
PYRUS communis, *L.* 1151.
Malus, *L.* 1152.
salicifolia, *L.* 1154.
Chamæmespilus, *L.* 1158.
Aria, *Sm.* 1159.
aucuparia, *Gærtn.*, 1160.
domestica, *Sm.* 1161.
CYDONIA vulgaris, *Pers.* (Pyrus Cydonia, 1153.)
AMELANCHIER vulgaris, *Mœnch.* (Pyrus Amelanchier, 1156.)
cretica, *DeCand.* (Pyrus, 1157.)

Ordo XXXII. ONAGRACEÆ.

EPILOBIUM angustifolium, *L.* 864.
angustissimum, *W.* 865.
hirsutum, *L.* 866.
parviflorum, *Sm.* 867.
montanum, *L.* 868.
tetragonum, *L.* 869.
palustre, *L.* 870.
alpinum, *L.* 871.
CIRCÆA lutetiana, *L.* 13.
ISNARDIA palustris, *L.* 367.
TRAPA natans, *L.* 368.

Ordo XXXIII. HALORAGEÆ.

MYRIOPHYLLUM spicatum, *L.* 2254.

Ordo XXXIV. CALLITRICHACEÆ.

CALLITRICHE aquatica, *Sm.* 6.

Ordo XXXV. LYTHRACEÆ.

LYTHRUM Salicaria, *L.* 1084.
virgatum, *L.* 1085.
hyssopifolium, *L.* 1086.

Lythrum thymifolium, *L.* 1087.
Peplis Portula, *L.* 838.

Ordo XXXVI. Tamaricaceæ.

Tamarix gallica, *L.* 724.

Ordo XXXVII. Myrtaceæ.

Myrtus communis, *L.* 1133.
Punica Granatum, *L.* 1134.

Ordo XXXVIII. Cucurbitaceæ.

Momordica Elaterium, *L.* 2251.
Bryonia dioica, *L.* 2252.
cretica, *L.* 2253.

Ordo XXXIX. Portulacaceæ.

Portulaca oleracea, *L.* 1083.
Montia fontana, *L.* 266.

Ordo XL. Illecebraceæ.

Herniaria glabra, *L.* 577.
hirsuta, *L.* 578.
macrocarpa, 579.
Corrigiola littoralis, *L.* 725.
Paronychia Smithii, *DeCand.* (Illecebrum cymosum, 565.; I. echinatum, t. 245.)
argentea, *Lam.* (Illecebrum, 566.)
capitata, *Lam.* (Illecebrum, 567.)
Polycarpon tetraphyllum, *L.* 268.
Scleranthus annuus, *L.* 938.
polycarpus, *L.* 939.

Ordo XLI. Crassulaceæ.

Umbilicus serratus, *DeCand.* (Cotyledon, 1040.)
pendulinus, *DeCand.* (Cotyledon Umbilicus, 1041.)
erectus, *DeCand.* (Cotyledon lutea, 1042.)
parviflorus, *DeCand.* (Cotyledon, 1043.)
Sedum Telephium, *L.* 1044.
Aizoon, *L.* 1045.
stellatum, *L.* 1046.
amplexicaule, *DeCand.* (Sempervivum tenuifolium, 1132.)
Cepæa, *L.* 1047.
var. tetraphylla, 1048.
eriocarpum, 1049.
dasyphyllum, *L.* 1050.
acre, *L.* 1051.
sexangulare, *L.* 1052.
atratum, *L.* 1053.
saxatile, *Wiggers.* 1054.
hispanicum, *L.* 1055.
album, *L.* 1056.
reflexum, *L.* 1057.
ochroleucum, 1058.
rupestre, *L.* 1059.
Sedum rubens, *DeCand.* (Crassula, 753.)
Crassula? microcarpa, 754.
Sempervivum arboreum, *L.* 1127.
tectorum, *L.* 1128.
globiferum, *L.* 1129.
hirtum, *L.* 1130.
montanum, *L.* 1131.

Ordo XLII. Mesembryaceæ.

Mesembryanthemum nodiflorum, *L.* 1162.
crystallinum, *L.* 1163.
Glinus lotoides, *L.* 1126.

Ordo XLIII. Grossulaceæ.

Ribes Grossularia, *L.* 538.
var. *Uva crispa*, *L.* 559.

Ordo XLIV. Saxifragaceæ.

Saxifraga media, *Gouan.* 929.
androsacea, *L.* 930.
Geum, *L.* 931.
rotundifolia, *L.* 932.
granulata, *L.* 933.
tridactylites, *L.* 934.
cæspitosa, *L.* 935.
cymbalaria, *L.* 936.
hederacea, *L.* 937.

Ordo XLV. Apiaceæ *s.* Umbelliferæ.

Lagoecia cuminoides, *L.* 563.
Eryngium maritimum, *L.* 607.
tricuspidatum, *L.* 608.
campestre, *L.* 609.
creticum, *Lam.* (cyaneum, 610.)
multifidum, 611.
glomeratum, *Lam.* (parviflorum, 612.)
Hydrocotyle vulgaris, *L.* 613.
Sanicula europæa, *L.* 614.
Bupleurum rotundifolium, *L.* 615.
Odontites, *L.* 616.
nodiflorum, 617.
glumaceum, 618.
semicompositum, *L.* 619.
ranunculoides, *L.* 620.
tenuissimum, *L.* 621.
junceum, *L.* (Gerardi, 622.)
fruticosum, *L.* 624.
Sibthorpianum, 625.
Echinophora spinosa, *L.* 626.
tenuifolia, *L.* 627.
Hasselquistia ægyptiaca, *L.* 628.
Tordylium syriacum, *L.* 629.
officinale, *L.* 630.
apulum, *L.* 631.
maximum, *L.* 632.
Krubera leptophylla, *Hoffm.* (Tordylium peregrinum, 633.)
Caucalis daucoides, *L.* 635.
leptophylla, *L.* 638.
Orlaya grandiflora, *Hoffm.* (Caucalis, 634.)
platycarpa, *Koch.* (Caucalis latifolia, 636.)
maritima, *Koch.* (Caucalis pumila, *W.* 657.)
Torilis Anthriscus, *Gmel.* (Caucalis, 639.)
nodosa, *Gærtn.* (Caucalis, 640.)
Artedia squamata, *L.* 641.
Daucus Carota, *L.* 642.
guttatus, 643.
bicolor, 644.
involucratus, 645.
muricatus, *β. DeCand.* (littoralis, 646.)
aureus, *Desf.*, 647.
Ammi majus, *L.* 648.
glaucifolium, *L.* 649.
Visnaga, *L.* 650.

Bunium ferulaceum, 651.
pumilum, 652.
Conium maculatum, *L.* 653.
Libanotis vulgaris, *ε. DeCand.* (Athamanta verticillata, 654.)
Ligusticum cyprium, *Spr.* (Athamanta multiflora, 655.)
Athamanta annua, *L.* 656.
Peucedanum officinale, *L.* 657.
alsaticum, *L.* 658.
Crithmum maritimum, *L.* 660.
Cachrys cristata, *DeCand.* (sicula, 661.)
Ferula communis, *L.* 662.
var. nodiflora, *L.* 663.
thyrsiflora, 664.
Ferulago, *L.* 665.
Laserpitium aquilegifolium, *W.* 666.
Siler, *L.* 667.
Zosimia absinthifolia, *DeCand.* (Heracleum tomentosum, 669.)
Heracleum sphondylium, *L.* 668.
aureum, 670.
humile, 671.
Physospermum cornubiense, *DeCand.* (Ligusticum, 672.)
Angelica sylvestris, *L.* 673.
Sium angustifolium, *L.* 674.
Helosciadium nodiflorum, *Koch.* (Sium, 675.)
Falcaria Rivini, *Host.* (Sium Falcaria, 676.)
Sison Amomum, *L.* 677.
Œnanthe fistulosa, *L.* 678.
prolifera, *L.* 679.
pimpinelloides, *L.* 680.
peucedanifolia, *Poll.* 681.
Coriandrum sativum, *L.* 682.
Bifora testiculata, *Spr.* (Coriandrum, 653.)
Myrrhis odorata, *Scop.* (Scandix, 684.)
Lecokia cretica, *DeCand.* (Scandix latifolia, 685.)
Scandix Pecten Veneris, *L.* 686.
australis, *L.* 687.
Anthriscus vulgaris, *Pers.* (Scandix Anthriscus, 688, nec non Chærophyllum sylvestre, 689.)
Chærophyllum hirsutum, *L.* 690.
aromaticum, *L.* 691.
Imperatoria Ostruthium, *L.* 692.
Carum rigidulum, *Koch.* (Seseli pimpinelloides, 693.)
Seseli montanum, *β. DeCand.* (glaucum, 694.)
coloratum, *Ehr.* (annuum, 695.)
tortuosum, *L.* 697.
junceum, 698.
cæspitosum, 699.
Ptychotis verticillata, *DeCand.* (Seseli ammoides, 696.)
Thapsia villosa, *L.* 700.
fœtida, *L.* 701.
Asclepium, *L.* 702.
Garganiea, *L.* 703.
Pastinaca sativa, *L.* 704.
obtusifolia, *DeCand.* (Peucedanum, 659.)
Opopanax chironium, *Koch.* (Pastinaca Opopanax, 705.)
Smyrnium perfoliatum, *L.* 706.
Olusatrum, *L.* 707.
Anethum graveolens, *L.* 708.
segetum, *L.* 709.

Fœniculum vulgare, *Gærtn.* (Anethum Fœniculum, 710.)
Pimpinella Anisum, *L.* 711.
Trinia vulgaris, *DeCand.* (Pimpinella dioica, 712.
Apium graveolens, *L.* 714.
Petroselinum sativum, *Hoffm.* (Apium Petrosclinum, 713.)
Ægopodium Podagraria, *L.* 715.

Ordo XLVI. Araliaceæ.

Hedera Helix, *L.* 560.

Ordo XLVII. Cornaceæ.

Cornus mascula, *L.* 365.
sanguinea, *L.* 366.

Ordo XLVIII. Loranthaceæ.

Loranthus europæus, *L.* 834.
Viscum album, *L.* 2306.

Ordo XLIX. Caprifoliaceæ.

Caprifolium perfoliatum. (Lonicera Caprifolium, 515.)
Periclymenum, *R. et S.* (Lonicera, 516.)
Lonicera nigra, *L.* 517.
Xylosteum, *L.* 518.
alpigena, *L.* 519.
Viburnum Lantana, *L.* 718.
Opulus, *L.* 719.
Sambucus Ebulus, *L.* 720.
nigra, *L.* 721.
racemosa, *L.* 722.

Ordo L. Galiaceæ.

Sherardia arvensis, *L.* 299.
Asperula odorata, *L.* 302.
Aparine, *M. B.* (rivalis, 303.)
galioides, *M. B.* (longifolia, 304, nec non Galium glaucum, 326.)
arvensis, *L.* 305.
incana, 306.
tinctoria, *L.* 307.
lutea, 308.
cynanchica, *L.* 309.
rigida, 310.
littoralis, 311.
suberosa, 312.
nitida, 313.
Galium murale, *DeCand.* (Sherardia, 300.)
verticillatum, *Danth.* (Sherardia erecta, 301.)
cruciatum, *Sm.* 314.
coronatum, 315.
apricum, 316.
junceum, 317; G. boreali affine.
palustre, *L.* 318.
suberosum, 319.
apiculatum, 320.
incanum, 321.
pumilum, *Lam.* (pyrenaicum, 322.)
verum, α. *DeCand.* (incurvum, 323.)
Mollugo, *L.* 325.
purpureum, *L.* 327.
tricorne, *Sm.* 328.
saccharatum, *All.* (verrucosum, 329.)
Galium Aparine, *L.* 330.
setaceum, *Lam.* (floribundum, 331.)
Sibthorpii, *R. et S.* (capillare, 332.)
brevifolium, 333.
græcum, *L.* 334.
Valantia muralis, *L.* 335.
hispida, *L.* 336.
Crucianella angustifolia, *L.* 337.
latifolia, *L.* 338.
monspeliaca, *L.* 339. (a Cr. latifolia floribus pentameris nec tetrameris planè diversa.)
Rubia tinctorum, *L.* 340.
peregrina, *L.* 341.
lucida, *L.* 342.
Putoria calabrica, *Pers.* (Ernodea montana, 343.)

Ordo LI. Valerianaceæ.

Valerianella echinata, *DeCand.* (Valeriana, 76.)
olitoria, *Mönch.* (Valeriana Locusta, *L.* 77.)
vesicaria, *Mönch.* (Valeriana, 78.)
coronata, *DeCand.* (Valeriana, 79.)
discoidea, *Dufr.* (Valeriana, 80.)
Centranthus ruber, *DeCand.* (Valeriana, 69.)
angustifolius, *DeCand.* (Valeriana, 70.)
Calcitrapa, *Dufr.* (Valeriana, 71.)
orbiculatus, *Dufr.* (Valeriana, 72; rotundifolia, t. 31.)
Fedia Cornucopiæ, *DeCand.* (Valeriana, 73.)
Valeriana Dioscoridis, 74.
tuberosa, *L.* 75.

Ordo LII. Dipsaceæ.

Dipsacus sylvestris, *L.* 271.
laciniatus, *L.* 271.
Cephalaria alpina, *Schrad.* (Scabiosa, 272.)
græca, *R. et S.* (Scabiosa dccurrens, 274; flava, v. 2, 356.)
transylvanica, *Schrad.* (Scabiosa, 275.)
ambrosioides, *R. et S.* (Scabiosa, 276. A *C. transylvanica* cui cel. Candollio adjungitur certè diversa.)
syriaca, *Schrad.* (Scabiosa, 278.)
leucantha, *Schrad.* (Scabiosa, 279.)
Knautia bidens, *Lindl.* (Scabiosa, 277. A *K. hybridâ* foliorum lobis ovatis acutis dentatis ncc obovatis rotundatis diversa.)
arvensis, *Coult.* (Scabiosa, 282.)
var. integrifolia. (Scabiosa, 280.)
amplexicaulis, *Lindl.* (Scabiosa, 281.)
orientalis, *L.* 298.
Scabiosa columbaria, *L.* 283.
ucranica, *L.* (sicula, 284, et argentea, 288.)
var. eburnea, 286.
maritima, *L.* 285.
prolifera, *L.* 287.
africana, *L.* 289.
ochroleuca, *L.* 290.
crenata, *Cyr.* (coronopifolia, 297.)
Pterocephalus palæstinus, *Coult.* (Scabiosa brachiata, 291.)
var. Sibthorpianus. (Scabiosa, 292.)
plumosus, *Coult.* (Scabiosa, 293.)
papposus, *Coult.* (Scabiosa, 294.)
Pterocephalus perennis, *Vaill.* (Scabiosa pterocephala, 295.)
tomentosus, *Coult.* (Scabiosa, 296.)
Morina persica, *L.* 67.

Ordo LIII. Compositæ *s.* Asteraceæ.

* *Eupatoriaceæ.*

Eupatorium cannabinum, *L.* 2021.
syriacum, *Jacq.* 2022.
Petasites vulgaris, *Desf.* (Tussilago Petasites, 2058.)
Tussilago Farfara, *L.* 2027.

** *Asteroideæ.*

Bellidiastrum Michelii, *Cass.* (Doronicum Bellidiastrum, 2085.)
Aster Amellus, *L.* 2068.
Tripolium vulgare, *Nees.* (Aster Tripolium, 2067.)
Erigeron canadense, *L.* 2054.
acre, *L.* 2055.
alpinum, *DeCand.* (uniflorum, 2056.)
Alunia graveolens, *Lindl.* (Erigeron, 2053.)
Bellis perennis, *L.* 2086.
dentata, *DeCand.* (annua, 2087.)
Bellium bellidioides, *L.* 2088.
Solidago virgaurca, *L.* 2069.
Linosyris vulgaris, *Cass.* (Chrysocoma Linosyris, 2023.)
Phagnalon rupestre, *DeCand.* (Conyza saxatilis, 2048.)
var. pumilum. (Conyza, 2049.)
Evax pygmæa, *DeCand.* (Filago, 2169.)
exigua, *DeCand.* (Filago, 2170.)
Micropus erectus, *L.* 2171.
Inula Conyza, *DeCand.* (Conyza squarrosa, 2047.)
candida, *DeCand.* (Conyza, 2050.)
limoniifolia, *Lindl.* (Conyza, 2057.)
viscosa, *Ait.* (Erigeron, 2052.)
Helenium, *L.* 2072.
Oculus Christi, *L.* 2074.
Britannica, *L.* 2075.
dentata, 2078.
hirta, *L.* 2079.
germanica, *L.* 2080.
spiræifolia, *L.* (squarrosa, 2081.)
crithmoides, *L.* 2082.
Pulicaria odora, *Rchb.* (Inula, 2073.)
dysenterica, *Gærtn.* (Inula, 2076.)
vulgaris, *Gærtn.* (Inula pulicariâ, 2077.)
Pallenis spinosa, *Cass.* (Buphthalmum, 2129.)
Asteriscus aquaticus, *Mönch.* (Buphthalmum, 2131.)
maritimus, *Mönch.* (Buphthalmum, 2131.)
Xanthium strumarium, *L.* 2246.

*** *Senecionideæ.*

Bidens tripartita, *L.* 2018.
var. minima, *L.* 2019.
Anthemis Cota, *L.* 2100.
austriaca, *Jacq.* 2108. (et altissima, 2101.)
anglica, *Spr.* (maritima, 2102.)
tomentosa, *L.* 2103.
peregrina, *L.* 2104.
Chia, *L.* 2105.

Anthemis arvensis, *L.* 2106.
montana, *L.* 2109.
pontica, *W.* 2110.
secundiramea, *Bivon.* (australis, 2111.)
rosea, 2112.
ageratifolia, 2113.
tinctoria, *L.* 2116. (nec non coarctata, 2114.)
var. discoidea, 2115.
Lyonnetia pusilla, *Cass.* (Anacyclus creticus, 2099.)
alpina, *Lindl.* (Santolina, 2025.)
montana, *Lindl.* (Santolina, 2026.)
rigida, *DeCand.* (Santolina, 2027.)
abrotanifolia, *Less.* (Santolina anthemoides, 2028.)
Ptarmica oxyloba, *DeCand.* (Anthemis alpina, 2107.)
umbellata, *DeCand.* (Achillea, 2117.)
atrata, *DeCand.* (Achillea, 2119.)
moschata, *DeCand.* (Achillea, 2120.)
Achillea cretica, *DeCand.* (Santolina, 2118.
Tournefortii, *DeCand.* (ægyptiaca, 2121.)
clypeolata, 2122.
holosericea, 2123. (flabelliformis, t. 894.)
pubescens, *L.* 2124.
sylvatica, *Ten.*? (magna, 2125.)
tomentosa, *L.* 2126.
ligustica, *All.* 2127.
odorata, *L.* 2128.
Diotis candidissima, *Desf.* (Santolina maritima, 2024.)
Matricaria Chamomilla, *L.* 2096.
Pyrethrum Parthenium, *L.* 2094.
fuscatum, *W.* 2095.
Leucanthemum vulgare, *Lam.* (Chrysanthemum Leucanthemum, 2089.)
var. montanum. (Chrysanth. 2090.)
pectinatum, *DeCand.* (Chrysanth. 2093.)
Chrysanthemum segetum, *L.* 2091.
coronarium, *L.* 2092.
Artemisia arborescens, *L.* 2030.
spicata, *W.* 2031.
campestris, *L.* 2032.
maritima, *L.* 2033.
vulgaris, *L.* 2034.
Plagius uliginosus, *Lindl.* (Tanacetum, 2029.)
aureus, *Lindl.* (Cotula, 2097.)
var. complanatus. (Cotula, 2098.)
Senecio verbaseifolius, *Lindl.* (Cacalia, 2020.)
vulgaris, *L.* 2059.
crassifolius, *W.* 2060.
lividus, *L.* 2061.
vernalis, *W. et K.* (trilobus, 2062.)
viscosus, *L.* 2063.
Jacobæa, *L.* 2064.
aquaticus, *Sm.* 2065.
fruticulosus, 2066.
Cineraria, *DeCand.* (Cineraria maritima, 2070.)
Othonnæ, *M. B.* (Cineraria anomala, 2071.)
Aronicum scorpioides, *DeCand.* (Arnica, 2083.)
Doronicum Pardalianches, *L.* 2084.
Trichogyne cauliflora, *DeCand.* (Gnaphalium supracanum, 2041.)
Filago gallica, *L.* (Gnaphalium, 2043.)
germanica, *L.* (Gnaphalium, 2044.)
Gnaphalium luteo-album, *L.* 2038.
sylvaticum, *L.* (rectum, 2040.)
uliginosum, *L.* 2042.
Helichrysum angustifolium, *DeCand.* (Gnaphalium Stœchas, 2035.)
orientale, *DeCand.* (Gnaphalium, 2036.)
arenarium, *DeCand.* (Gnaphalium, 2037.)
virgineum, *DeCand.* (Gnaphalium, 2039.)

**** *Cynareæ.*

Calendula arvensis, *L.* 2168.
Echinops viscosus, *DeCand.* (sphærocephalus, 2172.)
Ritro, *DeCand.* (spinosus, 2173.)
microcephalus, 2174. (lanuginosus, t. 925.)
græcus, *DeCand.* (lanuginosus, 2175.)
Cardopatum corymbosum, *Pers.* (Carthamus, 2013.)
Xeranthemum annuum, *L.* 2045.
cylindricum, *L.* 2046.
Arctium Lappa, *L.* 1968.
Stæhelina arborescens, *L.* 2014.
fruticosa, *L.* 2015.
unifloculosa, 2016.
Carlina lanata, *L.* 2004.
corymbosa, *L.* 2005.
vulgaris, *L.* 2006.
gummifera, *Less.* (Acarna, 2007.)
Atractylis cancellata, *L.* 2008.
Onopordon Acanthium, *L.* 1993.
elongatum, *Lam.* (macracanthum, 1994, necnon illyricum, 1995.)
græcum, *Gouan.* 1996.
arabicum, *L.* 1997.
virens, *DeCand.* (elatum, 1998.)
acaulon, *L.* 1999.
Carduus nutans, *L.* 1972.
acanthoides, *L.* 1973.
crispus, *L.* 1974.
tenuiflorus, *W.* 1975.
argentatus, *L.* 1976.
Cynara Scolymus, *L.* 2000.
spinosissima, *Presl.* (horrida, 2001.)
cornigera, *Lindl.* (humilis, 2002.)
Chamæpeuce montana, *DeCand.* (Serratula Chamæpeuce, 2017.)
afra, *DeCand.* (Carduus, 1990.)
stellata, *DeCand.* (Carduus, 1991.)
Cirsium palustre, *Scop.* (Cnicus, 1980.)
lanceolatum, *Scop.* (Cnicus, 1982.)
ferox, *DeCand.* (Cnicus, 1983.)
var. cynaroides, 1985.
eriophorum, *Scop.* (Cnicus, 1984.)
heterophyllum, *DeCand.* (Cnicus, 1986.)
serratuloides, *DeCand.* (Cnicus, 1987.)
tricephalodes, *DeCand.* (Cnicus rivularis, 1988.)
arvense, *Scop.* (Cnicus, 1989.)
Picnomon Acarna, *Cass.* (Cnicus, 1981.)
Notobasis syriaca, *Cass.* (Cnicus, 1992.)
Rhaponticum acaule, *DeCand.* (Cynara acaulis, 2003.)
Serratula tinctoria, *L.* 1969.
centauroides, *L.* 1970.
Jurinea mollis, *DeCand.* (Carduus, 1978.)
Jurinea glycacantha, *DeCand.* (Carduus, 1979.)
Centaurea cerinthifolia, 2133.
uniflora, *L.* 2134.
montana, *L.* 2135.
cana, 2136.
Cyanus, *L.* 2137.
cuneifolia, 2138.
paniculata, *L.* 2139.
spinosa, *L.* 2140.
ragusina, *L.* 2141.
Behen, *L.* 2142.
Jacea, *L.* 2143.
alba, *L.* 2144.
sonchifolia, *L.* 2145.
sphærocephala, *L.* 2146.
napifolia, *L.* 2147.
ægyptiaca, *L.* 2149.
Calcitrapa, *L.* 2150.
solstitialis, *L.* 2151.
melitensis, *L.* 2152.
sicula, *L.* 2153.
drabifolia, 2154.
acicularis, 2155.
squarrosa, *W.* 2156.
diffusa, *Lam.* (parviflora, 2157.)
eryngioides, *W.* 2158.
centaurioides, *L.* 2159.
collina, *L.* 2160.
rupestris, *L.* 2161.
coronopifolia, *W.* 2162.
rutifolia, 2163.
raphanina, 2164.
armoracifolia, 2165.
pumila, *L.* 2166.
Cnicus benedictus, *DeCand.* (Centaurea, 2148.)
Galactites tomentosa, *Mönch.* (Centaurea Galactites, 2167.)
Crupina vulgaris, *DeCand.* (Centaurea crupina, 2132.)
Kentrophyllum dentatum, *DeCand.* (Carthamus, 2009.)
lanatum, *DeCand.* (Carthamus, 2010.)
leucocaulon, *DeCand.* (Carthamus, 2011.)
Carduncellus cœruleus, *DeCand.* (Carthamus, 2012.)
Silybum marianum, *Gærtn.* (Carduus, 1977.)
Tyrimnus leucographus, *Cass.* (Carduus, 1971.)

***** *Cichoraceæ.*

Scolymus maculatus, *L.* 1966.
hispanicus, *L.* 1967.
Hypochæris arachnoides, *Bivon.* (minima, 1954.)
radicata, *L.* 1955.
Seriola lævigata, *L.* 1951.
ætnensis, *L.* 1952.
urens, *L.* 1953.
Lapsana communis, *L.* 1956.
Rhagadiolus stellatus, *W.* (Lapsana, 1957.)
var. edulis, *W.* (Lapsana, 1958.)
Kölpinia linearis, *Pall.* (Lapsana, 1959.)
Catananche lutea, *L.* 1961.
Tolpis barbata, *W.* 1942.
quadriaristata, *Bivon.* 1943.
Hyoseris radiata, *L.* 1946.
scabra, *L.* 1947.

HEDYPNOIS polymorpha, *DeCand.* (monspeliensis, 1948.)
var. rhagadioloides, *W.* 1949.
cretica, *W.* 1950.
CICHORIUM Intybus, *L.* 1962.
pumilum, *W.* 1963.
Endivia, *L.* 1964.
spinosum, *L.* 1965.
HYMENONEMA græcum, *DeCand.* (Scorzonera elongata, 1886.)
SCORZONERA tomentosa, *L.* 1876.
humilis, *L.* (austriaca, 1877.)
pygmæa, 1878.
glastifolia, *W.* (graminifolia, 1879.)
arancosa, 1880.
crocifolia, 1881.
purpurea, *L.* 1882.
cretica, *W.* 1883.
TRAGOPOGON pratensis, *L.* 1868.
hirsutus, *Gouan.* (Geropogon, 1867.)
undulatus, *Jacq.* 1869.
major, *Jacq.* 1870.
parvifolius, *L.* 1871.
crocifolius, *L.* 1872.
HELMINTHIA echioides, *Gærtn.* (Picris, 1910.)
asplenioides, *DeCand.* (Picris, 1911.)
LEONTODON hispidum, *L.* (Apargia, 1908.)
THRINCIA tuberosa, *DeCand.* (Apargia, 1906.)
hirta, *DeCand.* (Apargia, 1909.)
PICRIS hieracioides, *L.* 1911.
pauciflora, *W.* 1912.
OPORINIA autumnalis, *Don.* (Apargia, 1907.)
PODOSPERMUM calcitrapifolium, *DeCand.* (Scorzonera, 1884.)
laciniatum, *DeCand.* (Scorzonera, 1885.)
UROSPERMUM Dalechampii, *Desf.* (Arnopogon, 1873.)
picroides, *Desf.* (Arnopogon, 1874.)
asperum, *DeCand.* (Arnopogon, 1875.)
GEROPOGON glaber, *L.* 1866.
LACTUCA Scariola, *L.* 1895.
virosa, *L.* 1896.
saligna, *L.* 1897.
leucophæa, 1898.
muralis, *DeCand.* (Prenanthes, 1902.)
CHONDRILLA junca, *L.* 1899.
ramosissima, 1900.
PHÆNOPUS vimineus, *DeCand.* (Prenanthes, 1901.)
TARAXACUM Dens Leonis, *Desf.* (Leontodon Taraxacum, 1903.)
serotinum, *Sadl.* (Leontodon, 1904.)
lævigatum, *DeCand.* (Leontodon, 1905.)
radicatum, *Lindl.* (Crepis, 1927.)
CREPIS alpestris, *Taeusch.* (Hieracium, 1914.)
fœtens, *Fröl.* (Hieracium, 1919.)
incana, 1930.
neglecta, *L.* 1934.
muricata, 1936.
fuliginosa, 1937.
pulchra, *L.* 1938.
biennis, *L.* 1940.
hyoseroides, 1941.
ÆTHEORHIZA bulbosa, *Cass.* (Hieracium, 1916.)
BARKHAUSIA bursifolia, *Spr.* (Crepis, 1926.)
vesicaria, *Spr.* (Crepis, 1928.)
rubra, *Mönch.* (Crepis, 1929.)
fœtida, *DeCand.* (Crepis, 1931.)
interrupta, *Lindl.* (Crepis, 1932.)
ENDOPTERA aspera, *Lindl.* (Crepis, 1933.)
multiflora, *Lindl.* (Crepis, 1935.)
Dioscoridis, *DeCand.* (Crepis, 1939.)
PICRIDIUM vulgare, *Desf.* (Sonchus, 1894; necnon Sonchus chondrilloides, 1892.)
tingitanum, *Desf.* (Sonchus, 1893.)
SONCHUS palustris, *L.* 1887.
arvensis, *L.* 1888.
maritimus, *L.* 1889.
oleraceus, *L.* 1890.
tenerrimus, *L.* 1891.
ZACINTHA verrucosa, *Gærtn.* 1960.
HIERACIUM alpinum, *L.* 1915.
Pilosella, *L.* 1917.
Auricula, *L.* 1918.
parvifolium, *L.* 1920.
murorum, *L.* 1921.
crinitum, 1922.
villosum, *L.* 1923.
bracteolatum, 1924.
sabaudum, *L.* 1925.
tomentosum, *All.* (Andryala lanata, 1945.)
ANDRYALA dentata, 1944.

Ordo LIV. CAMPANULACEÆ.

CAMPANULA rotundifolia, *L.* 475.
spathulata, 476.
patula, *L.* 477.
ramosissima, 478.
persicifolia, *L.* 479.
versicolor, *Andr.* 481.
heterophylla, *L.* 483.
saxatilis, *L.* 484.
Cymbalaria, 485.
Trachelium, *L.* 486.
glomerata, *L.* 487.
stricta, *L.* 488.
cichoracea, 489.
Medium, *L.* 490.
betonicifolia, 491.
dichotoma, *L.* 492.
Andrewsii, *A. DeCand.* (laciniata, 493.)
anchusiflora, 494.
rupestris, 495.
Erinus, *L.* 496.
drabifolia, 497.
WAHLENBERGIA graminifolia, *A. DeCand.* (Campanula, 480.)
ADENOPHORA lilifolia, *Led.* (Campanula, 482.)
SPECULARIA Speculum, *A. DeCand.* (Campanula, 498.)
hybrida, *A. DeCand.* (Campanula, 499.)
PHYTEUMA repandum, 500.
campanuloides, *M. B.* (ellipticum, 501.)
limonifolium, 502.
amplexicaule, 503.
PETROMARULA pinnata, *A. DeCand.* (Phyteuma, 504.)
JASIONE montana, *L.* 505.

Ordo LV. LOBELIACEÆ.

LAURENTIA tenella, *A. DeCand.* (Lobelia setacea, 506.)

Ordo LVI. VACCINACEÆ.

VACCINIUM Myrtillus, *L.* 873.

Ordo LVII. ERICACEÆ.

CALLUNA vulgaris, *Salisb.* 874.
BRUCKENTHALIA spiculiflora, *Reichb.* (Erica, 879.)
ERICA arborea, *L.* 875.
multiflora, *L.* 876.
vagans, *L.* (manipuliflora, 877.)
herbacea, *L.* 878.
ARBUTUS Unedo, *L.* 925.
Andrachne, *L.* 926.

Ordo LVIII. PYROLACEÆ.

PYROLA secunda, *L.* 927.

SUB-CLASSIS III. COROLLIFLORÆ.

Ordo LIX. EBENACEÆ.

DIOSPYROS Lotus, *L.* 894.

Ordo LX. STYRACEÆ.

STYRAX officinale, *L.* 928.

Ordo LXI. OLEACEÆ.

LIGUSTRUM vulgare, *L.* 8.
PHILLYREA media, *L.* 9.
latifolia, *L.* 10.
OLEA europæa, *L.* 11.
ORNUS europæa, *Pers.* (Fraxinus Ornus, *L.* 12.)

Ordo LXII. JASMINACEÆ.

JASMINUM fruticans, *L.* 7.

Ordo LXIII. ASCLEPIADACEÆ.

PERIPLOCA græca, *L.* 571.
CYNANCHUM acutum, *L.* 572.
monspeliacum, *L.* 573.
erectum, *L.* 574.
vincetoxicum. (Asclepias, 576.)

Ordo LXIV. APOCYNACEÆ.

VINCA minor, *L.* 569.
APOCYNUM venetum, *L.* 575.
NERIUM Oleander, *L.* 570.

Ordo LXV. GENTIANACEÆ.

GENTIANA asclepiadea, *L.* 604.
verna, *L.* 605.
Amarella, *L.* 606.

ERYTHRÆA Centaurium, *Pers.* (Chironia, 543.)
maritima, *Pers.* 544.
spicata, *Pers.* 545.
CHLORA perfoliata, *L.* 872.
CICENDIA filiformis, *Rchb.* (Exacum, 344.)

Ordo LXVI. CONVOLVULACEÆ.

CALYSTEGIA sepium, *R. Br.* (Convolvulus, 458.)
Soldanella, *R. Br.* (Convolvulus, 474.)
CONVOLVULUS arvensis, *L.* 457.
Scammonia, *L.* 459.
farinosus, *L.* 460.
sagittifolius, 461.
althæoides, *L.* 462.
tenuissimus, 463.
siculus, *L.* 464.
pentapetaloides, *L.* 465.
evolvuloides, *Desf.* 466.
lineatus, *L.* 467.
Cneorum, *L.* 468.
cantabrica, *L.* 469.
suffruticosus, *Desf.* 470.
Dorycnium, *L.* 471.
lanatus, *Vahl.* 472.
persicus, *L.* 473.
CRESSA cretica, *L.* 598.
CUSCUTA epithymum, *L.* 602.
monogyna, *W.* 603.

Ordo LXVII. BORAGINACEÆ.

HELIOTROPIUM europæum, *L.* 390.
supinum, *L.* 391.
MYOSOTIS scorpioides, *L.* 392.
nana, *W.* 393.
ECHINOSPERMUM Lappula, *Lehm.* (Myosotis, 394.)
LITHOSPERMUM apulum, *W.* 395.
tenuiflorum, *L.* 396.
officinale, *L.* 397.
arvense, *L.* 398.
orientale, *W.* 399.
purpuro-cœrulcum, *L.* 400.
fruticosum, *L.* 401.
hispidulum, 402.
dispermum, *L.* 403.
ANCHUSA paniculata, *Ait.* 404.
angustifolia, *L.* 405.
undulata, *L.* 406.
amplexicaulis, 407.
tinctoria, 408.
aggregata, *Lehm.* (parviflora, 409.)
cæspitosa, *W.* 411.
variegata, *Lehm.* (Lycopsis, 430.)
ovata, *Lehm.* (Lycopsis orientalis, *L.* 431.)
CYNOGLOSSUM officinale, *L.* 412.
apenninum, *L.* 413.
OMPHALODES lithospermifolia, *Lehm.* 414.
PULMONARIA officinalis, *L.* 415.
SYMPHYTUM officinale, *L.* 416.
tuberosum, *L.* 417.
CERINTHE aspera, *W.* 418.
retorta, 419.
minor, *L.* 420.
ONOSMA orientale, *L.* 421.
stellulatum, *M. B.* (montanum, 422.)
echioides, *L.* 423.
erectum, 424.
ONOSMA fruticosum, 425.
BORAGO officinalis, *L.* 426.
orientalis, *L.* 427.
cretica, *W.* 428.
ASPERUGO procumbens, *L.* 429.
LYCOPSIS Sibthorpiana, *Lehm.* (Anchusa ventricosa, 410.)
ECHIUM plantagineum, *L.* 432.
italicum, *L.* 433.
vulgare, *L.* 434.
pustulatum, 435.
elegans, *Lehm.* (hispidum, 436.)
diffusum, 437.
creticum, 438.

Ordo LXVIII. SOLANACEÆ.

DATURA Stramonium, *L.* 530.
HYOSCYAMUS niger, *L.* 531.
albus, *L.* 532.
aureus, *L.* 533.
MANDRAGORA officinalis, *Mill.* (Atropa Mandragora, 534.)
ATROPA Belladonna, *L.* 535.
PHYSALIS somnifera, *L.* 536.
Alkekengi, *L.* 537.
SOLANUM Dulcamara, *L.* 538.
nigrum, *L.* 539.
sodomeum, *L.* 540.
LYCIUM barbarum, *L.* 541.
europæum, *L.* 542.

Ordo LXIX. SCROPHULARIACEÆ.

VERBASCUM Thapsus, *L.* 521.
phlomoides, *L.* 522.
auriculatum, 523.
plicatum, 524.
sinuatum, *L.* 525.
pinnatifidum, *Vahl.* 526.
spinosum, *L.* 527.
Blattaria, *L.* 528.
triste, 529.
VERONICA spuria, *L.* 14.
spicata, *L.* 15.
pinnata, *L.* 16.
officinalis, *L.* 17.
gentianoides, *Sm.* 18.
thymifolia, 19.
serpyllifolia, *L.* 20.
Beccabunga, *L.* 21.
Anagallis, *L.* 22.
Teucrium, *L.* 23.
prostrata, *L.* 24.
pectinata, *L.* 25.
Chamædrys, *L.* 26.
latifolia, *L.* 27.
austriaca, *L.* 28.
var. multifida, *L.* 29.
glauca, 30.
agrestis, *L.* 31.
Buxbaumii, *Ten.* (V. agrestis Byzantiaca, 31 *β.*)
arvensis, *L.* 32.
hederifolia, *L.* 33.
Cymbalaria, *Vahl.* 34.
triphyllos, *L.* 35.
acinifolia, *L.* 36.
BARTSIA Trixago, *L.* 1423.
viscosa, *L.* 1424.
latifolia, 1425.
ODONTITES verna, *Reichb.* (Bartsia odontites, 1426.)
EUPHRASIA officinalis, *L.* 1427.
MELAMPYRUM cristatum, *L.* 1428.
arvense, *L.* 1429.
PEDICULARIS flava, *Pall.* 1430.
LINARIA Cymbalaria, *Mill.* (Antirrhinum, 1431.)
spuria, *Mill.* (Antirrhinum 1432.)
Elatine, *Mill.* (Antirrhinum, 1433.)
cirrhosa, *W.* (Antirrhinum, 1434.)
ægyptiaca, *Dum. Cours.* (Antirrhinum, 1435.)
minor, *Desf.* (Antirrhinum, 1436.)
micrantha, *Spr.* (Antirrhinum, 1437.)
albifrons, *Spr.* (Antirrhinum, 1438.)
purpurea, *Mill.* (Antirrhinum, 1439.)
arvensis, *Desf.* (Antirrhinum, 1440.)
pelisseriana, *DeCand.* (Antirrhinum, 1441.)
chalepensis, *Mill.* (Antirrhinum, 1442.)
reflexa, *Desf.* (Antirrhinum, 1443.)
aparinoides, *Chav.* (Antirrhinum strictum, 1444.)
supina, *Desf.* (Antirrhinum, 1445.)
genistifolia, *Mill.* (Antirrhinum, 1446.)
vulgaris, *Mill.* (Antirrhinum Linaria, 1447.)
ANTIRRHINUM majus, *L.* 1448.
Orontium, *L.* 1449.
SCROPHULARIA nodosa, *L.* 1450.
aquatica, *L.* 1451.
peregrina, *L.* 1452.
Scorodonia, *L.* 1453.
canina, *L.* 1454.
lucida, *L.* 1455.
filicifolia, *Mill.* 1456.
livida, 1457.
bicolor, 1458.
frutescens, *L.* 1459.
heterophylla, *W.* 1459 *β.*
cæsia, 1460.
CELSIA orientalis, *L.* 1461.
Arcturus, *L.* 1462.
DIGITALIS lutea, *L.* 1463.
ferruginea, *L.* 1464.
leucophæa, 1465.
SIBTHORPIA europæa, *L.* 1466.
GRATIOLA officinalis, *L.* 37.

Ordo LXX. OROBANCHACEÆ.

OROBANCHE caryophyllacea, *Sm.* 1467.
cœrulea, *Sm.* 1468.
ramosa, *L.* 1469.

Ordo LXXI. ACANTHACEÆ.

ACANTHUS mollis, *L.* 1471.
spinosus, *L.* 1472.

Ordo LXXII. LENTIBULACEÆ.

PINGUICULA crystallina, 38.
UTRICULARIA vulgaris, *L.* 39.

Ordo LXXIII. LABIATÆ; *s.* LAMIACEÆ.

AJUGA orientalis, *L.* 1289.
pyramidalis, *L.* 1290.
reptans, *L.* 1291.
chamæpitys, *Schreb.* 1292.
chia, *Schreb.* 1293.

Ajuga Iva, *Schreb.* 1294.
salicifolia, *Schreb.* 1295.
Teucrium orientale, *L.* 1296.
fruticans, *L.* 1297.
brevifolium, *Schreb.* 1298.
creticum, *L.* 1299.
microphyllum, *Desf.* (quadratulum, 1300.)
Arduini, *L.* 1301.
Scorodonia, *L.* 1302.
massiliense, *L.* 1303.
Scordium, *L.* 1304.
Chamædrys, *L.* 1305.
lucidum, *L.* 1306.
var. flavum, *L.* 1307.
montanum, *L.* 1308.
Polium, *L.* 1309.
var. capitatum, *L.* 1310.
cuneifolium, 1311.
alpestre, 1312.
spinosum, *L.* 1313.
Satureja Thymbra, *L.* 1316. (necnon Thymus Tragoriganum, 1404.)
montana, *L.* 1318.
spinosa, *L.* 1320.
Micromeria Juliana, *G. B.* (Satureja, 1314.)
nervosa, *G. B.* (Satureja, 1315, et Thymus Mastichina, 1409.)
græca, *G. B.* (Satureja, 1317.)
Thymbra spicata, *L.* 1321.
Nepeta Cataria, *L.* 1322.
nuda, *L.* 1323.
italica, *L.* 1324.
Glechoma, *G. B.* (Glechoma hederacea, 1344.)
Lavandula spica, *L.* 1325.
dentata, *L.* 1326.
Stæchas, *L.* 1327.
Sideritis cretica, *L.* 1328.
syriaca, *L.* 1329.
perfoliata, *L.* 1330.
remota, *D'Urv.* (montana, 1331.)
romana, *L.* 1331.
lanata, *L.* 1332.
Mentha sylvestris, *L.* 1337.
rotundifolia, *L.* 1338.
aquatica, *L.* (1340, hirsuta.)
var. crispa, *L.* 1339.
arvensis, *L.* 1342.
var. gentilis, *L.* 1341.
Pulegium, *L.* 1343.
Lamium garganicum, *L.* 1345.
pubescens, *Sibth.* (rugosum, 1346.)
vulgatum, *G. B.* (maculatum, 1347.)
striatum, 1348.
purpureum, *L.* 1349.
amplexicaule, *L.* 1350.
Galeobdolon, *Crantz.* (Galeobdolon luteum, 1351.)
Melissa Clinopodia, *G. B.* (Clinopodium vulgare, 1384.)
Acinos, *G. B.* (Thymus, 1399.)
patavina, *G. B.* (Thymus suaveolens, 1400.)
alpina, *G. B.* (Thymus, 1401.)
graveolens, *G. B.* (Thymus exiguus, 1402.)
incana, *G. B.* (Thymus, 1405.)
Calamintha, *L.* (Thymus, 1406.)
Nepeta, *L.* (Thymus, 1407.)
officinalis, *L.* 1410.
Melissa officinalis; *var.* altissima, 1411.
grandiflora, *L.* 1412.
Amaracus Dictamnus, *G. B.* (Origanum, 1385.)
Tournefortii, *G. B.* (Origanum, 1386.)
Origanum Sipylcum, *L.* 1387.
vulgare, *L.* 1391. (necnon creticum, 1388.)
heracleoticum, *L.* 1390. (et smyrnæum, 1389.)
Majorana Onites, *G. B.* (Origanum, 1392.)
microphylla, *G. B.* (Origanum Maru, 1393.)
Thymus capitatus, *Hoffm.* (Satureja, 1319.)
Serpyllum, *L.* 1394.
var. pulegioides, *L.* 1397.
hirsutus, *M. B.* (vulgaris, 1395.)
Sibthorpii, *G. B.* (lanccolatus, 1396.)
striatus, *Vahl.* (Zygis, 1398.)
villosus, *L.* 1408.
Melittis Melissophyllum, *L.* 1413.
Scutellaria orientalis, *L.* 1414.
albida, *L.* 1415.
Columna, *All.* (peregrina, 1416.)
hirta, 1417.
galericulata, *L.* 1418.
Stachys Betonica, *G. B.* (Betonica officinalis, 1352.)
Alopecuros, *G. B.* (Betonica, 1353.)
sylvatica, *L.* 1354.
palustris, *L.* 1355.
alpina, *L.* 1356.
germanica, *L.* 1357.
var. cretica, *L.* 1359.
lanata, *W.* 1358.
recta, *L.* 1365. (necnon glutinosa, 1360, et annua, 1366.)
spinosa, *L.* 1361.
Heraclea, *All.* (orientalis, 1362.)
palæstina, *L.* 1363.
maritima, *L.* 1364.
arvensis, *L.* 1367.
spinulosa, 1368.
Ballota nigra, *L.* 1369.
integrifolia, *G. B.* (Moluccclla frutescens, 1383.)
Pseudo-Dictamnus, *G. B.* (Marrubium, 1374.)
acetabulosa, *G. B.* (Marrubium, 1375.)
Marrubium peregrinum, *L.* 1370.
peregrinum, *L.* (creticum, 1371.)
velutinum, 1372.
vulgare, *L.* 1373.
Leonurus Cardiaca, *L.* 1376.
Phlomis fruticosa, *L.* 1377.
samia, *L.* 1378.
lunarifolia, 1379.
Herba Venti, *L.* 1380.
Moluccella lævis, *L.* 1381.
spinosa, *L.* 1382.
Prunella vulgaris, *L.* 1419.
var. laciniata, *L.* 1420.
hyssopifolia, *L.* 1421.
Prasium majus, *L.* 1422.
Salvia officinalis, *L.* 46.
pomifera, *L.* 47.
calycina, 48.
triloba, *L.* 49.
ringens, 50.
viridis, *L.* 51.
Horminum, *L.* 52.
sylvestris, *L.* 53.
Salvia pratensis, *L.* 54.
Forskaëlii, *L.* 55.
Sibthorpii, 56.
verbenaca, *L.* 57.
clandestina, *L.* 59.
var. multifida, 58.
disermas, *L.* 60.
verticillata, *L.* 61.
napifolia, *W.* 62.
Sclarea, *L.* 63.
candidissima, *Vahl.* (S. crassifolia, 64.)
argentea, *L.* 65.
Æthiopis, *L.* 66.
Lycopus europæus, *L.* 42.
exaltatus, *L.* 43.
Ziziphora capitata, *L.* 44.
Rosmarinus officinalis, *L.* 45.

Ordo LXXIV. Verbenaceæ.

Zapania nodiflora, *Pers.* (Verbena, 1334.)
Verbena officinalis, *L.* 1335.
supina, *L.* 1336.
Vitex Agnus castus, *L.* 1470.

Ordo LXXV. Primulaceæ.

Androsace villosa, *L.* 439.
Primula veris, *L.* 440.
vulgaris, *Sm.* 441.
Cyclamen europæum, *L.* 442.
persicum, *L.* 443.
latifolium, *Fl. Græc.* (hederifolium, 444.) Species C. neapolitano *Tenorii* valdè affinis.
repandum, 445. Verosimilitèr verum est C. hederifolium, *Ait.* monente cl. Tenorio.
Limnanthemum nymphoides, *Link.* (Menyanthes, 446.)
Lysimachia vulgaris, *L.* 447.
atropurpurea, *L.* 448.
dubia, *Ait.* 449.
punctata, *L.* 450.
anagalloides, 452.
nummularia, *L.* 453.
Asterolinon stellatum, *Link.* (Lysimachia, 451.)
Anagallis arvensis, *L.* 454.
Jirasekia tenella, *Rchb.* (Lysimachia, 455.)
Samolus Valerandi, *L.* 514.
Coris monspeliensis, *L.* 520.

Ordo LXXVI. Globulariaceæ.

Globularia Alypum, *L.* 269.
vulgaris, *L.* 270.

Ordo LXXVII. Plantaginaceæ.

Plantago major, *L.* 345.
media, *L.* 346.
lanceolata, *L.* 347.
Lagopus, *L.* 348.
albicans, *L.* 349.
alpina, *L.* 350.
Bellardi, *L.* 351.
cretica, *L.* 352.
maritima, *L.* 353.
subulata, *L.* 354.
gentianoides, 355.

Plantago Serraria, *L.* 356.
Coronopus, *L.* 357.
Psyllium, *L.* 358.
afra, *L.* 359.
squarrosa, *W.* 360.
pumila, *L.* 361.
Cynops, *L.* 362.

Ordo LXXVIII. Plumbaginaceæ.

Armeria maritima, *W.* (Statice Armeria, 730.)
alliacea, *W.* (Statice, 731.)
Statice Limonium, *L.* 732.
bellidifolia, 733.
globularifolia, 734.
oleifolia, *W.* 735.
dichotoma, *Cav.* 736.
palmaris, 737.
rorida, *Fl. Græca.* (echioides, 738; et verosimilitèr S. furfuracea *Lag.*)
echioides, *L.* (aristata, 739.)
Echinus, *L.* 740.
sinuata, *L.* 741.
Plumbago europæa, *L.* 456.

Sub-Classis IV. MONOCHLAMYDEÆ.

Ordo LXXIX. Amaranthaceæ.

Amaranthus oleraceus, *L.* 2247.
Blitum, *L.* 2248.
hybridus, *L.* 2249.
hypochondriacus, *L.* 2250.
Achyranthes argentea, *W.* 564.

Ordo LXXX. Phytolaccaceæ.

Phytolacca decandra, *L.* 1080.

Ordo LXXXI. Chenopodiaceæ.

Chenopodium Bonus Henricus, *L.* 580.
urbicum, *L.* 581.
rubrum, *L.* 582.
murale, *L.* 583.
album, *L.* 584.
ficifolium, *Sm.* 585.
Botrys, *L.* 586.
olidum, *L.* 587.
polyspermum, *L.* 588.
Kochia scoparia, *Schrad.* (Chenopodium, 589.)
hirsuta, *Nolte.* (Salsola, 594.)
Beta maritima, *L.* 590.
Salsola Kali, *L.* 591.
Tragus, *L.* 592.
rosacea, *L.* 593.
Schoberia salsa, *C. A. Meyer.* (Salsola, 595.)
Suæda fruticosa, *Forsk.* (Salsola, 596.)
Anabasis aphylla, *L.* 597.
Polycnemum arvense, *L.* 81.
Salicornia herbacea, *L.* 1.
fruticosa, *L.* 2.
Camphorosma Pteranthus, *L.* 370.
Corispermum hyssopifolium, *L.* 5.
Thelygonum Cynocrambe, *L.* 2255.
Atriplex Halimus, *L.* 2329.
portulacoides, *L.* 2330.
glauca, *L.* 2331.
græca, *W.* 2332.
hortensis, *L.* 2333.
laciniata, *L.* 2334.

Ordo LXXXII. Polygonaceæ.

Rumex Patientia, *L.* 839.
sanguineus, *L.* 840.
crispus, *L.* 841.
pulcher, *L.* 842.
divaricatus, *L.* 843.
obtusifolius, *L.* 844.
bucephalophorus, *L.* 845.
Hydrolapathum, *Spr.* (aquaticus, 846.)
tingitanus, *L.* 847.
roseus, *L.* 848.
alpinus, *L.* 850.
spinosus, *L.* 851.
tuberosus, *L.* 852.
Acetosa, *L.* 853.
Acetosella, *L.* 854.
multifidus, *L.* 855.
aculeatus, *L.* 856.
Oxyria reniformis, *Hooker.* (Rumex digynus, 849.)
Polygonum amphibium, *L.* 900.
Persicaria, *L.* 901.
lapathifolium, *L.* 902.
Hydropiper, *L.* 903.
Bistorta, *L.* 904.
viviparum, *L.* 905.
maritimum, *L.* 906.
equisetiforme, 907.
aviculare, *L.* 908.
Fagopyrum, *L.* 909.
Convolvulus, *L.* 910.
dumetorum, *L.* 911.

Ordo LXXXIII. Thymelaceæ.

Daphne Mezereum, *L.* 880.
dioica *Gouan*, 881.
Tartonraira, *L.* 882.
argentea, 883.
Laureola, *L.* 884.
pontica, *L.* 885.
Gnidium, *L.* 886.
buxifolia, 887.
oleoides, *L.* 888.
jasminea, 889.
sericea, *Vahl.* 890.
alpina, *L.* 891.
collina, *Sm.* 892.
Passerina hirsuta, *L.* 893.

Ordo LXXXIV. Lauraceæ.

Laurus nobilis, *L.* 912.

Ordo LXXXV. Santalaceæ.

Thesium linophyllum, *L.* 568.

Ordo LXXXVI. Osyridaceæ.

Osyris alba, *L.* 2302.

Ordo LXXXVII. Elæagnaceæ.

Elæagnus angustifolia, *L.* 369.

Ordo LXXXVIII. Cytinaceæ.

Cytinus Hypocistis, *L.* 2213.

Ordo LXXXIX. Aristolochiaceæ.

Aristolochia bætica, *L.* 2205.
sempervirens, *L.* 2206.
parvifolia, 2207.
rotunda, *L.* 2208.
pallida, *W.* 2209.
longa, *L.* 2210.
Clematitis, *L.* 2211.
hirta, *L.* 2212.
Asarum europæum, *L.* 1081.

Ordo XC. Euphorbiaceæ.

Crozophora tinctoria, *A. deJ.* (Croton, 2287.)
villosa, *Lindl.* (Croton, 2288.)
Ricinus communis, *L.* 2289.
Andrachne Telephioides, *L.* 2290.
Buxus sempervirens, *L.* 2242.
Mercurialis perennis, *L.* 2318.
annua, *L.* 2319.
Euphorbia pumila, 1097.
Chamæsyce, *L.* 1098.
Peplis, *L.* 1099.
Peplus, *L.* 1100.
falcata, *L.* 1101.
exigua, *L.* 1102.
Lathyris, *L.* 1103.
Apios, *L.* 1104.
aleppica, *L.* 1105.
spinosa, *L.* 1106.
dulcis, *L.* 1107.
portlandica, *L.* 1108.
deflexa, 1109.
paralias, *L.* 1110.
segetalis, *L.* 1111.
helioscopia, *L.* 1112.
arguta, *Soland.* 1113.
verrucosa, *L.* 1114.
pilosa, *L.* 1115.
orientalis, *L.* 1116.
platyphylla, *L.* (stricta, 1117.)
dendroides, *L.* 1118.
Gerardiana, *W.* 1119.
Cyparissias, *L.* 1120.
myrsinites, *L.* 1121.
palustris, *L.* 1122.
amygdaloides, *L.* (sylvatica, 1123.)
Characias, *L.* 1124.
nicæensis, *All.* 1125.

Ordo XCI. Datiscaceæ.

Datisca cannabina, *L.* 2320.

Ordo XCII. Resedaceæ.

Reseda Luteola, *L.* 1090.
undata, *L.* 1091.
suffruticulosa, *L.* 1092.
alba, *L.* 1093.
lutea, *L.* 1094.

Reseda Phyteuma, *L.* 1095.
mediterranea, *L.* 1096.

Ordo XCIII. Urticaceæ.

Urtica pilulifera, *L.* 2243.
urens, *L.* 2244.
dioica, *L.* 2245.
Parietaria officinalis, *L.* 371.
judaica, *L.* 372.
cretica, *L.* 373.
Humulus Lupulus, *L.* 2309.
Ficus Carica, *L.* 2335.

Ordo XCIV. Ulmaceæ.

Ulmus campestris, *L.* 599.
Planera Abelicea, *R. & S.* (Ulmus, 600.)
Celtis australis, *L.* 601.

Ordo XCV. Corylaceæ.

Quercus Ballota, *Desf.* 2259.
Ilex, *L.* 2260.
coccifera, *L.* 2261.
rigida, *W.* 2262.
infectoria, *W.* 2263.
Ægilops, *L.* 2264.
Esculus, *L.* 2265.
pedunculata, *Sm.* (Robur, 2266.)
sessiliflora, *Sm.* 2267.
pubescens, *W.* 2268.
crinita, *Oliv.* 2269.
Fagus sylvatica, *L.* 2270.
Castanea vesca, *W.* (Fagus Castanea, 2271.)
Carpinus Betulus, *L.* 2272.
Ostrya vulgaris, *W.* (Carpinus Ostrya, 2273.)
Corylus Avellana, *L.* 2274.
Colurna, *L.* 2275.

Ordo XCVI. Salicaceæ.

Populus alba, *L.* 2315.
tremula, *L.* 2316.
nigra, *L.* 2317.
Salix purpurea, *L.* 2291.
Helix, *L.* 2292.
triandra, *L.* 2293.
fragilis, *L.* 2294.
babylonica, *L.* 2295.
ægyptiaca, *L.* 2296.
retusa, *L.* 2297.
caprea, *L.* 2298.
acuminata, *W.* 2299.
viminalis, *L.* 2300.
alba, *L.* 2301.

Ordo XCVII. Platanaceæ.

Platanus orientalis, *L.* 2276.

Ordo XCVIII. Betulaceæ.

Alnus glutinosa, *W.* 2241.

Ordo XCIX. Gnetaceæ.

Ephedra fragilis, *Desf.* (distachya, 2328.)

Ordo C. Coniferæ, s. Pinaceæ.

Pinus sylvestris, *L.* 2282.
Pinea, *L.* 2283.
? maritima ? 2284.
Picea, *L.* 2285.
Cupressus sempervirens, *L.* 2286.
Juniperus communis, *L.* 2321.
Oxycedrus, *L.* 2322.
macrocarpa, 2323.
lycia, *L.* 2324.
phœnicea, *L.* 2325.
Sabina, *L.* 2326.

Ordo CI. Taxaceæ.

Taxus baccata, *L.* 2327.

Classis II. ENDOGENÆ.

Ordo CII. Alismaceæ.

Alisma Plantago, *L.* 862.

Ordo CIII. Butomaceæ.

Butomus umbellatus, *L.* 913.

Ordo CIV. Naiadaceæ.

Potamogeton natans, *L.* 380.
perfoliatum, *L.* 381.
densum, *L.* 382.
lucens, *L.* 383.
crispum, *L.* 384.
pectinatum, *L.* 385.
gramineum, *L.* 386.
Ruppia maritima, *L.* 387.
Zannichellia palustris, *L.* 2214.
Zostera marina, *L.* 4.

Ordo CV. Lemnaceæ.

Lemna trisulca, *L.* 40.
minor, *L.* 41.

Ordo CVI. Typhaceæ.

Typha latifolia, *L.* 2215.
angustifolia, *L.* 2216.
Sparganium ramosum, *Sm.* 2217.

Ordo CVII. Araceæ.

Arum Dracunculus, *L.* 2277.
Colocasia, *L.* 2278.
maculatum, *L.* 2279.
Dioscoridis, 2280.
Arisarum vulgare, *Schott.* (Arum Arisarum, 2281.

Ordo CVIII. Acoraceæ.

Acorus Calamus, *L.* 820.

Ordo CIX. Orchidaceæ.

Platanthera bifolia, *Rich.* (Orchis, 2176.)
Anacamptis pyramidalis, *Rich.* (Orchis, 2177.)
Orchis coriophora, *L.* 2178.
Morio, *L.* 2179.
mascula, *L.* 2180.
longicornis, *Desf.* 2181.
variegata, *Jacq.* 2182.
militaris, *L.* 2183.
undulatifolia, *Bivon.* 2184.
rubra, *Jacq.* (papilionacea, 2185.)
latifolia, *L.* 2186.
sambucina, *L.* 2187.
maculata, *L.* 2188.
Gymnadenia conopsea, *R. Br.* (Orchis, 2189.)
Nigritella angustifolia, *Rich.* (Orchis nigra, 2190.)
Aceras anthropophora, *R. Br.* 2191.
Ophrys myodes, *Jacq.* (muscifera, 2192.)
apifera, *Huds.* 2193.
fuciflora, *Hall.* (arachnites, 2194.)
tenthredinifera, *W.* 2195.
Tenoreana, *Lindl.* (fusca, 2196.)
Serapias Lingua, *L.* 2197.
cordigera, *L.* 2198.
Spiranthes autumnalis, *Rich.* (Neottia spiralis, 2199.)
Listera ovata, *R. Br.* 2200.
Epipactis latifolia, *W.* 2201.
Cephalanthera pallens, *Rich.* (Epipactis grandiflora, 2202.)
ensifolia, *Rich.* (Epipactis, 2203.)
rubra, *Rich.* (Epipactis, 2204.)

Ordo CX. Iridaceæ.

Crocus sativus, *L.* 82.
nudiflorus, *Sm.* 83.
biflorus, *Mill.*
squamatus, *Herbert.*
vernustus, *Herbert.*
Sibthorpianus, *Herbert.*
*var.*angustifolius, *Herbert.*
} (vernus, 84.)
Obs. Species 5 præcedentes sub C. verni nomine in Floræ Græcæ Prodromo confusæ, a cel. Herbertio in manuscriptis suis nuperrimè distinctæ sunt. Ipse C. vernus in Græciâ quantum scimus nondùm repertus est.
lagenæflorus, *Salisb.* 6. (aureus, 85.)
Trichonema Bulbocodium. (Ixia, 86.)
Gladiolus segetum, *Waldst.* (communis, 87.)
Iris florentina, *L.* 88.
germanica, *L.* 89.
pumila, *L.* 90.
Pseudacorus, *L.* 91.
fœtidissima, *L.* 92.
graminea, *L.* 93.
tuberosa, *L.* 94.
Sisyrinchium, *L.* 95.

Ordo CXI. Amaryllidaceæ.

Galanthus nivalis, *L.* 756.
Leucoium æstivum, *L.* 757.
Narcissus poeticus, *L.* 758.
Tazzetta, *L.* 759.
Pancratium maritimum, *L.* 760.
Oporanthus luteus, *Herb.* (Amaryllis, 761.)
Sternbergia citrina, *Herb.* (Amaryllis, 762.)

Ordo CXII. Liliaceæ.

Lilium candidum, *L.* 785.
chalcedonicum, *L.* 786.
Martagon, *L.* 787.
Fritillaria Pyrenaica, *L.* 788.
Tulipa clusiana, *Red.* 789.
Sibthorpiana, 790.
Allium Ampeloprasum, *L.* 763.
Dioscoridis, *With.* 764. (an Nectaroscordi, sp.?)
rotundum, *L.* 765.
Victorialis, *L.* 766.
subhirsutum, *L.* 767.
roseum, *L.* 768.
Scorodoprasum, *L.* 769.
margaritaceum, *L.* 770.
descendens, *L.* 771.
flavum, *L.* 772.
pallens, *L.* 773.
paniculatum, *L.* 774.
pulchellum, *Don.* (montanum, 775.)
staticiforme, 776.
pilosum, 777.
junceum, 778.
nigrum, *L.* 779.
triquetrum, *L.* 780.
neapolitanum, *Cyr.* (lacteum, 781.)
Cepa, *L.* 782.
carneum, *Ten.* (ambiguum, 783.)
chamæmoly, *L.* 784.
Gagea spathacea, *R. & S.* (Ornithogalum, 791.)
arvensis. *R. & S.* (Ornithogalum, 792.)
Ornithogalum nanum, 793.
umbellatum, *L.* 794.
stachyoides, *Ait.* 795.
pyrenaicum, *Sm.* 796.
Squilla maritima, *Steinb.* (Scilla, 797.)
Scilla amœna, *L.* 798.
bifolia, *L.* 799.
autumnalis, *L.* 800.
Asphodelus luteus, *L.* 801.
creticus, *W.* 802.
ramosus, *L.* 803.
fistulosus, *L.* 804.
Lloydia græca, *Lindl.* (Anthericum, 805.)
Asparagus acutifolius, *L.* 808.
aphyllus, *L.* 809.
horridus, *L.* 810.
verticillatus, *L.* 811.
Convallaria majalis, *L.* 812.
Polygonatum, *L.* 813.
multiflora, *L.* 814.
Hyacinthus romanus, *L.* 815.
spicatus, 816.
Muscari comosum, *W.* (Hyacinthus, 817.)
racemosum, *W.* (Hyacinthus, 818.)
Aloe vulgaris, *Bauh.* 819.
Ruscus aculeatus, *L.* 2303.
Hypophyllum, *L.* 2304.
Hypoglossum, *L.* 2305.

Ordo CXIII. Melanthaceæ.

Veratrum album, *L.* 857.
nigrum, *L.* 858.
Colchicum autumnale, *L.* 859.
montanum, *L.* 860.
latifolium, *Fl. Gr.* (variegatum, 861. Bivonæ, *Guss.*)

Ordo CXIV. Juncaceæ.

Juncus acutus, *L.* 821.
maritimus, *Sm.* 822.
glaucus, *Sibth.* 823.
conglomeratus, *L.* 824.
effusus, *L.* 825.
squarrosus, *L.* 826.
articulatus, *L.* 827.
uliginosus, *Sibth.* 828.
bufonius, *L.* 829.
Luzula pilosa, *W.* (Juncus, 830.)
campestris, *Desv.* (Juncus, 831.)

Ordo CXV. Dioscoreaceæ.

Tamus communis, *L.* 2310.
cretica, *L.* 2311.

Ordo CXVI. Smilaceæ.

Smilax aspera, *L.* 2312.
nigra, *W.* 2313.
excelsa, *L.* 2314.

Ordo CXVII. Cyperaceæ.

Carex elongata, *L.* 2218.
ovalis, *W.* 2219.
remota, *L.* 2220.
incurva, *W.* 2221.
intermedia, *W.* 2222.
divulsa, *W.* 2223.
vulpina, *L.* 2224.
digitata, *L.* 2225.
pendula, *W.* 2226.
sylvatica, *Sm.* 2227.
depauperata, *W.* 2228.
pallescens, *L.* 2229.
distans, *L.* 2230.
præcox, *W.* 2231.
pilulifera, *L.* 2232.
rigida, *W.* 2233.
recurva, *W.* 2234.
stricta, *W.* 2235.
acuta, *W.* 2236.
paludosa, *W.* 2237.
riparia, *W.* 2238.
ampullacea, *W.* 2239.
hirta, *L.* 2240.
Isolepis Holoschœnus, *R. & S.* (Scirpus 112.)
var. romana. (Scirpus, 113.)
setacea, *R. Br.* (Scirpus, 114.)
Micheliana, *R. & S.* (Scirpus, 119.)
Fimbristylis dichotoma, *Vahl.* (Scirpus, 116.)
Cladium Mariscus, *R. Br.* (Schœnus, 96.)
Chætospora nigricans, *Kth.* (Schœnus, 98.)
Cyperus ægyptiacus, *Glox.* (Schœnus mucronatus. *L.* 97.)
longus, *L.* 99.
rotundus, *L.* 100.
var. comosus, 101.
var. radicosus, 103.
tenuiflorus, *Rottb.* 102.
difformis, *L.* 104.
flavescens, *L.* 105.
glaber, *L.* 106.
fuscus, *L.* 107.
pannonicus, *L.* 108.
mucronatus, *W.* 109.
Scirpus lacustris, *L.* 111.
mucronatus, *L.* 115.
maritimus, *L.* 117.
sylvaticus, *L.* 118.
Eleocharis palustris, *R. Br.* (Scirpus, 110.)

Ordo CXVIII. Graminaceæ.

Anthoxanthum odoratum, *L.* 68.
Nardus aristata, *L.* 120.
Cornucopiæ cucullata, *L.* 121.
Erianthus Ravennæ, *Beauv.* (Saccharum, 122.)
Imperata arundinacea, *Cyr.* (Saccharum cylindricum, *W.* 124.)
Phalaris canariensis, *L.* 125.
nodosa, *L.* 126.
aquatica, *L.* 127.
paradoxa, *L.* 132.
arundinacea, *L.* (Arundo colorata, 243.)
Phleum arenarium, *L.* (Phalaris, 128.)
Böhmeri, *W.* (Phalaris, 129.)
nodosum, *L.* 142.
alpinum, *L.* 143.
echinatum, *Host.* (felinum, 144.)
Alopecurus pratensis, *L.* 146.
utriculatus, 147.
vaginatus, *Pall.* (angustifolius, 148.)
lanatus, 149.
Crypsis alopecuroides, *Schrad.* (Phalaris geniculata, 130.)
schœnoides, *Lam.* (Phalaris vaginiflora, 131.)
Panicum Teneriffæ, *R. Br.* (Saccharum, 123.)
eruciforme, 137.
sanguinale, *L.* 138.
repens, *L.* 140.
miliaceum, *L.* 141.
Setaria verticillata, *Beauv.* (Panicum, 133.)
glauca, *Beauv.* (Panicum, 134.)
viridis, *Beauv.* (Panicum, 135.)
Echinochloa Crus-galli, *Beauv.* (Panicum, 136.)
Cynodon Dactylon, *Pers.* (Panicum, 139.)
Polypogon monspeliensis, *Desf.* (Phleum crinitum, 145.)
Milium effusum, *L.* 150.
Gastridium australe, *Beauv.* (Milium lendigerum, 151.)
Piptatherum multiflorum, *Beauv.* (Milium arundinaceum, 152.)
cœrulescens, *Beauv.* (Milium, 153.)
Agrostis stolonifera, *L.* 154.
alba, *L.* 155.
Sporobolus pungens, *Kunth.* (Agrostis, 156.)
Andropogon Gryllus, *L.* 157.
halepensis, *L.* 158.
Ischæmum, *L.* (angustifolius, 159.)
distachyos, *L.* 160.
hirtus, *L.* 161.
Holcus lanatus, *L.* 162.
Aira caryophyllea, *L.* 168.
Köleria phleoides, *Pers.* (Cynosurus, 203.)
cristata, *Pers.* (Aira, 163.)
Catabrosa minuta, *Trin.* (Aira, 164.)
aquatica, *Beauv.* (Aira, 165.)
Deschampsia cæspitosa, *Beauv.* (Aira, 166.)
Corynephorus canescens, *Beauv.* (Aira, 167.)

Melica ciliata, *L.* 169.
minuta, *L.* 170.
saxatilis, 171.
uniflora, *W.* 172.
nutans, *L.* 173.
major, 174.
Molinia cœrulea, *Mönch.* (Melica, 175.)
Sesleria cœrulea, *Scop.* 176.
alba, 177.
Poa Eragrostis, *L.* 184.
capillaris, *L.* 185.
palustris, *L.* 186.
trivialis, *L.* 187.
littoralis, *Gouan.* (Festuca, 213.)
pratensis, *L.* 188.
angustifolia, *L.* 189.
compressa, *L.* 190.
alpina, *L.* 191.
annua, *L.* 192.
nemoralis, *L.* 193.
Glyceria aquatica, *Sm.* (Poa, 178.)
fluitans, *R. Br.* (Poa, 179.)
Sclerochloa dura, *Beauv.* (Poa, 181.)
Danthonia decumbens, *DeCand.* (Poa, 194.)
Briza minor, *L.* 195.
media, *L.* 196.
elatior, 197.
maxima, *L.* 198.
spicata, 199.
Dactylis glomerata, *L.* 200.
Cynosurus cristatus, *L.* 201.
echinatus, *L.* 202.
Dactyloctænium ægyptiacum, *W.* (Cynosurus ægyptius, 204.)
Chrysurus aureus, *Beauv.* (Cynosurus, 205.)
Festuca thalassica, *Kunth.* (Poa maritima, 180.)
rigida, *Kunth.* (Poa, 182.)
divaricata, *Desf.* (Poa, 183.)
ovina, *L.* 206.
vivipara, *Sm.* 207.
reptatrix, *L.* 208.
duriuscula, *L.* 209.
punctoria, 210.
Myurus, *L.* 211.
uniglumis, *Sm.* 212.
dactyloides, 214.
elatior, *L.* 215.
maritima, *DeCand.* (Triticum, 261.)
unilateralis, *Schr.* (Triticum, 262.)
Bromus mollis, *L.* 216.
asper, *L.* 217.
sterilis, *L.* 218.
tectorum, *L.* 219.
rubens, *L.* 220.
scoparius, *L.* 221.
**Agropyrum*, Beauv.
cristatus, *L.* 225.
***Brachypodium*, Beauv.
sylvaticus, *Sm.* 222.
pinnatus, *L.* 223.
ramosus, *L.* 224.
distachyos, *L.* 226.
Stipa pennata, *L.* 227.
capillata, *L.* 228.
juncea, *L.* 229.
tortilis, *Desf.* (paleacea, 231.)
aristella, *L.* 232.
Macrochloa tenacissima, *Kth.* (Stipa, 230.)
Avena fatua, *L.* 233.
sterilis, *L.* 234.
fragilis, *L.* 236.
pratensis, *L.* 237.
var. caryophyllea, 238.
Trisetum flavescens, *Beauv.* (Avena, 235.)
Lagurus ovatus, *L.* 239.
Arundo Donax, *L.* 240.
Phragmites communis, *Trin.* (Arundo Phragmites, 241.)
Calamagrostis lanceolata, *Roth.* (Arundo Calamagrostis, 242.)
Ammophila arenaria, *Host.* (Arundo, 244.)
Lolium perenne, *L.* 245.
temulentum, *L.* 246.
arvense, *L.* 247.
Lepturus incurvatus, *Trin.* (Rotbollia, 248.)
Pholiurus græcus, *Trin.* (Rotbollia digitata, 249.)
Ægilops ovata, *L.* 250.
comosa, 251.
caudata, *L.* (cylindrica, 252.)
Elymus arenarius, *L.* 253.
crinitus, *Schreb.* 254.
Hordeum bulbosum, *L.* 256.
murinum, *L.* 257.
maritimum, *Sm.* 258.
Triticum junceum, *L.* 259.
repens, *L.* 260.
villosum, *Beauv.* (Secale, 255.)
Echinaria capitata, *Desf.* (Cenchrus, 263.)
Cenchrus frutescens, *L.* 264.
Lappago racemosa, *Schreb.* 265.

Classis III. ACROGENÆ.

Ordo CXIX. Equisetaceæ.

Equisetum sylvaticum, *L.* 2336.
arvense, *L.* 2337.
palustre, *L.* 2338.
fluviatile, *L.* 2339.
hyemale, *L.* 2340.

Ordo CXX. Lycopodiaceæ.

Lycopodium helveticum, *L.* 2342.
denticulatum, *L.* 2343.

Ordo CXXI. Filices.

Osmunda regalis, *L.* 2341.
Nothochlæna Marantæ, *R. Br.* (Acrostichum, 2344.)
lanuginosa, *Desv.* (Acrostichum vellcum, 2345.)
Polypodium vulgare, *L.* 2346.
Phegopteris, *L.* 2347.
Gymnogramma leptophyllum. (Polypodium, 2348.)
Ceterach, *Spr.* (Scolopendrium, 2362.)
Aspidium Lonchitis, *W.* 2349.
Oreopteris, *W.* 2350.
Filix mas, *W.* 2351.
aculeatum, *W.* 2352.
cristatum, *W.* 2353.
Athyrium Filix fœmina, *Roth.* (Aspidium, 2354.)
Athyrium fontanum, *Roth.* (Aspidium, 2355.)
Asplenium Trichomanes, *L.* 2356.
septentrionale, *Sm.* 2357.
Ruta muraria, *L.* 2358.
Adiantum nigrum, *L.* 2359.
lanceolatum, *Sm.* 2360.
fragile, *Kaulf.* (Cyathea, 2368.)
Scolopendrium vulgare, *Sm.* 2361.
Pteris vittata, *L.* 2363.
aquilina, *L.* 2364.
Allosorus crispus, *Bernh.* (Pteris, 2365.)
Adiantum Capillus Veneris, *L.* 2366.
Cheilanthes odora, *Swz.* (suaveolens, 2367.)

Ordo CXXII. Musci, s. Bryaceæ.

Grimmia pulvinata, *Sm.* 2369.
apocarpa, *Hedw.* 2370.
Dicranum scoparium, *Hedw.* 2371.
virens, *Swz.* 2372.
taxifolium, *Swz.* 2373.
Didymodon capillaceus, *Schr.* (Trichostomum, 2374.)
Trichostomum canescens, *Hedw.* 2375.
microcarpus, *Hedw.* 2376.
Tortula rigida, *Swz.* 2377.
ruralis, *Ehr.* 2378.
subulata, *Hedw.* 2379.
muralis, *Hedw.* 2380.
Orthotrichum striatum, *Hedw.* 2381.
Pterogonium sciuroides, *Turn.* 2382.
filiforme, *Hedw.* 2383.
Neckera pumila, *Hedw.* 2384.
crispa, *Hedw.* 2385.
Anomodon viticulosum, *Hook.* (Neckera, 2386.)
Hypnum scriceum, *L.* 2387.
myosuroides, *L.* 2388.
denticulatum, *L.* 2389.
riparium, *L.* 2390.
velutinum, *L.* 2391.
serpens, *L.* 2392.
cuspidatum, *L.* 2393.
Rutabulum, *L.* 2394.
triquetrum, *L.* 2395.
cupressiforme, *L.* 2396.
filicinum, *L.* 2397.
molluscum, *Hedw.* 2398.
Fontinalis antipyretica, *L.* 2399.
Funaria hygrometrica, *Sibth.* 2400.
Bartramia pomiformis, *Hedw.* 2401.
fontana, *Sm.* 2402.
Arrhenopterum heterostichum, *Hedw.* (Mnium arrhenopterum, 2403.)
Bryum cæspititium, *L.* 2404.
ventricosum, *Dicks.* 2405.
punctatum, *Sm.* 2406.
Polytrichum commune, *L.* 2407.

Ordo CXXIII. Jungermanniaceæ.

Jungermannia pinguis, *L.* 2408.
complanata, *L.* 2409.
polyantha, *L.* 2410.
dilatata, *L.* 2411.

Ordo CXXIV. Marchantiaceæ.

Targionia hypophylla, *L.* 2412.
Marchantia polymorpha, *L.* 2413.
Riccia natans, *L.* 2414.

Ordo CXXV. Lichenaceæ.

Lecidea atro-alba, *Ach.* 2415.
confluens, *Ach.* 2416.
parasæma, *Ach.* 2417.
atrovirens, *Ach.* 2418.
Œderi, *Ach.* 2419.
alba, *Ach.* 2420.
fuscata, *Ach.* 2421.
incana, *Ach.* 2422.
vernalis, *Ach.* 2423.
sulphurea, *Ach.* 2424.
Psora decipiens, *Hoffm.* (Lecidea, 2425.)
Umbilicaria pustulata, *Schrad.* (Gyrophora, 2426.)
Gyrophora hirsuta, *Ach.* 2427.
Opegrapha macularis, *Ach.* 2428.
scripta, *Ach.* 2429.
Endocarpon miniatum, *Ach.* 2430.
Pertusaria communis, *DeCand.* (Endocarpon pertusum, 2431.)
Variolaria globulifera, *Turn.* 2432.
faginea, *Ach.* 2433.
Urceolaria scruposa, *Ach.* 2434.
Lecanora atra, *Ach.* 2435.
periclea, *Ach.* 2436.
subfusca, *Ach.* 2437.
ventosa, *Ach.* 2438.
Villarsii, *Ach.* 2439.
angulosa, *Ach.* 2440.
parella, *Ach.* 2441.
tartarea, *Ach.* 2442.
vitellina, *Ach.* 2443.
Squamaria murorum, *Borrer.* (Lecanora, 2444.)
circinata, *Borrer.* (Lecanora, 2445.)
muscorum, *Borrer.* (Lecanora, 2446.)
Parmelia glomulifera, *Ach.* 2447.
caperata, *Ach.* 2448.
perlata, *Ach.* 2449.
olivacea, *Ach.* 2450.
parietina, *Ach.* 2451.
saxatilis, *Ach.* 2452.
aquila, *Ach.* 2453.
encausta, *Ach.* 2454.
conspersa, *Ach.* 2455.
pulverulenta, *Ach.* 2456.
stellaris, *Ach.* 2457.
physodes, *Ach.* 2458.
Borrera ciliaris, *Ach.* 2459.
tenella, *Ach.* 2460.
leucomela, *Ach.* 2461.
furfuracea, *Ach.* 2462.
chrysophthalma, *Ach.* 2464.
flavicans, *Ach.* 2465.
Evernia prunastri, *Ach.* 2463.
Cetraria glauca, *Ach.* (fallax, 2466.)
Sticta pulmonacea, *Ach.* 2467.
scrobiculata, *Ach.* 2468.
Peltidea scutata, *Ach.* 2469.
aphthosa, *Ach.* 2470.
canina, *Ach.* 2471.
resupinata, *Ach.* 2472.
Roccella tinctoria, *Ach.* 2473.
Scyphophorus alcicornis, *Borrer.* (Cenomyce, 2474.)
endiviæfolius, *Borrer.* (Cenomyce, 2475.)
pyxidatus, *Borrer.* (Cenomyce, 2476.)
cornutus, *Borrer.* (Cenomyce, 2477.)
racemosus, *Borrer.* (Cenomyce, 2478.)
Cladonia uncialis, *Borrer.* (Cenomyce, 2479.)
Cladonia rangiferina, *Hoffm.* (Cenomyce, 2480.)
Stereocaulon paschale, *Ach.* 2481.
Usnea florida, *Ach.* 2482.
plicata, *Ach.* (hirta, 2483.)
barbata, *Ach.* 2484.
Alectoria jubata, *Ach.* 2485.
Ramalina fastigiata, *Ach.* 2486.
farinacea, *Ach.* 2487.
Collema crispum, *Ach.* 2488.
nigrescens, *Ach.* 2489.
lacerum, *Ach.* 2490.
Lepraria flava, *Ach.* 2491.
botryoides, *Ach.* 2492.
æruginosa, *Ach.* 2493.

Ordo CXXVI. Characeæ.

Chara vulgaris, *L.* 3.

Ordo CXXVII. Algaceæ.

Lawrencia tenuissima, *Grev.* (Fucus, 2494.)
obtusa, *Lamour.* (Fucus, 2495.)
Chondria papillosa, *Ag.* (Fucus thyrsoides, 2496.)
Caulerpa clavifera, *Ag.* (Fucus, 2497.)
Sargassum vulgare, *Ag.* (Fucus natans, 2498.)
bacciferum, *Ag.* (Fucus, 2499.)
Cystoseira fœniculacea, *Ag.* (Fucus discors, 2500.)
barbata, *Ag.* (Fucus, 2501.)
ericoides, *Ag.* (Fucus, 2502.)
fibrosa, *Ag.* (Fucus, 2503.)
Fucus vesiculosus, *L.* (volubilis, 2504.)
Nitophyllum laceratum, *Grev.* (Fucus, 2505.)
Rhodomenia reniformis, *Hook.* (Fucus, 2506.)
Delesseria sinuosa, *Lamour.* (Fucus rubens, 2507.)
Gelidium corneum, *Lamour.* (Fucus, 2508.)
Plocamium coccineum, *Lyngb.* (Fucus, 2509.)
Sphærococcus purpureus, *Ag.* (Fucus, 2510.)
Rhodomela lycopodioides, *Ag.* (Fucus, 2511.)
var.? Lycopodium. (Fucus, 2512.)
Chylocladia articulata, *Hooker.* (Fucus, 2513.)
Codium Bursa, *Ag.* (Fucus, 2514.)
membranaceum, *Ag.* (Ulva flabelliformis, 2516.)
Padina pavonia, *Lamour.* (Ulva, 2515.)
Enteromorpha intestinalis, *Lind.* (Ulva, 2517.)
compressa, *Grev.* (Ulva, 2518.)
Asperococcus echinatus, *Grev.* (Ulva fistulosa, 2519.)
Ulva Lactuca, *L.* 2520.
Linza, *L.* 2521.
Anadyomene stellata, *Ag.* (Ulva, 2522.)
Conferva rivularis, *L.* 2523.
velutina, *Sm.* 2524.
bulbosa, *L.* 2525.
rupestris, *L.* 2527.
Batrachospermum moniliforme, *Ag.* (Conferva gelatinosa, 2526.)
Griffithsia corallina, *Ag.* (Conferva, 2528.)
Ceramium diaphanum, *Roth.* (Conferva, 2529.)
Polysiphonia fastigiata, *Grev.* (Conferva polymorpha, 2530.)
Tremella mesenterica, *Retz.* 2531.
Nostoc communis, *Vauch.* (Tremella Nostoc, 2532.)
Botrydium granulatum, *Grev.* (Tremella, 2533.)
Byssus antiquitatis, *L.* 2534.

Ordo CXXVIII. Fungaceæ.

Agaricus procerus, *Scop.* 2535.
campestris, *L.* 2536.
aureus, *Sibth.* 2537.
emeticus, *Schæff.* 2538.
personatus, *Fr.* (cyanipes, 2539.)
multiformis, *Schæff.* (terreus, 2540.)
castaneus, *With.* 2541.
titubans, *Bull.* 2542.
semiglobatus, *Batsch.* 2543.
anomalus, *Fr.* (araneosus, 2544.)
candidus, *Huds.* 2545.
clavus, *L.* 2546.
pratensis, *Huds.* 2547.
galericulatus, *Schæff.* (clypeatus, 2548.)
Campanella, *Batsch.* (fragilis, 2549.)
Rotula, *Scop.* 2550.
androsaceus, *Pers.* 2551.
fimbriatus, *Bolt.* 2552.
semiovatus, *With.* 2553.
plicatilis, *Curt.* 2554.
cinereus, *Schæff.* 2555.
comatus, *Müll.* (fimetarius, 2556.)
atramentarius, *Bull.* (ovatus, 2557.)
stypticus, *Bull.* 2558.
Boletus bovinus, *L.* 2559.
cinnabarinus, *Jacq.* 2565.
cyanescens, *Bull.* 2560.
luteus, *L.* 2561.
Laricis, *Jacq.* 2566.
Polyporus perennis, *Fr.* (Boletus, 2562.)
lucidus, *Fr.* (Boletus, 2563.)
versicolor, *Fr.* (Boletus, 2564.)
igniarius, *Fr.* (Boletus, 2567.)
Fistulina hepatica, *Sibth.* (Boletus, 2568.)
Phallus impudicus, *L.* (fœtidus, 2569.)
Phlebia mesenterica, *Fr.* (Auricularia tremelloides, 2570.)
Thelephora hirsuta, *W.* (Auricularia reflexa, 2571.)
quercina, *Pers.* (Auricularia corticalis, 2572.)
Bulgaria inquinans, *Fr.* (Peziza, 2573.)
Peziza virginea, *Batsch.* (nivea, 2574.)
cochleata, *L.* 2575.
scutellata, *L.* 2576.
granulata, *Bull.* (fulva, 2578.)
lenticularis, *Bull.* (aurea, 2579.)
Ascobolus furfuraceus, *Pers.* (Peziza stercoraria, 2577.)
Nidularia campanulata, *With.* 2580.
Tuber cibarium, *Bull.* 2581.
Rhizopogon albus, *Bull.* (Tuber, 2582.)
Geaster limbatus, *Fr.* (coronatus, 2583.)
hygrometricus, *Pers.* 2584.
Lycoperdon Bovista, *L.* 2585.
Lycogala Epidendrum, *Fr.* (Lycoperdon, 2586.)
Sphæria sanguinea, *With.* 2587.
Mucor Mucedo, *L.* 2588.

APPENDIX TERTIA,

CATALOGUM SISTENS PLANTARUM GRÆCARUM DIOSCORIDI NOTARUM, CUM SYNONYMIS BOTANICIS, AD SCRIPTORUM OPTIMORUM SENTENTIAS ELABORATUM.

Dioscoridis plantæ plurimæ tantis vexantur dubiis, descriptionibusque adeò mancis, imò ut videtur erroneis, sæpiùs nituntur, ut nemo est qui nomina hodierna omnibus ascribere auderet, non obstante commentatorum labore per tot sæcula indefesso. Sibthorpius ipse, cum specierum patriam adierat, et nomina per Græciam hodiè vulgata sedulò collegerat, de rebus tam obscuris suum judicium afferre dubitavit. Quæ cum ita sint, tales tenebras dispergere nulla spes est, satiusque duxi merum nominum Græcorum catalogum, synonymis botanicorum quæ meo judicio magis verisimilia videntur adjectis parare. Sprengelium, in Dioscoridem commentatorem omnium sagacissimum, præcipuè, haud tamen clausis oculis, secutus sum; Sibthorpii testimonio semper magni pretii habito quamvis aliquandò repudiato. Hoc tantum adderem; lectore cavendum esse, ne Smithii errores, in Prodromo hujus operis nimis frequentes, pro Sibthorpii opinionibus intelligentur.

αβροτονον . . . Santolina squarrosa.
αγαρικον . . . Boletus Laricis?
αγηρατον . . . Achillea Ageratum?
αγχουσα . . . Anchusa tinctoria.
αγχουσα ἑτερα . . Echium creticum, aut E. diffusum.
αγνος . . . . Vitex Agnus castus.
αγριομηλα . . . Pyrus Malus.
αγριοριγανος . . Origanum vulgare.
αγρωστις . . . Cynodon Dactylon.
αδιαντον . . . Adiantum Capillus Veneris.
αειζωον μεγα . . Sempervivum arboreum.
αειζωον μικρον . . Sedi species quædam.
αειζωον ἑτερον . . Sedum stellatum.
αιγιλωψ . . . Ægilops ovata.
αιγειρος . . . . Populus nigra.
αιθιοπις . . . . Salvia Æthiopis.
αιρα . . . . Lolium temulentum.
ακαλυφη αγρια . Urtica pilulifera, vel U. dioica.
ακαλυφη ἑτερα . Urtica urens.
ακανθα . . . . Acanthus spinosus.
ακανθα αγρια . . Notobasis syriaca, vel potiùs Cirsium stellatum.
ακανθα Αραβικη . Onopordon arabicum?
ακανθα λευκη . . Picnomon Acarna; vel Echinops græcus.
ακανθιον . . . Onopordon Acanthium, v. fortè O. elongatum.
ακινος . . . . Melissa Acinos; v. Ocymi species quædam secundum Sprengelium.
ακονιτον . . . . Doronicum Pardalianches.
ακονιτον ἑτερον . . Aconitum Napellus.
ακορον . . . . Acorus Calamus; vel potiùs Iris Pseudacorus, ut vult Sprengelius.
ακτη . . . . Sambucus nigra.
αλθαια . . . . Althæa officinalis.
ἁλιμος . . . . Atriplex Halimus.
αλισμα . . . Alisma Plantago.
αλκεα . . . . Hibiscus Trionum.
αλοη . . . . Aloë vulgaris.
αλυπον . . . . Globularia Alypum.
αλυσσον . . . Fibigia clypeata?
αμπελοπρασον . . Allium Ampeloprasum.
αμπελος αγρια . . Tamus communis.
αμπελος λευκη . . Bryonia cretica, et fortè B. dioica.
αμπελος μελαινα . Bryonia alba.
αμπελος οινοφορος . Vitis vinifera.
αμυγδαλη . . . Amygdalus communis.
αναγαλλις . . . Anagallis arvensis.
αναγυρις . . . Anagyris fœtida.
ανδραχνη . . . Portulaca oleracea.
ανδροσαιμον. . . Hypericum perfoliatum.
ανεμωνη ἡμερα . . Anemone coronaria.
ανεμωνη αγρια . . Anemone hortensis.
ανεμωνη μελαινα . Anemone nemorosa?
ανηθον . . . . Anethum graveolens.
ανθεμις . . . . Anthemis chia.
ανθεμις πορφυρανθης. Anthemis rosea.
ανθεμις μηλινανθης . Anthemis tinctoria?
ανισον . . . . Pimpinella Anisum.
αντιρρινον . . . Antirrhinum Orontium.

ανωνις . . . . Ononis arvensis.
απαρινη . . . . Galium saccharatum.
απιος . . . . Euphorbia Apios.
αποκυνον . . . Marsdenia erecta.
αργεμωνη . . . Papaver Argemone ad Sprengelii mentem; Adonis autumnalis Sibthorpii.
αρισαρον . . . Arisarum vulgare.
αριστολοχια κληματιτις. Aristolochia bætica.
αριστολοχια μακρα. Aristolochia parvifolia.
αριστολοχια στρογγυλη. Aristolochia pallida.
αρκειον . . . . Arctium Lappa.
αρκευθος μικρα . . Juniperus Oxycedrus.
αρκευθος μεγαλη . Juniperus phœnicea? secundum Sibthorpium; sed potiùs, ob fructum magnum, J. macrocarpa.
αρκτιον . . . . Inula candida?, vel fortè Verbasci species quædam.
αρνογλωσσον . . Plantago major, aut P. altissima.
αρνογλωσσον μικρον. Plantaginis species quædam; fortè P. Lagopus, vel maritima, aut lanceolata.
αρον . . . . . Arum Dioscoridis.
αρτεμισια . . . Artemisia arborescens.
αρτεμισια λεπτοφυλλος. Artemisia campestris?
ασαρον . . . . Asarum europæum.
ασκληπιας . . . Cynanchum vincetoxicum.
ασκυρον . . . . Hypericum perforatum?
ασπαλαθος . . . Cytisus lanigerus; fortè etiam Genista acanthoclada (s. Spartium horridum).
ασπαραγος . . . Asparagus acutifolius.
ασπληνιον . . . Gymnogramma Ceterach.
ασφοδελος . . . Ornithogalum stachyoides, nec Asphodelus ramosus.
αστηρ αττικος . . Aster Amellus.
αστραγαλος . . Orobus tuberosus.
ατρακτυλις . . . Centrophyllum leucocaulos? secundum Sibthorpium; sed meliùs, Atriplex hortensis, uti monuit Sprengelius.
ατραφαξις . . . Chenopodium Bonus Henricus.
αφακη . . . . Lathyrus Aphaca? aut Vicia quædam, fortè V. angustifolia.
αχιλλειος . . . Achilleæ species.
αχρας . . . . Pyrus communis sylvestris.
αψινθιον θαλασσιον. Artemisia maritima.
αψινθιον Σαντονιον. Achillea pubescens? Artemisia palmata?

βαλαυστιον . . . Punicæ Granati sylvestris flores.
βαλλωτη . . . Lamium striatum? quæsit Sibthorpius; aliis Ballota nigra videtur.
βατος . . . . Rubus fruticosus.
βατος Ιδαια . . Rubus idæus.
βατραχιον . . . Ranunculus asiaticus.
βατραχιον έτερον . Ranunculus lanuginosus.
βατραχιον τριτον . Ranunculus muricatus.
βατραχιον τεταρτον. Ranunculus aquatilis.
βηχιον . . . . Tussilago Farfara.
βλητον . . . . Amaranthus Blitum.
βολβος εδωδιμος . Muscari comosum, secundum Sibthorpium.
βολβος εμετικος . Ornithogalum stachyoides? meliùs Narcissi species, et fortè N. Jonquilla, ob virtutes emeticas.
βοτρυς . . . . Chenopodium Botrys.
βουνιον . . . . Umbellifera quædam.
βουγλωσσον . . . Anchusa paniculata.
βουνιας . . . . Bunias Erucago? potiùs Brassica Napobrassica, ut Sprengelius indicavit.
βουφθαλμον . . . Chrysanthemum segetum.
βραθυς . . . . Juniperus Sabina.
βραθυς έτερον . . Juniperus phœnicea.
βρεταννικη . . . Rumex aquaticus, aut saltem hujus generis species quædam.
βρωμος . . . . Avena fatua.

γαλιοψις . . . Scrophularia peregrina.
γαλιον . . . . Galium verum.
γεντιανη . . . . Gentiana lutea.
γερανιον . . . . Geranium tuberosum. .
γερανιον έτερον . . Erodium malacoides.
γιγγιδιον . . . Ammi Visnaga, v. Daucus Gingidium.
γλαυξ . . . . Astragalus Glaux.
γληχων . . . . Mentha Pulegium.
γλυκυρριζα . . . Glycyrrhiza echinata, v. meliùs G. glanduligera.
γναφαλιον . . . Diotis candidissima.
γογγυλη αγρια . . Erucaria aleppica, ad mentem Sibthorpii; cui non assentit Sprengelius, cum dubio tamen indicans Cordylocarpum muricatum, plantam Numidicam.

δαυκος . . . . Athamanta cretensis.
δαυκος έτερος . . Athamanta Cervaria.
δαυκος τριτος . . Seseli ammoides.
δαφνη . . . . Laurus nobilis.
δαφνη Αλεξανδρεια . Ruscus hypoglossum.
δαφνοειδες . . . Daphne alpina.
δελφινιον . . . Delphinium peregrinum.
δελφινιον έτερον . . Delphinium Consolida.
δικταμνος . . . Amaracus Dictamnus.
δικταμνος απο Κρητης . . . . Ballota acetabulosa, secundum Sibthorpium; Thymum mastichinum, s. Micromeriam nervosam, vult Sprengelius.
διψακος . . . . Dipsacus sylvestris, vel D. fullonum.
δοναξ . . . . Arundo Donax.
δορυκνιον . . . Convolvulus Cneorum aut C. Dorycnium.
δραβη . . . . Lepidium Draba.
δρακοντια μεγαλη . Arum Dracunculus.
δρακοντια μικρα . Arum italicum.
δρυοπτερις . . . Asplenium Adiantum nigrum.
δρυς . . . . . Quercus Ægilops.

ελαια . . . . Olea europæa.
ελαια Αιθιοπικη . Elæagnus angustifolia.
ελατη . . . . Abies Picea?
ελατινη . . . . Linaria spuria.
ελαφοβοσκον . . Pastinaca sativa.
ελαφοσκορδον . . Allium subhirsutum.
ελειοσελινον . . . Apium graveolens.
ελελισφακον . . Salvia officinalis.
ελενιον . . . . Inula Helenium.
ελιχρυσον . . . Helichrysum angustifolium quorundam; sed folia, Abrotano similia, repugnant. Potiùs videtur Tanacetum annuum.
ελλεβορος λευκος . Veratrum album.
ελλεβορος μελας . Helleborus officinalis.

ἑλξινη . . . . Parietaria officinalis.
ἑλξινη (κισσαμπελος) Convolvulus arvensis plurium; Linariæ tamen ægyptiacæ refert Sibthorpius.
ελυμος . . . . Panicum miliaceum.
επιθυμον . . . Cuscuta epithymum.
επιμηδιον . . . Botrychium Lunaria?
επιπακτις . . . Herniariam glabram sagacissimè conjicit Sprengelius.
ερεβινθος . . . . Cicer arietinum.
ερεικη . . . . Erica herbacea, v. potiùs E. arborea, propter similitudinem cum Tamarice.
ερινος . . . . Campanula Erinus.
ἑρπυλλος . . . Thymus Serpyllum.
ἑρπυλλος ζυγις . . Thymus striatus?
ερυθροδανον . . . Rubia tinctorum.
ερυσιμον . . . . Sisymbrium polyceratium.
ευζωμον . . . . Eruca sativa.
ευπατωριον . . . Proculdubiò, Agrimonia Eupatorium; nec Eupatorium cannabinum.
εφημερον . . . Convallaria verticillata.
εχιον . . . . Echium vulgare.

ζεια . . . . . Triticum Spelta.

ἡδυοσμον αγριον . Mentha gentilis.
ἡδυσαρον . . . Securigera Coronilla.
ἡλιοτροπιον μεγα . Heliotropium europæum.
ἡλιοτροπιον μικρον . Crozophora villosa.
ἡμεροκαλλις . . Lilium chalcedonicum.
ἡμιονιτις . . . Nothochlæna Marantæ?
ηριγερων . . . . Senecio vulgaris.
ηρυγγιον . . . Eryngium campestre.

θαλικτρον . . . Thalictrum minus.
θαψια . . . . Thapsia Asclepium, vel T. garganica.
θερμος . . . . Lupinus pilosus.
θερμος αγριος . . Lupinus angustifolius.
θηλυπτερις . . . Pteris aquilina.
θλασπι . . . . Capsella bursa pastoris.
θριδαξ αγρια . . Lactuca Scariola? aut L. virosa.
θριδαξ ἡμερος . . Lactuca sativa.
θυμβρα . . . . Micromeria græca.
θυμελαια . . . Daphne Gnidium.
θυμος . . . . Thymus capitatus.

ἰβηρις . . . . Lepidium graminifolium vel L. Iberis.
ἰδαια ῥιζα . . . Uvularia amplexifolia.
ἱερα βοτανη . . . Verbena officinalis.
ἱερακιον μεγα . . Urospermum picroides?
ἱερακιον μικρον . . Hymenonema græca?
ἰξος . . . . . Viscum album.
ιον . . . . . Viola odorata.
ἱππολαπαθον . . Rumex Hydro-Lapathum.
ἱπποσελινον . . . Smyrnium olusatrum.
ἱππομαραθρον . . Cachrys Morisonii?
ἱπποφαιστον . . Cirsium stellatum.
ἱπποφαες . . . Euphorbia spinosa.
ἱππουρις . . . Equisetum fluviatile.
ἱππουρις ἑτερα . . Equisetum limosum.
ιρις . . . . . Iris germanica et I. florentina.
ισατις . . . . Isatis tinctoria.
ισατις αγρια . . Isatis lusitanica.
ισοπυρον . . . . Corydalis claviculata.
ιτεα . . . . . Salix alba, et fortè S. viminalis.

καπαλια . . . Inula candida?
καλαμαγρωστις . Dactyloctænium ægyptiacum? ait Sibthorpius; meliùs Calamagrostis epigeios.
καλαμινθη τριτη . Melissa officinalis?
καλαμος συριγγιας . Erianthus Ravennæ.
κανναβις αγρια . . Althæa cannabina.
καπνος . . . . Fumaria densiflora.
καππαρις . . . Capparis spinosa.
καρδαμον . . . Lepidium sativum.
καρυα Ποντικα . Corylus Avellana.
καστανον . . . Castaneæ vescæ nux.
καταναγκη . . . Ornithopus compressus.
καυκαλις . . . Caucalis maritima; vix Hasselquistia ægyptiaca, ut credidit Sibthorpius.
κεδρος . . . . Juniperus Oxycedrus, vel potiùs J. phœnicea, secundum Sprengelium, cui assentio.
κεδρος μικρα . . Juniperus communis.
κεγχρος . . . . Setaria italica.
κενταυριον μεγα . Centaurea Centaurium.
κενταυριον μικρον . Erythræa Centaurium.
κερασια . . . . Prunus Cerasus.
κερατια . . . . Ceratoniæ Siliquæ legumina.
κεστρον . . . . Stachys Alopecuros.
κηπαια . . . . Sedum Cepæa.
κικι . . . . . Ricinus communis.
κιγκαια . . . . Cynanchum nigrum.
κιρσιον . . . . Cirsium tenuiflorum.
κισσος . . . . Hedera Helix.
κιστος αρρην . . Cistus villosus.
κιστος θηλυς . . Cistus salvifolius.
κληματις . . . Vinca minor.
κληματιτις . . . Clematis cirrhosa?
κλινοποδιον . . . Melissa Clinopodium.
κλυμενον . . . Calystegia sepium?
κνικος . . . . Carthamus tinctorius.
κοκκος βαφικη . . Quercus coccifera.
κοκκυμηλεα . . Prunus domestica.
κολοκυνθα . . . Cucumis sativus.
κολοκυνθις . . . Cucumis Colocynthis.
Κολχικον . . . Colchicum autumnale.
κομαρος . . . . Arbutus Andrachne? nec A. Unedo.
κονδριλλη . . . Chondrilla ramosissima? vel meliùs Ch. juncea.
κονδριλλη ἑτερα . . Thrincia tuberosa?
κονυζα μειζων . . Inula viscosa.
κονυζα μικρα . . Alunia graveolens.
κονυζα τριτη . . Inula britannica.
κορις . . . . Hypericum Coris.
κοριον . . . . Coriandrum sativum.
κορωνοπους . . . Lotum ornithopodioideum credidit Sibthorpius; potiùs Plantago Coronopus, aut species quædam affinis, secundum Sprengelium.
κοτυληδων . . . Umbilicus pendulinus.
κοτυληδων ἑτερα . Umbilicus erectus.
κραμβη . . . . Brassica oleracea.
κραμβη αγρια . . Brassica incana, potiùs quàm B. cretica, ob folia λευκότερα καὶ δασύτερα.
κραμβη θαλασσια . Calystegia Soldanella.
κρανια . . . . Cornus mascula.
κραταιογονον . . Polygonum Persicaria.
κριθμον . . . . Crithmum maritimum.

κρινον . . . . Lilium candidum.
κροκοδειλιον . . . Echinops viscosus? vel fortè, Eryngium maritimum.
κροκος . . . . Crocus sativus.
κρομμυον . . . Allium Cepa.
κροτων . . . . Ricinus communis.
κυαμος ἑλληνικος . Vicia Faba.
κυδωνια . . . . Cydonia vulgaris.
κυκλαμινος . . . Cyclamen latifolium.
κυκλαμινος ἑτερα . Caprifolium Periclymenum?
κυμινον . . . . Cuminum Cyminum.
κυμινον αγριον . . Lagoëcia cuminoides.
κυνογλωσσον . . Cynoglossum officinale.
κυνοκραμβη . . . Thelygonum Cynocrambe.
κυνοσβατον . . . Rosa sempervirens, nec R. caninæ, var., ut vult Sprengelius, quæ nullo modo δενδρωδης dicenda.
κυπαρισσος . . . Cupressus sempervirens.
κυπειρος . . . . Cyperus rotundus.
κυτινοι . . . . Punicæ Granati flores culti.
κυτισος . . . . Medicago arborea.
κωνειον . . . . Conium maculatum.

λαγωπους . . . Trifolium arvense.
λαδανον . . . . Cistus creticus.
λαθυρις . . . . Euphorbia Lathyris.
λαμψανη . . . Sinapis arvensis.
λαπαθον κηπαιον . Rumex Patientia.
λαπαθον μικρον . . Rumex bucephalophorus, vel R. scutatus.
λαπαθον οξυλαπαθον Rumex crispus, Acetosa, et Acetosella. Aliis videtur Rumex acutus.
λειχην . . . . Peltidea canina, v. aphthosa, nec Marchantia polymorpha, quæ verosimiliter Lichen Plinii.
λεοντοπεταλον . . Leontice Leontopetalum.
λεοντοποδιον . . Micropus erectus?
λεπιδιον . . . . Lepidium latifolium.
λευκακανθη . . . Cirsium tuberosum.
λειμωνιον . . . Statice Limonium.
λευκας . . . . Lamium maculatum.
λευκη . . . . Populus alba.
λευκοιον (θαλασσιον) Mathiola tricuspidata.
λευκοιον μηλινον . Cheiranthus Cheiri.
λευκοιον πορφυρεον . Mathiola incana.
λιβανωτις καρπιμος. Cachrys Libanotis.
λιβανωτις ἑτερα . . Ferula nodiflora? nequaquam Rosmarinus officinalis.
λιγυστικον . . . Laserpitium Siler?
λινοζωστις . . . Mercurialis annua.
λινον . . . . Linum usitatissimum.
λογχιτις . . . Serapias Lingua.
λογχιτις ἑτερα . . Aspidium Lonchitis?
λυκιον . . . . Berberis vulgaris, ut optimè monuit cel. Roylius; nec Rhamnus infectorius, ut plerique crediderunt.
λυκοψις . . . . Echium italicum.
λυσιμαχιον . . . Lysimachia vulgaris.
λυχνις αγρια . . Lychnis Githago.
λυχνις στεφανωματικη. Lychnis coronaria.
λωτος . . . . Celtis australis.
λωτος αγριος . . Trigonella elatior.
λωτος ἡμερος . . Melilotus messanensis, v. M. officinalis.

μαλαχη κηπευτη . Althæam roseam credidit Sibthorpius; sed potiùs Malva sylvestris.
μαλαχη χερσαια . Malva sylvestris; v. potiùs Malva rotundifolia in Græcia vulgaris.
μανδραγορας θριδακιας. Mandragora autumnalis.
μανδραγορας αρρεν . Mandragora vernalis.
μανδραγορας μοριον. Atropa Belladonna?
μαραθρον . . . Fœniculum vulgare.
μαρον . . . . Origanum sipyleum.
μελανθιον . . . Nigella sativa.
μελια . . . . Ornus europæa.
μελιλωτος . . . Melilotus officinalis; seu potiùs M. italica.
μελιμηλα . . . Pyri mali in Cydoniam insiti fructus.
μελισσοφυλλον . . Melissa officinalis.
μεσπιλον . . . Cratægus tanacetifolia, v. meliùs C. Azarolus.
μεσπιλον ἑτερον . . Mespilus germanica.
μηδικη . . . . Medicago sativa.
μηδιον . . . . Campanula Andrewsii?
μηκων αγρια . . Papaveris somniferi varietas, seminibus nigris.
μηκων αφρωδης . . Gratiola officinalis, potiùs quàm Silene inflata, cui virtutes medicæ nullæ.
μηκων ἡμερος . . Papaver somniferum.
μηκων κερατιτις . Glaucium luteum.
μηκων ῥοιας . . . Papaver dubium.
μηλεα . . . . Pyri mali fructus.
μηον . . . . Meum athamanticum.
μυαγρος . . . Camelina sativa.
μυκης . . . . Fungi varii.
μυος ωτα . . . Lithospermum purpureo-cœruleum??
μυρικη . . . . Tamarix gallica.
μυριοφυλλον . . Myriophyllum spicatum.
μυρρις . . . . Myrrhis odorata.
μυρσινη . . . . Myrtus communis.
μυρσινη αγρια . . Ruscus aculeatus.
μωλυ . . . . Allium Dioscoridis dicit Sibthorpius; A. magicum alii.

ναρδος ορεινη . . Valeriana tuberosa.
ναρθηξ . . . . Ferula communis.
ναρκισσος . . . Narcissus poëticus et N. Tazzetta.
ναστος . . . . Cenchrus frutescens.
νηριον . . . . Nerium Oleander.
νουφαρ . . . . Nuphar lutea.
νυμφαια . . . . Nymphæa alba.
νυμφαια αλλη . . Nuphar lutea.

ξανθιον . . . . Xanthium strumarium.
ξιφιον . . . . Gladiolus segetum.
ξυρις . . . . Iris fœtidissima.

ὁλοσχοινος . . . Scirpus mucronatus, vel Cladium germanicum.
ολυρα . . . . Tritici Speltæ varietas, Zea dicta.
οναγρα . . . . Epilobium angustifolium.
ονοσμα . . . . Lithospermum purpureo-cœruleum?
οξυακανθα . . . Cratægus Pyracantha.
οξυσχοινος . . . Juncus acutus.
οξυσχοινος ακαρπος. Eleocharis palustris.
ορεοσελινον . . . Athamanta Libanotis.

οριγανος Ἡρακλεωτικη. — Origanum heracleoticum.
οριγανος ονητις . . — Majorana Onites.
ὁρμινον . . . . — Salvia Horminum.
ορνιθογαλον . . . — Ornithogalum umbellatum.
οροβαγχη . . . — Orobanche caryophyllacea.
οροβος . . . . — Ervum Ervilia.
ορυζα . . . . — Oryza sativa.
ορχις . . . . — Orchis rubra.
οσυρις . . . . — Osyris alba.
ουα . . . . . — Pyrus domestica.
οφιοσκορδον . . — Allium Scorodoprasum.

παγκρατιον . . . — Squilla Pancratium, nec Pancratium maritimum.
παιονια αρρήν . . — Pæonia corallina.
παιονια θηλεια . . — Pæonia officinalis.
παλιουρος . . . — Zizyphus vulgaris, cum quo descriptio Dioscoridis omninò quadrat. Hodiè tamen παλιουρι nomen est Paliuri aculeati, s. ῥαμνου τρισσου Dioscoridis.
πανακες ἡρακλειον . — Opopanax Chironum.
πανακες ασκληπιον . — Echinophora tenuifolia.
πανακες χειρωνιον . — Hypericum origanifolium.
παρθενιον . . . — Anthemis nobilis.
παρωνυχια . . . — Paronychia argentea?
πενταφυλλον . . — Potentilla reptans.
πεπλις . . . . — Euphorbia Peplis.
πεπλος . . . . — Euphorbia falcata.
πεπων . . . . — Cucurbita Pepo.
περικλυμενον . . — Convolvulus arvensis?
περιστερεων . . . — Verbena officinalis.
περιστερεων ὑπτιος . — Verbena supina.
πετασιτης . . . — Petasites vulgaris.
πετροσελινον . . — Athamanta macedonica.
πευκεδανος . . . — Peucedanum officinale.
πευκη . . . . — Pinus maritima.
πηγανον . . . . — Ruta graveolens.
πηγανον αγριον . . — Peganum Harmala.
πηγανον ορεινον . . — Ruta montana.
πιτυς . . . . — Pinus Pinea.
πλατανος . . . — Platanus orientalis.
πολεμωνιον . . . — Polemonium cœruleum.
πολιον . . . . — Teucrium Polium.
πολυγαλον . . . — Polygala amara.
πολυγονατον . . — Convallaria Polygonatum.
πολυγονον αρρήν . — Polygonum aviculare.
πολυποδιον . . . — Polypodium vulgare.
ποταμογειτων . . — Potamogeton natans.
ποτηριον . . . . — Astragalus creticus.
πρασιον . . . . — Marrubium vulgare.
πρινος . . . . — Quercus Ilex.
πταρμικη . . . — Xeranthemum annuum, nec Achillea Ptarmica.
πτελεα . . . . — Ulmus campestris.
πτερις . . . . — Aspidium aculeatum, aut A. Filix mas.
πυρεθρον . . . — Anacyclus Pyrethrum.

ῥαμνος . . . . — Lycium europæum.
ῥαμνος τρισσος . . — Paliurus aculeatus, nec Rhamnus oleoides, ut olim credidit Sprengelius.
ῥαφανις . . . . — Raphanus sativus.
ῥαφανις αγρια . . — Fortè Brassica campestris. Certè haud Cochlearia Armoracia, ut quibusdam visum est.

ῥοα . . . . . — Punica Granatum.
ῥοδια ῥιζα . . . — Sedum Rhodiola.
ῥους . . . . . — Rhus coriaria.

σατυριον . . . — Tulipa Clusiana?
σατυριον ερυθρονιον . — Serapias cordigera Sibthorpii; potiùs Erythronium Dens canis.
σερις ἡμερα . . . — Cichorium Endivia.
σερις αγρια . . . — Cichorium Intybus.
σεσελι Αιθιοπικον . — Bupleurum fruticosum.
σεσελι Μασσαλεωτικον. — Echinophora tenuifolia?
σεσελι Πελοποννησιακον . . . — Angelica sylvestris? potiùs Myrrhis odorata.
σελινον . . . . — Petroselinum sativum.
σεσαμοειδες μικρον . — Reseda canescens.
σιδηριτις . . . . — Stachys recta.
σιδηριτις ἑτερα . . — Sanguisorba officinalis.
σιδηριτις τριτη . . — Scrophularia lucida?
σιδια . . . . — Punicæ Granati fructus putamina.
σικυς ἡμερος . . — Cucumis Melo.
σικυς αγριος . . — Momordica Elaterium.
σινηπι . . . . — Sinapis alba, v. S. nigra.
σιον . . . . . — Heliosciadium nodiflorum.
σιλυβον . . . . — Silybum marianum.
σισαρον . . . . — Pastinaca sativa, nec Sium Sisaron.
σισυμβριον . . . — Mentha aquatica?
σισυμβριον ἑτερον . — Nasturtium officinale.
σισων . . . . — Sison Amomum.
σκαμμωνια . . . — Proculdubiò Convolvulus Scammonia, nec farinosus, ut vult Sibthorpius, quem sequitur Sprengelius. Hic enim, Maderæ incola, radicem habet fibrosam nec gumınosam. In textu τι παχυτητος pro δασυτητος cum Cod. Ald. legerem.
σκανδυξ . . . . — Scandix Pecten Veneris, v. S. australis.
σκιλλα . . . . — Squilla maritima.
σκολυμος . . . — Scolymus hispanicus.
σκορδιον . . . . — Teucrium Scordium.
σκοροδοπρασον . . — Allium descendens, v. fortè Scorodoprasum, aut Ampeloprasum.
σκορπιοειδες . . . — Scorpiurus sulcatus.
σμιλαξ . . . . — Taxus baccata.
σμιλαξ τραχεια . — Smilax aspera.
σμιλαξ λεια . . — Calystegia sepium.
σμυρνιον . . . . — Smyrnium perfoliatum, vel S. Dioscoridis.
σογχος τροφερωτερος — Sonchus oleraceus.
σογχος ἑτερος . . — Sonchus arvensis, vel S. palustris.
σογχος ακανθωδεστερος — Helminthia echioides.
σπαργανιον . . . — Sparganium ramosum.
σπαρτιον . . . — Spartium junceum.
σταφις αγρια . . — Delphinium Staphisagria.
σταφυλινος . . . — Daucus Carota.
σταφυλινος αγριος . — Daucus guttatus.
σταχυς . . . . — Stachys palæstina.
στιχας . . . . — Lavandula Stœchas.
στοιβη . . . . — Poterium spinosum.
στρατιωτης χιλιοφυλλος. — Achillea Millefolium.
στρουθιον . . . — Saponaria officinalis.
στρυχνος ἀλικακαβος — Physalis Alkekengi.
στρυχνος κηπαιος . — Solanum nigrum.
στρυχνος ὑπνοτικος . — Physalis somnifera.

στρυχνος μανικος . Solanum sodomeum.
στυραξ . . . . Styrax officinale.
συκη αγρια . . . Ficus Carica.
συμφυτον πετραιον . Coris monspeliensis.
συμφυτον αλλο . . Symphytum officinale.
σφονδυλιον . . . Heracleum Sphondylium.
σχινος . . . . Pistacia Lentiscus.
σχοινος λειος . . . Isolepis Holoschœnus.

τερμινθος . . . Pistacia Terebinthus.
τευτλον . . . . Beta vulgaris.
τηλεφιον . . . . Cerinthe minor.
τηλις . . . . Trigonella Fœnum græcum.
τιθυμαλος δενδροειδες Euphorbia dendroides.
τιθυμαλος ηλιοσκοπιος. Euphorbia helioscopia.
τιθυμαλος κυπαρισσιας. Euphorbia aleppica, seu E. Cyparissias.
τιθυμαλος μυρσινιτες Euphorbia myrsinites.
τιθυμαλος παραλιος Euphorbia Paralias.
τιθυμαλος πλατυφυλλος. Euphorbia pilosa.
τιθυμαλος χαρακιας Euphorbia Characias.
τορδυλιον . . . Tordylium officinale.
τραγακανθα . . Astragalus aristatus.
τραγιον . . . . Hypericum hircinum.
τραγιον αλλο . . Tragium Columnæ.
τραγοπωγων . . Tragopogon parvifolius.
τραγοριγανος . . Thymum Piperellam quæsit Sibthorpius; sed potiùs, Stachys glutinosa.
τραγος . . . . Ephedra distachya.
τραγοριγανος αλλος . Micromeria juliana? secundum Sibthorpium; Thymus Tragoriganum omninò credit Sprengelius. Res valdè dubia.
τριβολος ενυδρος . Trapa natans.
τριβολος χερσαιος . Tribulus terrestris.
τριπολιον . . . Statice sinuata?
τριφυλλον . . . Psoralea bituminosa.
τριχομανες . . . Asplcnium Trichomanes.
τυφη . . . . Typha latifolia.

υακινθος. . . . Hyacinthus orientalis.
υδνον . . . . . Tuber cibarium.
υδροπεπερι . . . Polygonum Hydropiper.
υοσκυαμος λευκος . Hyoscyamus albus.
υοσκυαμος μελας . Hyoscyamus reticulatus.
υοσκυαμος μηλοειδες Hyoscyamus aureus.
υπερικον . . . Hypericum crispum.
υπηκοον . . . . Hypecoum procumbens.

υπογλωσσον . . . Ruscus Hypoglossum.
υποκιστις . . . Cytinus Hypocistis.
υσσωπος . . . Thymbræ spicatæ retulit Sibthorpius; sed potiùs Origani species quædam.

φακος . . . . Ervum Lens.
φακος ὁ επι των τελματων. Lemna minor.
φαλαγγιον . . . Anthericum ramosum; et nequaquam Lloydia græca, cui retulit Sibthorpius.
φαλαρις . . . . Phalaris canariensis.
φηγος . . . . Quercus Æsculus.
φιλλυρεα . . . Phillyrea latifolia.
φλομος αγρια . . Phlomis fruticosa.
φλομος λευκη αρρην. Verbascum plicatum.
φλομος θηλεια λευκη Verbascum Thapsus.
φλομος μελας . . Verbascum nigrum.
φοινιξ . . . . Lolium perenne.
φου . . . . . Valeriana Dioscoridis, nec V. officinalis.
φραγμιτης . . . Phragmites communis.
φυκος θαλασσιον . Fucoidearum species variæ.
φυλλιτις . . . Scolopendrium vulgare.
φυτευμα . . . Reseda Phyteuma.

χαμαιακτη . . . Sambucus Ebulus.
χαμαιδαφνη . . Ruscus Hypophyllum.
χαμαιδρυς . . . Teucrium Chamædrys.
χαμαικισσος . . Nepeta Glechoma?
χαιμαιλεων λευκος . Carlina gummifera.
χαμαιλεων μελας . Cardopatum corymbosum.
χαμαιπευκη . . Chamæpeuce mutica.
χαμαιπιτυς . . Ajuga Iva; nequaquam Passerina hirsuta, cui οσμη πιτυος nulla.
χαμαιπιτυς τριτη . Ajuga chamæpitys.
χαμαισυκη . . . Euphorbia chamæsyce.
χαμελαια . . . Daphne oleoides.
χελιδονιον . . . Chelidonium majus.
χελιδονιον μικρον . Ranunculus Ficaria.
χρυσανθεμον . . . Chrysanthemum coronarium.
χρυσογονον . . . Leontice Chrysogonum.
χρυσοκομη . . . Linosyris vulgaris.

ψευδοβουνιον . . Trinia vulgaris.
ψευδοδικταμνος . Ballota Pseudodictamnus.
ψυλλιον . . . Plantago Psyllium.

ωκιμοειδες . . . Saponaria ocymoides.

INDICES.

INDEX

NOMINUM QUÆ GRÆCIA HODIE IN USU HABET, CUM SYNONYMIS BOTANICIS.

αβαυκανδύρι . . . . Poterium Sanguisorba.
αγγαθία . . . . . Eryngium campestre.
ἀγκάθι . . . . . Onopordon elongatum et arabicum.
αγλανδινιὰ . . . . Phillyrea latifolia.
αγλήγορα . . . . Thapsia Asclepium.
αγνειὰ . . . . . Vitex Agnus Castus.
ἀγουθοῦρα . . . . Hypericum crispum.
αγουλονάρια . . . . Euphorbia Gerardiana.
ἀγριαγκουριὰ . . . Momordica Elaterium.
ἀγριάδα . . . . . Cynodon Dactylon.
ἀγριάμπελος . . . . Vitis vinifera.
ἀγριοάγκαθι . . . . Notobasis syriaca.
ἀγριοάμπέλι . . . . Clematis Vitalba.
ἀγριοαψιθιὰ . . . . Achillea pubescens.
ἀγριοβαβούλι . . . Lathyrus Aphaca.
ἀγριόβρομος . . . . Bromus sterilis, et Avena fatua.
ἀγριόβρουβα . . . Sisymbrium officinale.
ἀγριογένημα . . . . Avena fatua.
ἀγριοδαμασκηνιὰ . . Prunus insititia.
αγριοηδυόσμος . . . Mentha sylvestris, rotundifolia et gentilis.
ἀγριοήρα . . . . . Festuca ciliata.
ἀγριοθερόκαλλο . . Passerina hirsuta.
ἀγριόκάλαμια . . . Agrostis alba.
ἀγριοκάλαμος . . . Phragmites communis.
ἀγριοκαυκαλίδα . . . Orlaya grandiflora.
ἀγριόκλημα . . . . Caprifolium perfoliatum, necnon Bryonia dioica et cretica.
ἀγριόκόκορος . . . Gladiolus segetum.
ἀγριοκολυκυθιὰ . . . Bryonia dioica et cretica, cum Aro Dioscoridis.
ἀγριοκούκι . . . . Lathyrus annuus, cum Viciâ hybridâ et narbonensi Phacâque bœticâ.
ἀγριοκουμαριὰ . . . Arbutus Andrachne.
ἀγριοκρεμμύδι . . . Allium roseum.
ἀγριόκρινος . . . . Iris graminea et I. Sisyrinchium ; necnon Oporanthus luteus.
ἀγριοκύναρα . . . . Cynara Scolymus et cornigera, cum Rhapontio acauli.
ἀγριολαθούρι . . . Lathyrus Aphaca et sativus.
ἀγριόλαλος . . . . Oporanthus luteus.
ἀγριολάπαθων . . . Rumex Hydrolapathum.
ἀγριολινάρι . . . . Linum angustifolium et Delphinium Consolida.
ἀγριολίτζα . . . . Vinca minor.
ἀγριολούπουνο . . . Lupinus hirsutus et angustifolius; necnon Phaca bœtica.
ἀγριόλυκος . . . . Bartsia Trixago.
ἀγριομάλαθον . . . Fœniculum vulgare.
ἀγριομαροῦλιὰ . . . Phœnopsis viminea et Taraxacum Dens Leonis.
ἀγριομηλιὰ . . . . Pyrus Malus.
ἀγριομοσκιὰ . . . . Rosa sempervirens.
ἀγριοπαπαρούνα . . . Ranunculus montanus.
ἀγριοπήγανος . . . Coronilla Emerus.
ἀγριόπρα . . . . . Sisymbrium polyceratium.
ἀγριόπρασον . . . Allium rotundum et subhirsutum.
ἀγριοπρουνελλιὰ . . Prunus domestica.
ἀγριοῥαδίκον . . . Thrincia tuberosa, et Crepis fuliginosa.
ἀγριορίγανι . . . . Lagoecia cuminoides, et Origanum vulgare.
ἀγριοῥιζάρι . . . . Rubia peregrina.
ἀγριοσέκαλι . . . . Triticum villosum.
ἀγριοσέλινον . . . . Smyrnium olusatrum, Apium graveolens, etiamque Ranunculus asiaticus.
ἀγριοσεῦκλον . . . Rumex spinosus.
ἀγριοσιφώναρι . . . Avena fatua.
ἀγριοσκάρφη . . . Inula Oculus Christi.
ἀγριοσκίλλα . . . Pancratium maritimum, et Ornithogalum stachyoides.
ἀγριοσπανάκια . . . Chenopodium Bonus Henricus.
ἀγριόστάρι . . . . Festuca uniglumis, necnon Ægilops ovata.
ἀγριοσταφίδα . . . Delphinium Staphisagria, et Phytolacca decandra.
ἀγριοστάχυς . . . . Hordeum murinum.
ἀγριοσυκιά . . . . Ficus Carica.
ἀγριοτζουκνίδα . . . Carpinus Betulus.
ἀγριοτριαντάφυλλὰ . Rosa sempervirens et canina.
ἀγριοφασκιὰ . . . . Crozophora tinctoria.
ἀγριοφασόλι . . . Anagyris fœtida.
ἀγροελιὰ . . . . Olea europæa.
ἂζόγερα . . . . . Anagyris fœtida.
ἂζῶγερας . . . . Anagyris fœtida.
ἄιρα . . . . . Triticum repens.
ακόνιτον . . . . . Aconitum Napellus.
ἄκορος . . . . . Acorus Calamus.

ἁλαφρὰ . . . . . Trifolium stellatum.
αλητοποὺρδι . . . Lycoperdon Bovista.
αλητουνούρα . . . Phalaris paradoxa, et Alopecurus utriculatus.
αληφασκιὰ . . . . Salvia triloba.
ἁλογάκι γλυκύγη . . Clematis Flammula.
αλοὲ . . . . . Aloe vulgaris.
αλουπονόρα . . . . Lagurus ovatus.
ἀμάραντο . . . . Sedum eriocarpum, et ochroleucum, necnon Teucrium Polium.
ἀμπελοκλαδορίζα . . Aristolochia longa.
ἀμπελόνα . . . . Vitis vinifera, necnon Opopanax Chironium.
ἀμπελόχα . . . . Malva sylvestris.
ἀμυγδαλιὰ . . . . Amygdalus communis.
ανάγυρι . . . . . Anagyris fœtida.
ανάλατος . . . . Centranthus ruber.
ανάρθηκας . . . . Ferula communis.
ἀνδράβανω . . . . Anagyris fœtida.
ἀνδρακλέιδα . . . . Peplis Portula.
ἀνδράχνη . . . . Peplis Portula.
ανδρυάνος . . . . Sambucus racemosa.
ανεμόκλειτι . . . . Parietaria officinalis.
ανεραιδόχορτον . . . Usnea barbata.
ανόνειδα . . . . . Ononis arvensis.
απεῖλιρας . . . . Rhamnus infectorius.
απάγανος . . . . Ruta Chalepensis.
ἀπίδι . . . . . Pyrus communis.
ἀρεός . . . . . Quercus Ilex.
ἀριὰ . . . . . Quercus Ilex.
αρκουδόβατος . . . Smilax aspera.
ἁρμπέτα . . . . . Borago officinalis.
ἁρμυρίκη . . . . . Tamarix gallica.
ἁρμυρίθρα τοῦ πέλαγου Medicago marina.
αρτετήκα, ἰβα . . . Scabiosa africana.
αρώματος . . . . Eruca sativa.
ἀσάρον . . . . . Asarum europæum.
ασκόλυμβρος . . . Scolymus hispanicus.
ασπάλαθεια . . . . Cytisus lanigerus.
ασπάλαθος . . . . Cytisus lanigerus.
ἄσπρη ἀγκάθα . . . Picnomon Acarna.
ἄσπροκέφαλος . . . Ammi majus.
ἄσπρολοῦλουδα . . . Bellis perennis.
ἄσπροπίκροπάνδι . . Ballota pseudo-Dictamnus.
αστοῖβη . . . . . Poterium spinosum.
ασφόδελω . . . . Asphodelus ramosus.
ἀτζετόσα . . . . Rumex bucephalophorus.
ἀτρακλύδα . . . . Carlina corymbosa.
ἀτράκτυλι . . . . Kentrophyllum leucocaulos.
ἀτραξύλη . . . . Carlina corymbosa, et Kentrophyllum lanatum.
ἄυκος . . . . . Pisum sativum, et Lathyrus Ochrus.
ἀυτία τῆς παπαδιὰς . Umbilicus pendulinus.
αφάννα . . . . . Genista Scorpius, et Poterium spinosum.
αχλάδα . . . . . Pyrus communis, et Cratægus oxyacantha.
αχλαδιὰ . . . . . Pyrus communis.
αχράδι . . . . . Pyrus communis.

βαλοκμικὸν . . . . Bupleurum glumaceum.
βάλσαμινο . . . . Hypericum Coris.
βάλσαμον . . . . Hypericum perforatum et crispum.
βασίλικος ἀγριος . . Salvia verbenaca.
βάτος . . . . . Rubus fruticosus.
βάτω . . . . . Rubus fruticosus.
βελανιδιὰ . . . . Quercus Ægilops.
βελόνι . . . . . Caucalis daucoides.
βετονικὴ . . . . . Stachys Alopecurus.
βήκα . . . . . Vicia sativa.
βιολέτα . . . . . Viola odorata et canina.
βληχώνι . . . . . Mentha Pulegium.
βλίτον . . . . . Amaranthus Blitum.
βολβό . . . . . Muscari comosum.
βόλκικος . . . . Squilla maritima.
βόλχικον . . . . Colchicum autumnale.
βορβοί . . . . . Hyacinthus spicatus.
βορβοὺς . . . . . Muscari comosum.
βούγλωσσον . . . . Echium plantagineum.
βουδόγλωσσον . . . Anchusa paniculata, et Echium plantagineum.
βουζιὰ . . . . . Sambucus Ebulus.
βοῦκιθο . . . . . Cistus monspeliensis.
βουρβὸς . . . . . Muscari comosum et racemosum.
βούρλα . . . . . Juncus acutus et glaucus.
βούρλω . . . . . Juncus acutus.
βουτυρόχορτον . . . Salvia Verbenaca, Plantago afra, Prunella vulgaris.
βουφιὸς . . . . . Muscari comosum.
βρομόχορτον . . . Heliotropium europæum, Conium maculatum, Scrophularia peregrina.
βρυσὸς . . . . . Ulmus campestris.

γαδαροσφάκα . . . Phlomis fruticosa.
γαιδαράγκαθο . . . Carduus nutans, et Onopordon elongatum.
γαλαζόχορτον . . . Euphorbia Characias.
γαλαξίδα . . . . Periploca græca; etiam Euphorbia Peplus, paralias, helioscopia, myrsinites et Characias.
γαλάχορτον . . . . Euphorbia helioscopia.
γαρούφαλλα τοῦ βουνοῦ Dianthus prolifer.
γατονούρα . . . . Trifolium angustifolium.
γαύρος . . . . . Carpinus Betulus.
γένεια τοῦ λαγοῦ . . Tragopogon major.
γερούλι . . . . . Hyoscyamus albus.
γλυκοκόκκα . . . . Celtis australis.
γλυκόριζα . . . . Glycyrrhiza echinata et glabra.
γλυστριδα . . . . Portulaca oleracea.
γλυφόνι . . . . . Mentha Pulegium.
γόγγολι . . . . . Lychnis Githago.
γορίτζια . . . . . Prunus spinosa.
γουθοῦρα . . . . . Hypericum Coris.
γουλιὰ, ἀγρια . . . Campanula ramosissima, et Specularia Speculum.
γουργουγιάννης . . . Cynoglossum officinale et apenninum.
γρηλαρη . . . . . Piptatherum multiflorum, et Andropogon halepensis.
γριζέλλια . . . . Lotus edulis.

δαδάκι . . . . . Lithospermum fruticosum.
δάκρυα της παναγίας . Helichrysum angustifolium.
δάφνη . . . . . Laurus nobilis.
δαφνοείδες . . . . Prunus Laurocerasus.
δένδρο . . . . . Quercus pedunculata et pubescens.
δενδρολίβανον . . . Rosmarinus officinalis.
δενδρομολώχα . . . Althæa rosea.
δενδροφθήρι . . . Polypodium vulgare.

δοδεκάνθη . . . . Ajuga Chamæpitys.
δρακοντιὰ . . . . Arum Dracunculus, et maculatum, cum Arisaro vulgari.

ἔλατη . . . . . Pinus Picea.
ἔλατος . . . . . Pinus Picea.
ερεικὴ . . . . . Erica herbacea.
ἐτιά . . . . . Salix triandra, fragilis et alba.
ευζώματον . . . . Eruca sativa.

ζίζιφι . . . . . Ziziphus vulgaris.
ζοχάδοχορτον . . . Ranunculus Ficaria.

ἤζωπον . . . . . Micromeria nervosa.
ἡλιοτρόπιον . . . . Heliotropium europæum, et Crozophora villosa.
ἡμερο θερόκαλλο . . Daphne dioica.
ἥρα . . . . . Lolium temulentum et arvense.

θάλασσωγαμβρος . . Statice Limonium.
θερμόχορτον . . . Erythræa Centaurium.
θρίδαξ . . . . . Lactuca muralis.
θρίμβη . . . . . Satureia Thymbra.
θρίμβος . . . . . Satureia Thymbra.
θρούμπι . . . . . Micromeria græca, et Thymus capitatus.
θυμάρι . . . . . Thymus capitatus.
θύμβρο . . . . . Satureia Thymbra.
θυμιὸ . . . . . Thymus capitatus.

ἰκνος . . . . . Tuber cibarium.
ἰξιὰ . . . . . Viscum album.
ισκα . . . . . Polyporus igniarius.

καβάκι . . . . . Populus nigra.
καλα άνθη . . . . Centaurea Calcitrapa.
καλάγγαθο . . . . Cnicus benedictus.
καλαμίθρα . . . . Mentha sylvestris.
καλαμολόγχη . . . Allium Chamæmoly.
κάλαμος . . . . . Arundo Donax.
καλογερικόχορτον . . Lavandula spica.
καλόγερο . . . . Erodium cicutarium.
καλόγερου τὸ χόρτον . Convolvulus tenuissimus.
καλογρίτζα . . . . Phlomis lunarifolia.
καλοκοιμηθήκες . . . Helichrysum angustifolium.
καπισούρα . . . . Lotus edulis.
καπνὸ . . . . . Fumaria densiflora.
καπνόχορτον . . . Fumaria capreolata et densiflora.
καππαριὰ . . . . Capparis spinosa.
καραβιδόχορτον . . Zacintha verrucosa.
καραβούκι . . . . Asphodelus ramosus.
κάρδαμο . . . . . Lepidium sativum.
καρυοφύλλον . . . Dianthus Caryophyllus.
καρφόχορτον . . . Pallenis spinosa.
καστανιὰ . . . . . Castanea vesca.
κατεφίδια ἀγρια . . Bidens tripartita.
κατζα . . . . . Trichonema bulbocodium.
κατζουκοκλάρι . . . Trifolium angustifolium.
καυκαλίδα . . . . Tordylium officinale.
κέδρος . . . . . Juniperus communis et Oxycedrus.
κεκρὶ . . . . . Echinochloa crus galli.
κένδρος . . . . . Juniperus phœnicea.
κεράδα . . . . . Celtis australis.
κερασιὰ ἀγρια . . . Prunus Cerasus.
κερασούλια . . . . Physalis Alkekengi.

κισσὸν . . . . . Hedera Helix.
κισσὸς . . . . . Hedera Helix.
κιστάρι . . . . . Cistus villosus et salvifolius.
κιτρινόξυλον . . . Rhamnus Alaternus.
κλεμαξίδα . . . . Viburnum Lantana.
κλέθρα . . . . . Alnus glutinosa.
κλήμα . . . . . Vitis vinifera.
κοκκιναγκαθὸ . . . Carlina lanata.
κόκκολη . . . . . Lychnis Githago.
κοκκορέτζα . . . . Pistacia Terebinthus.
κοκκοροβιθιὰ . . . Eadem.
κοκονόχορτον . . . Anthyllis vulneraria.
κόλλα . . . . . Chondrilla juncea.
κολλητζίδα . . . . Galium Aparine, Asperugo procumbens, et Xanthium strumarium.
κολλοκίκι . . . . Ricinus communis.
κολλοπάννα . . . . Petasites vulgaris.
κολλωρίδα . . . . Sedum ochroleucum.
κολλώστουπα . . . Astragalus aristatus.
κολυγίδα . . . . Galium tricorne.
κονύτζα . . . . . Inula viscosa.
κορίανδρον . . . . Coriandrum sativum.
κόρις . . . . . Ophrys tenthredinifera.
κορτζιδιὰ . . . . Celtis australis.
κόστον . . . . . Melissa grandiflora.
κοτυλήδα . . . . Umbilicus pendulinus.
κουκάκι . . . . . Silene inflata.
κουκουβαγιὰ . . . . Chrysanthemum segetum.
κουκούλη . . . . Phalaris canariensis.
κουκουλοφάνια . . . Euphorbia spinosa.
κουκουμαριὰ . . . . Fragaria vesca.
κουκουροβιθια . . . Cercis Siliquastrum.
κουκουναριὰ . . . . Pinus Pinea.
κουμαριὰ . . . . . Arbutus Unedo.
κουμηλεὰ . . . . . Pyrus domestica.
κουνουκλιὰ . . . . Cistus villosus et salvifolius.
κουρφέστος . . . . Geropogon glaber.
κουσβαρὰς . . . . Coriandrum sativum.
κουφάγκαθο . . . . Silybum marianum, et Notobasis syriaca.
κουφοβρέλος . . . Isolepis Holoschœnus β.
κουφολαχανήδα . . . Knautia? amplexicaulis.
κουφολάχανον . . . Knautia? amplexicaulis.
κουφοξυλιὰ . . . . Sambucus nigra.
κοψόχορτον . . . . Melissa Clinopodium.
κρήταμον . . . . Crithmum maritimum.
κρίθμος . . . . . Salicornia herbacea.
κρίνο . . . . . Lilium candidum.
κρίνος . . . . . Iris germanica et Convallaria majalis.
κρομμύδι . . . . . Allium Cepa.
κρομμύον . . . . . Sedum Cepæa.
κροτωνεῖα . . . . Ricinus communis.
κυδωνιὰ . . . . . Cydonia vulgaris.
κυκλαμίδα . . . . Cyclamen persicum.
κυπαρισσιὰ . . . . Cupressus sempervirens.
κυπαρισσόχορτον . . Plantago Coronopus.
κύπειρη . . . . . Cyperus rotundus.
κυπειρος . . . . . Cyperus longus.
κύρας το χόρτον . . Teucrium Polium.
κυράτζουκλημα . . . Astragalus bœticus.
κύσσος . . . . . Nepeta Glechoma.
κωραλλοβότανον . . Ruscus Hypophyllum.
κωράχορτον . . . . Digitalis ferruginea.

λαγοκέρασιὰ . . . . Ribes uva crispa.
λαγομηλια . . . . Arbutus Unedo.
λαγομιλιὰ . . . . Ruscus aculeatus.
λαγουνούρα . . . . Lagurus ovatus.
λαγόψωμὶ . . . . Picridium vulgare.
λαδανεῖα . . . . . Cistus crispus.
λάδανω . . . . . Cistus creticus.
λαδζιχέρι . . . . Rhamnus infectorius.
λαμψάνη . . . . . Sinapis arvensis.
λάπαθο . . . . . Rumex crispus, pulcher et obtusifolius.
λάππα . . . . . Alisma Plantago.
λάχονον . . . . . Brassica oleracea.
λαψάνα . . . . . Sinapis arvensis et pubescens.
λειχηνοχόρτον . . . Hypericum perforatum et perfoliatum.
λεμονόχορτον . . . Bellidiastrum Michelii.
λεῶπουρνὰ . . . . Ilex Aquifolium.
λεπίδι . . . . . Lepidium latifolium.
λεπιδόχορτον . . . Plumbago europæa.
λεπτοκαριὰ . . . . Corylus Avellana.
λευκὰγκάθα . . . . Rhamnus catharticus.
λεύκη . . . . . Populus alba.
λεωντοπόδιον . . . Alchemilla alpina.
ληγουνιὰ . . . . . Pæonia corallina.
λιβανόχορτον . . . Ajuga chamæpitys, et Teucrium Polium.
λιζάρι . . . . . Rubia tinctorum.
λινάρι . . . . . Linum usitatissimum et angustifolium.
λιναρίθρα . . . . Delphinium peregrinum.
λινον . . . . . Linum gallicum.
λιπα . . . . . Tilia europæa.
λούπουνι . . . . . Lupinus angustifolius.
λυγαριὰ . . . . . Vitex Agnus castus.
λυγειὰ . . . . . Vitex Agnus castus.
λυκονόρα . . . . Bromus mollis.
λύκορδα . . . . . Allium subhirsutum,
λύκος . . . . . Orobanche caryophyllacea et cærulea.
λυκοτρίβολα . . . Valerianella olitoria.
λύπουνι . . . . . Lupinus pilosus.
λυχνοεῖδες . . . . Silene Armeria.

μαβροκοκο . . . . Nigella damascena.
μαβροκουκάδεις . . . Nigella sativa.
μαβρομάργο . . . . Ballota Pseudodictamnus.
μάκα . . . . . Chara vulgaris.
μάκος . . . . . Pæonia officinalis.
μαμουσιὰ . . . . . Prunus spinosa.
μανδραγοῦρα . . . Mandragora officinalis.
μανιτάρι . . . . . Agaricus campestris.
μανούνι . . . . . Echium italicum.
μάνταλια . . . . . Tetragonolobus purpureus.
μανταλίνα . . . . Chrysanthemum coronarium.
μαργώχορτον . . . Scorpiurus acutifolia.
μαρουλάκι . . . . Lepidium Draba.
μαυροβεργιὰ . . . Cornus sanguinea.
μαυροκεφάλι . . . Lavandula Stœchas.
μεζαίρεον . . . . Daphne Mezereum.
μέλεος . . . . . Ornus europæa.
μελήγονον . . . . Arenaria rubra.
μεληκάρι . . . . . Dorycnium suffruticosum.
μελίλωτον θηλυκὸν . . Dorycnium rectum.
μελισσοβότανον . . . Melissa officinalis.
μελισσόχορτον . . . Melissa officinalis.
μελιτζίνι . . . . . Thymus capitatus.
μελίχορτον . . . . Onosma stellulatum.

μέλλα . . . . . Viscum album.
μέρσινον . . . . . Myrtus communis.
μεσαδρούλα . . . . Reseda undata.
μετάξι τῆς ἀλεποῦ . . Cuscuta epithymum.
μικροκούκουλι . . . Celtis australis.
μολούχα . . . . . Mentha sylvestris.
μολόχα . . . . . Mentha rotundifolia et sylvestris.
μολώχη ἡμερα . . . Althæa rosea.
μορύντζα . . . . . Cratægus Oxyacantha.
μοσκολάχανον . . . Erodium moschatum.
μοσχόφιλο . . . . Oxalis corniculata.
μουντρίνα . . . . Acanthus spinosus.
μουστάκια τοῦ κατζούλιου Phleum echinatum.
μουτρίνα . . . . . Acanthus spinosus.
μουτρούνα . . . . Acanthus spinosus.
μυιλκυνιὰ . . . . Berberis cretica.
μυροδιὰ . . . . . Petroselinum sativum.
μύρσινη . . . . . Myrtus communis.
μυρτιὰ . . . . . Eadem.
μύρτον . . . . . Eadem.
μυστικιὰ . . . . . Tamarix gallica.
μῶρόχορτον . . . . Adonis autumnalis.

νεράνιζουρα . . . . Lotus edulis.
νεροάγκαθι . . . . Cirsium tricephalodes et arvense.
νεροκάρδαμον . . . Nasturtium officinale.
νεροκολοκυθιὰ . . . Nymphæa alba.
νερόκρατης . . . . Dipsacus sylvestris.
νερόκρινος . . . . Iris Pseudacorus.
νεροσέλινον . . . . Helosciadium nodiflorum.
νήχακι . . . . . Melilotus officinalis.
νικάκι . . . . . Trigonella corniculata.
νουνούφαρον . . . . Nuphar lutea.
νύφαρον . . . . . Eadem.

ξεκούλι . . . . . Symphytum tuberosum.
ξινίτρα . . . . . Rumex tuberosus et Acetosa.
ξινόχορτον . . . . Thelygonum Cynocrambe.
ξυλόβατος . . . . Smilax aspera.
ξυλοθρόμβος . . . Onosma orientale.
ξυλοκερατιὰ . . . . Ceratonia Siliqua.

οβρυὰ . . . . . Tamus communis.
ὁμοιοπλευρὸν . . . Thapsia villosa.
οξος . . . . . Loranthus europæus.
οξυὰ . . . . . Fagus sylvatica.
οξυακάνθα . . . . Berberis vulgaris.
οξυλίδι . . . . . Rumex Acetosa et Acetosella.
ορεινιὰ . . . . . Ficus Carica.
ορινθόκολι . . . . Zacintha verrucosa.
ορνεος . . . . . Ficus Carica.
ορνος . . . . . Ficus Carica.
οστρυὰ . . . . . Ostrya vulgaris.
οὐρὰ τοῦ ἀλεποῦ . . Orchis undulatifolia.
——— λαγοῦ . . . Orchis Morio.
ὀχητρα . . . . . Reseda alba.
ὀχιστρα . . . . . Reseda Luteola, lutea et Phyteuma.

παλαδρακούλια . . . Cerinthe aspera.
παλακορώκιες . . . Köleria phleoides.
παλαμονίδα . . . . Ononis arvensis.
παλιούρι . . . . . Paliurus aculeatus.
παναγιόχορτον . . . Teucrium Polium.

παπαδίτζα . . . . Eryngium tricuspidatum.
παπαδοῦλα . . . . Cichorium Intybus et Leontodon hispidum.
παπαροῦνα . . . . Papaver Rhœas, cum Anemone coronaria hortensique.
παπούνι . . . . . Anthemis Chia et rosea.
πενταδάκτυλα . . . Potentilla reptans.
πεντάνεβρον . . . . Plantago serraria.
πεντανευρον . . . . Plantago major et lanceolata.
πενταφύλλο . . . . Potentilla reptans.
περδικάκι . . . . Parietaria officinalis.
περδικούλη . . . . Anagallis arvensis.
περιπλοκάδι . . . . Convolvulus arvensis et althæoides.
πετηνὸς . . . . . Papaver Rhœas.
πετροανάρθηκας . . . Cachrys cristata.
πετροκάλαμο . . . Cenchrus frutescens.
πεῦκος . . . . . Pinus maritima.
πήγανι . . . . . Ruta graveolens, montana et spathulata.
πήγανος . . . . . Ruta graveolens.
πικραλίδα . . . . Helminthia asplenioides et Cichorium Intybus.
πικροδάφνη . . . . Nerium Oleander.
πικρολούβι . . . . Securigera Coronilla.
πικροῤίζα . . . . . Aristolochia longa.
πιπούρια ἀγρια . . . Polygonum Persicaria.
πιρνάρι . . . . . Quercus coccifera.
πισπερίτζα . . . . Ballota nigra.
πλάτανος . . . . Platanus orientalis.
πλατομαντυλίδα . . Arctium Lappa.
πλεμονόχορτον . . . Alisma Plantago.
πλευροτόξυλον . . . Osyris alba.
πλημονόχορτον . . . Salvia verticillata.
πόλεον τοῦ βοῦνου . . Teucrium Polium.
πολυγονάτον . . . Convallaria multiflora.
πολύκαρπος . . . . Thapsia fœtida, et garganica, necnon Opoponax Chironium.
πολυκόμπος . . . . Ephedra distachya.
πολυπόδι . . . . Polypodium vulgare.
πολυτρίχι . . . . Equisetum fluviatile, Asplenium Trichomanes, et Adiantum Capillus Veneris.
πουρδάλα . . . . Leontice Leontopetalum.
πριονήτης . . . . Stachys Betonica.
προβατόχορτον . . . Sherardia arvensis.
πρώφασις . . . . Statice sinuata.
πτέρις . . . . . Pteris aquilina.
πυξάρι . . . . . Buxus sempervirens.

ῥαδίκι . . . . . Cichorium Intybus et Thrincia tuberosa.
ῥάμνος . . . . . Lycium europæum.
ῥαυγόχορτον. . . . Cerastium grandiflorum.
ῥαφανίδα . . . . . Raphanus Raphanistrum.
ῥεβίθι . . . . . Cicer arietinum.
ῥεγολίτζα . . . . Glycyrrhiza glabra.
ρεἰκη . . . . . Erica herbacea.
ρεἰτζη . . . . . Erica multiflora.
ρέννα βούτομο . . . Lagurus ovatus.
ρήκη . . . . . Erica multiflora.
ῥίγανι . . . . . Origanum heracleoticum et vulgare, necnon Majorana Onites.
ριζάρι . . . . . Rubia tinctorum et lucida.
ρίκι . . . . . Erica arborea et herbacea.
ῥοα . . . . . Punica Granatum.
ρόβι . . . . . Ervum Ervilia.
ῥοδοδάφνη . . . Nerium Oleander.
ῥοιδιὰ . . . . . Punica Granatum.

σαλέπι . . . . . Orchis rubra.
σαμάκι . . . . . Erianthus Ravennæ.
σαμβούνι . . . . . Umbilicus pendulinus.
σανδύκι . . . . . Scandix Pecten Veneris.
σαρίχα . . . . . Anthyllis Hermanniæ.
σαρκαθρόφιον . . . Salvia Verbenaca.
σαρκινοβοτάνι . . . Orchis undulatifolia et rubra, cum Ophrydi apiferâ.
σαρκοθρόφι . . . . Salvia Verbenaca et Horminum.
σαρμάσικι . . . . Cynanchum acutum.
σάρομα . . . . . Marrubium peregrinum.
σάρωμα . . . . . Anthyllis Hermanniæ.
σγαράντζι . . . . Œnanthe pimpinelloides.
σεννα . . . . . Globularia Alypum.
σιδερόσταρο . . . . Ægilops ovata.
σιτοθόρι . . . . . Scabiosa prolifera.
σκαλιζονάκι . . . . Cerinthe aspera.
σκαρδαβίκα . . . . Anchusa variegata.
σκαρολάχανον . . . Mercurialis annua et Brassica cretica.
σκαρούπα . . . . Pyrus domestica.
σκαρόχορτον . . . Mercurialis annua.
σκάρφη . . . . . Veratrum nigrum et Helleborus officinalis.
σκιλίθρο . . . . . Alnus glutinosa.
σκίλλα . . . . . Squilla maritima.
σκολαρικάκια . . . Briza maxima.
σκολυμβρος . . . . Scolymus hispanicus.
σκολυμος . . . . Scolymus hispanicus.
σκορδεὸ . . . . . Teucrium Scordium.
σκορδόχορτον . . . Idem.
σκορπίδι . . . . . Asplenium Adiantum nigrum, Gymnogramma Ceterach, et Doronicum Pardalianches.
σκορσονέρα . . . . Scorzonera glastifolia et crocifolia.
σκουδρίτζα . . . . Hypericum crispum.
σκοῦλόχορτον . . . Marrubium vulgare.
σκουλτάρα . . . . Dipsacus sylvestris.
σκροπιδόχορτον . . . Scrophularia canina.
σκυλόγλωσσον . . . Lithospermum purpureo-cœruleum.
σμάρι . . . . . Thymus striatus.
σορμπιὰ . . . . . Pyrus domestica.
σουρμπὰ . . . . . Pyrus domestica.
σόχος . . . . . Sonchus oleraceus.
σπαθόκορτον . . . . Gladiolus segetum.
σπαράγγι . . . . Asparagus acutifolius.
σπαρτο . . . . . Spartium junceum.
σπασσόχορτον . . . Colchicum latifolium.
σπηρόχορτον . . . Sherardia arvensis.
σπουρδακύλα . . . Asphodelus ramosus.
σπουρδοκοκύλα . . . Ranunculus lanuginosus et muricatus.
σπυρὶ . . . . . Verbascum Blattaria.
στακτέρι . . . . . Fumaria capreolata et densiflora.
σταρόλυκος . . . . Bartsia Trixago.
σταφίδα . . . . . Vitis vinifera.
σταφυλάκι . . . . Sedum ochroleucum.
σταφυλόνα . . . . Daucus Carota.
σταυράγκαθι . . . Kentrophyllum leucocaulon.
σταυροβοτάνι . . . Verbena officinalis.
σταχυς . . . . . Stachys lanata.
στοματόχορτον . . . Amaracus Dictamnus.

στουράκι . . . . . Styrax officinale.
στουρέκι . . . . . Globularia Alypum.
στρουθόνι . . . . . Silene Behen.
στρούθουλα . . . . Silene inflata.
σύμλαγα . . . . . Carlina corymbosa.
συνεφὸ . . . . . Cytisus hirsutus.
σύφα . . . . . Scirpus lacustris.
σφάκα . . . . . Phlomis fruticosa.
σφαλάγγαθος . . . . Eryngium creticum.
σφαλαγγόχορτον . . Rhagadiolus stellatus.
σφαραγγιὰ . . . . Asparagus acutifolius.
σφεντάμι . . . . . Tilia europæa.
σφουγγίτα . . . . Lecanora Villarsii.
σφουρδακύλα . . . Ranunculus Ficaria.
σχελόγλωσσον . . . Cynoglossum officinale et apenninum.
σκῖνος . . . . . Pistacia Lentiscus.

τάτουλα . . . . . Datura Stramonium.
τετράμιθος . . . . Pistacia Terebinthus.
τετράγκαθο . . . . Astragalus aristatus.
τζάκρω . . . . . Leontice Leontopetalum.
τζαπουρνιὰ . . . . Prunus spinosa et Cratægus Oxyacantha.
τζικνίδα . . . . . Urticæ species omnes.
τζινγάκι . . . . . Thelygonum Cynocrambe.
τζίντζιφον . . . . Ziziphus vulgaris.
τζιτζιμβόλα . . . Chrysanthum segetum et coronarium.
τήλι . . . . . Trigonella Fœnum græcum.
τζόγιες . . . . . Briza minor.
τιθυμαλὼ . . . . Euphorbia Characias.
τραγακάνθα . . . . Astragalus aristatus.
τρήμερα . . . . . Cyclamen europæum.
τριβόλι . . . . . Tribulus terrestris et Onobrychis crista galli.
τρικλαμιὰ . . . . Cyclamen europæum.
τρικοκκιὰ . . . . Cratægus Oxyacantha et tanacetifolia.
τρίφυλλι . . . . . Meliloti et Trifolii species variæ.
τριχωστάχυς . . . Hordeum murinum.
τροκκιὰ . . . . . Pyrus Aria.
τρυγονολόχορτον . . Astragalus monspessulanus.

ὑδνος . . . . . Tuber cibarium.
ὑοσκύαμος . . . . Hyoscyamus albus.
ὑπέρικον . . . . . Hypericum crispum.
ὑσσόπο . . . . . Micromeria juliana et græca.

φακὴ . . . . . Ervum Lens.
φαλαρίδα . . . . Centaurea solstitialis.
φασκομηλιὰ . . . . Salvia pomifera et triloba, necnon Cistus salvifolius.
φάσκος . . . . . Salvia triloba.
φάσσοχορτον . . . Prasium majus.
φιδάγγαθον . . . . Eryngium campestre.
φιλουριὰ . . . . . Tilia europæa.
φιλόχορτον . . . . Arum Dracunculus.
φλόιμος . . . . . Euphorbia Characias.
φλομάκι . . . . . Euphorbia Apios.
φλόμο . . . . . Euphorbia dendroides et Phlomis fruticosa.
φλόμος . . . . . Verbascum Thapsus, plicatum et sinuatum; necnon Euphorbia dendroides, palustris et Characias.
φονόχορτον . . . . Agrimonia Eupatoria.
φοῦδουρα . . . . Hypericum Coris.
φουσκούδια . . . . Silene inflata.
φράουλι . . . . . Fragaria vesca.
φτελιὰ . . . . . Ulmus campestris.
φύκια . . . . . Zostera marina.
φύλλικα . . . . . Phillyrea latifolia.
φυλλίκι . . . . . Phillyrea latifolia.

χαίτα . . . . . Phragmites communis.
χαμαιδρυὰ . . . . Teucrium chamædrys et flavum.
χαμαιλεῦκη . . . . Tussilago Farfara.
χαμαιλέων . . . . Cardopatum corymbosum.
χαμόμηλα . . . . Matricaria Chamomilla.
χαριτζιὰ . . . . . Campanula versicolor.
χειροβοτάνι . . . . Helminthia echioides et Picris hieracioides.
χελιδόνιον . . . . Chelidonium majus.
χελιδρόνια . . . . Clematis Flammula.
χελωνόχορτον . . . Ætheorhiza bulbosa.
χιονίστρα . . . . Fumaria officinalis.
χλώμος . . . . . Salvia ringens.
χολαβρόχορτον . . . Armeria maritima.
χρυσόξυλον . . . . Rhus Cotinus.
χρυσοφύλλον . . . Parmelia parietina.
χρυσόχορτον . . . Gymnogramma Ceterach.

ψάθη . . . . . Typha latifolia.
ψυλλιστρα . . . . Inula viscosa et Alunia graveolens.
ψυλλόχορτον . . . Plantago Psyllium et Inula candida.
ψωμὶ τοῦ λαγοῦ . . . Picridium vulgare.
ψωρόχορτον . . . . Scabiosa Columbaria.

INDEX

NOMINUM TURCICORUM,

CUM SYNONYMIS BOTANICIS.

Alak ingivi . . . Iris Pseudacorus.
Bambal Otu . . . Heliotropium europæum.
Becabunga . . . . Veronica Beccabunga.
Ben tochunni . . . Hyoscyamus albus.
Biberic . . . . . Rosmarinus officinalis.
Cara bach . . . . Lavandula Stœchas.
Casch Casch . . . Papaver somniferum.
Chogia Jemischì . . Arbutus Unedo.
Cojún otí . . . . Agrimonia Eupatoria.
Demìo Dikièni . . Tribulus terrestris.
Disu Budak . . . Ornus europæa.
Domus Togani . . Cyclamen europæum.
Ergavan . . . . Cercis Siliquastrum.
Filis cun . . . . Mentha Pulegium.
Funda . . . . . Calluna vulgaris.
Giuda . . . . . Teucrium Polium.
Jaban Sedef . . . Ruta graveolens.
Jaban Zeitan Agagí . Olea europæa.
Il Ghin . . . . . Tamarix gallica.
Ladan otu . . . . Cistus villosus.
Lilák . . . . . Ligustrum vulgare.
Pere oti . . . . . Polygonum Persicaria.
Pufer ciceghi . . . Nuphar lutea.
Sarí Jassemín . . . Jasminum fruticans.
Sater . . . . . Origanum heracleoticum.
Sú Biberi . . . . Polygonum Hydropiper.
Sumach . . . . . Rhus coriaria.
Supha . . . . . Micromeria græca.
Susen . . . . . Iris germanica.
Tauschian Kulaghe . Primula veris.
Topana . . . . . Bunium ferulaceum.
Ya pu can . . . . Parietaria officinalis.
Zopleme . . . . Helleborus officinalis.

INDEX

NOMINUM SYSTEMATICORUM ET SYNONYMORUM.

Absinthium arborescens, Tourn. vol. ix. 43.
Acanthophyton spinosum, Lessing. vol. ix. 16.
Acanthus aculeatus, Bauh. vol. vii. 10.
mollis, *L.* vol. vii. 9.
sativus, Dod. vol. vii. 9.
spinosus, *L.* vol. vii. 10.
sylvestris, Dod. vol. vii. 10.
verus, Trag. vol. vii. 9.
Acarna cancellata, *L.* vol. ix. 29.
gummifera, *Willd.* vol. ix. 28.
Acer Asphendannos, Bellon. vol. iv. 53.
creticum, Tourn. vol. iv. 53.
obtusifolium, vol. iv. 53.
Achillea ægyptiaca, *L.* vol. ix. 71.
clypeolata, vol. ix. 71.
flabelliformis, *Lindl.* vol. ix. 72.
holosericea, vol. ix. 72.
ligustica, *Allion.* vol. ix. 74.
magna, *L.* vol. ix. 73.
micrantha, Bieb. vol. ix. 72.
pubescens, *L.* vol. ix. 72.
Santolina, *L.* vol. ix. 70.
sylvatica, Tenore vol. ix. 73.
Tournefortii, De Cand. vol. ix. 71.
Achyranthes argentea, *Lamarck.* vol. iii. 38.
aspera α. sicula, L. vol. iii. 38.
Acrostichum lanuginosum, Desf. vol. x. 55.
Marantæ, *L.* vol. x. 54.
velleum, *Hort. Kew.* vol. x. 55.
Adenocarpus intermedius, DeCand. vol. viii. 4.
Ægilops comosa, vol. i. 75.
cylindrica, vol. i. 75.
cylindrica, Waldst. vol. i. 75.
incurvata, L. vol. i. 72.
ovata, *L.* vol. i. 74.
Ætheorhiza bulbosa, Cassini. vol. viii. 73.
Agrimonia Agrimonoides, *L.* vol. v. 45.
Agrostemma Cœli rosa, *L.* vol. v. 40.
coronaria, *L.* vol. v. 39.
Agrostis arundinacea, Scop. vol. i. 52.
australis, Linn. Mant. vol. i. 49.
bromoides, Linn. Mant. vol. i. 69.
græca, Sib. vol. i. 50.
miliacea, L. vol. i. 50.
panicea, Soland. vol. i. 46.
rubra, Huds. vol. i. 49.
triaristata, Knapp. vol. i. 46.
ventricosa, Gouan. vol. i. 49.
Aizoon peregrinum, Camer. vol. v. 34.
Ajuga chia, *Schreb.* vol. vi. 21.
Iva, *Schreb.* vol. vi. 22.
salicifolia, *Schreb.* vol. vi. 22.
Alcea ficifolia, *L.* vol. vii. 58.
Alcea rosea, *L.* vol. vii. 57.
Alhagi mannifera, Desv. vol. viii. 15.
Maurorum, Tourn. vol. viii. 15.
Allium album, Bivon. vol. iv. 21.
ambiguum, vol. iv. 23.
Ampeloprasum, *L.* vol. iv. 11.
carneum, Santi. vol. iv. 23.
Cepa, *L.* vol. iv. 22.
descendens, *L.* vol. iv. 15.
junceum, vol. iv. 19.
lacteum, vol. iv. 21.
magicum, Bot. Mag. vol. iv. 20.
margaritaceum, vol. iv. 14.
monspessulanum, Gouan. vol. iv. 20.
montanum, vol. iv. 17.
multibulbosum, Jacq. vol. iv. 20.
nigrum, *L.* vol. iv. 20.
pallens, *L.* vol. iv. 16.
paniculatum, *L.* vol. iv. 16.
pilosum, vol. iv. 18.
roseum, *L.* vol. iv. 13.
roseum β, Bivon. vol. iv. 23.
staticiforme, vol. iv. 18.
subhirsutum, *L.* vol. iv. 13.
triquctrum, *L.* vol. iv. 21.
Aloe vulgaris, *L.* vol. iv. 34.
perfoliata π, vera, L. vol. iv. 35.
Alopecurus angustifolius, vol. i. 48.
aristatus, Huds. vol. i. 46.
utriculatus, vol. i. 47.
ventricosus, Huds. vol. i. 49.
Alsine mucronata, *L.* vol. iii. 87.
Althæa ficifolia, Cavan. vol. vii. 58.
rosea, Cavan. vol. vii. 57.
Alyssum alpestre, *L.* vol. vii. 21.
campestre, *L.* vol. vii. 20.
deltoideum, *L.* vol. vii. 26.
halimifolium, *L.* vol. vii. 19.
lunarioides, Willd. vol. vii. 22.
maritimum, Prodr. vol. vii. 19.
minimum, L. vol. vii. 19.
obliquum, Prodr. vol. vii. 24.
orientale, *Ard.* vol. vii. 21.
utriculatum, L. vol. vii. 25.
Amaryllis citrina, vol. iv. 11.
lutea, *L.* vol. iv. 9.
Ammi majus, *L.* vol. iii. 66.
vulgare, Dod. vol. iii. 66.
Amygdalus incana, *Pallas.* vol. v. 61.
Anagyris fœtida, *L.* vol. iv. 59.
Anchusa angustifolia, *L.* vol. ii. 55.
cæspitosa, *Lamarck.* vol. ii. 59.
italica, Retz. vol. ii. 53.
monspeliaca, Bauh. vol. ii. 56.
Anchusa officinalis, L. vol. ii. 55.
orientalis, L. vol. ii. 51.
paniculata, *Aiton.* vol. ii. 53.
parva, Lob. vol. ii. 56.
parviflora, *Willd.* vol. ii. 57.
tinctoria, *Desf.* vol. ii. 56.
undulata, *L.* vol. ii. 56.
ventricosa, vol. ii. 51.
Andrachne telephioides, *L.* vol. x. 43.
Andropogon distachyos, *L.* vol. i. 53.
Gryllus, *L.* vol. i. 51.
halepensis, vol. i. 52.
Ravennæ, L. vol. i. 38.
Andryala dentata, vol. ix. 7.
Anemone coronaria, *L.* vol. vi. 11.
Hepatica, *L.* vol. vi. 10.
hortensis, *L.* vol. vi. 12.
stellata, DeCand. vol. vi. 12.
Anthemis ageratifolia, vol. ix. 68.
altissima, vol. ix. 63.
anglica, Spreng. vol. ix. 64.
australis, *Willd.* vol. ix. 67.
austriaca, Jacq. vol. ix. 63.
Chia, *L.* vol. ix. 65.
coarctata, vol. ix. 68.
Cota, *L.* vol. ix. 62.
discoidea, vol. ix. 69.
macrantha, Heuffel. vol. ix. 63.
maritima, *Smith.* vol. ix. 64.
monantha, Willd. vol. ix. 68.
peregrina, *L.* vol. ix. 64.
pontica, *Willd.* vol. ix. 66.
rosea, *DeCand.* vol. ix. 67.
secundiramea, Biv. vol. 67.
tinctoria, L. vol. ix. 68.
tinctoria γ, discoidea, Vahl. vol. ix. 69.
tomentosa, Willd. vol. ix. 64.
Anthericum græcum, *L.* vol. iv. 30.
Anthyllis Barba Jovis, *L.* vol. vii. 75.
cretica, Willd. vol. viii. 29.
Hermanniæ, *L.* vol. vii. 76.
tetraphylla, *L.* vol. vii. 75.
Antirrhinum albifrons, vol. vi. 71.
arvense *β*, *Willd.* vol. vi. 72.
arvense *γ*, *L.* vol. vi. 72.
chalepense, *L.* vol. vi. 73.
genistifolium, *L.* vol. vi. 76.
micranthum, *Cavan.* vol. vi. 70.
pelisserianum, *L.* vol. vi. 73.
purpureum, *L.* vol. vi. 71.
reflexum, *L.* vol. vi. 74.
strictum, vol. vi. 75.
supinum, *L.* vol. vi. 75.

Apargia tuberosa, *Willd.* vol. viii. 72.
Arabis purpurea, *Sibth.* vol. vii. 40.
thyrsoidea, vol. vii. 39.
verna, *Br.* vol. vii. 38.
Arbutus Andrachne, *L.* vol. iv. 67.
Unedo, *L.* vol. iv. 66.
Arenaria ciliata, *L.* vol. v. 27.
fasciculata, *L.* vol. v. 30.
filiformis, Labill. vol. v. 28.
multicaulis, L. vol. v. 27.
norvegica, Gunn. vol. v. 27.
oxypetala, vol. v. 26.
picta, vol. v. 28.
thymifolia, vol. v. 29.
umbellata, *Soland.* vol. v. 28.
Arisarum vulgare, Schott. et Endlich. vol. x. 38.
Aristolochia hirta, *L.* vol. x. 28.
pallida, *Willd.* vol. x. 27.
parvifolia, vol. x. 27.
rotunda β, L. vol. x. 27.
sempervirens, *L.* vol. x. 26.
Armeria prolifera, Lob. vol. iv. 84.
Arnopogon asper, *Willd.* vol. viii. 60.
capensis, Willd. vol. viii. 59.
Dalechampii, *Willd.* vol. viii. 59.
picroides, *Willd.* vol. viii. 59.
Artedia squamata, *L.* vol. iii. 62.
Artemisia arborescens, *L.* vol. ix. 43.
Arum Arisarum, *L.* vol. x. 38.
Dioscoridis, *Lindl.* vol. x. 37.
Dracunculus, *L.* vol. x. 37.
Asarum Hypocistis, L. vol. x. 29.
Asparagus acutifolius, *L.* vol. iv. 31.
aphyllus, *L.* vol. iv. 32.
horridus, *L.* vol. iv. 33.
horridus, Redout. vol. iv. 32.
petræus, Ger. vol. iv. 31.
sylvestris, Camer. vol. iv. 31.
Asperugo procumbens, *L.* vol. ii. 65.
Asperula calabrica, L. vol. ii. 33.
incana, vol. ii. 16.
littoralis, vol. ii. 18.
longifolia, vol. ii. 15.
lutea, vol. ii. 17.
nitida, vol. ii. 19.
rigida, vol. ii. 17.
rivalis, vol. ii. 15.
suberosa, vol. ii. 18.
Asphodelus fistulosus, *L.* vol. iv. 29.
ramosus, *L.* vol. iv. 28.
Asplenium ramosum, Tourn. vol. x. 54.
Asteriscus aquaticus, DeCand. vol. ix. 76.
Aster Bubonium, Scop. vol. ix. 58.
Helenium, Scop. vol. ix. 57.
officinalis, Allion. vol. ix. 57.
Astragalus angustifolius, vol. viii. 25.
aristatus, *Willd.* vol. viii. 25.
bœticus, *L.* vol. viii. 22.
contortuplicatus, *L.* vol. viii. 21.
creticus, *Lamarck.* vol. viii. 26.
depressus, *L.* vol. viii. 24.
epiglottis, *L.* vol. viii. 23.
hamosus, *L.* vol. viii. 21.
incanus, *L.* vol. viii. 23.
massiliensis, Lamarck. vol. viii. 25.
sempervirens, Lamarck. vol. viii. 25.
Astrolobium scorpioides, DeCand. vol. viii. 11.
Athamanta multiflora, vol. iii. 69.
verticillata, vol. iii. 68.
Athanasia maritima, L. vol. ix. 37.
Atractylis cancellata, L. vol. ix. 29.
gummifera, L. vol. ix. 28.
Atriplex Halimus, *L.* vol. x. 52.
græca, *Willd.* vol. x. 53.
Atropa Mandragora, *L.* vol. iii. 26.
Aubrietia purpurea, DeCand. vol. vii. 40.
deltoidea, *DeCand.* vol. vii. 26.
Avena caryophyllea, vol. i. 71. vol. ii. 3.
fragilis, *L.* vol. i. 70.

Bartsia latifolia vol. vi. 69.
Trixago, *L.* vol. vi. 68.
Bellis annua, vol. ix. 59.
dentata, DeCand. vol. ix. 59.
Bellium bellidioides, Desf. vol. ix. 59.
dentatum, Vivian. vol. ix. 59.
Berberis cretica, *L.* vol. iv. 35.
Berteroa obliqua, *DeCand.* vol. vii. 24.
Beta maritima, *L.* v. iii. 49.
Biscutella apula, Prodr. vol. vii. 27.
Columnæ, *DeCand.* vol. vii. 27.
Biserrula Pelecinus, *L.* vol. viii. 27.
Borago cretica, *Willd.* vol. ii. 64.
orientalis, *L.* vol. ii. 63.
Borkhausia rubra β, Tenore. vol. ix. 1.
Brassica arvensis, *L.* vol. vii. 41.
cretica, *Lamarck.* vol. vii. 42.
Eruca, *L.* vol. vii. 43.
fruticulosa, *Cyrill.* vol. vii. 44.
vesicaria, Sib. vol. vii. 43.
Briza elatior, vol. i. 59. vol. ii. 3.
Eragrostis, L. vol. i. 57.
maxima, *L.* vol. i. 60.
minor, *L.* vol. i. 58.
spicata, vol. i. 60.
Bromus Plukenetii, Allion. vol. i. 66.
ramosus, *L.* vol. i. 66.
rubens, *L.* vol. i. 66.
tectorum, *L.* vol. i. 65.
Brotera corymbosa, Willd. vol. ix. 32.
Bryonia cretica, *L.* vol. x. 31.
Bunias cochlearioides, Murr. vol. vii. 17.
myagroides, L. vol. vii. 45.
raphanifolia, vol. vii. 11.
tenuifolia, vol. vii. 12.
virgata, vol. vii. 12.
Bunium pumilum, vol. iii. 67.
Buphthalmum aquaticum, *L.* vol. ix. 76.
asteroideum, Vivian. vol. ix. 75.
spinosum, *L.* vol. ix. 75.
Bupleurum fruticosum, *L.* vol. iii. 57.
Gerardi, *Murr.* vol. iii. 56.
nodiflorum, vol. iii. 54.
semicompositum, *L.* vol. iii. 55.
Sibthorpianum, vol. iii. 58.

Cacalia pinnata, Willd. vol. ix. 56.
verbascifolia, vol. ix. 35.
Cachrys cretica, Lamarck. vol. iii. 77.
sicula, *L.* vol. iii. 71.
Calcitrapa collina, Lamarck. vol. x. 10.
Galactites, Lamarck. vol. x. 13.
lanuginosa, Lamarck. vol. x. 4.
solstitialis, Lamarck. vol. x. 6.
Calendula arvensis, *L.* vol. x. 14.
Calepina Corvini, *Desv.* vol. vii. 17.
Caltha arvensis, Tourn. vol. x. 14.
Calycotome villosa, Link. vol. vii. 69.
Campanula anchusiflora, vol. iii. 9.
betonicifolia, vol. iii. 8.
capitata, Sims. vol. iii. 7.
Campanula cichoracea, vol. iii. 7.
dichotoma, *L.* vol. iii. 8.
drabifolia, vol. iii. 11.
Erinus, *L.* vol. iii. 10.
graminifolia, *L.* vol. iii. 5.
heterophylla, *L.* vol. iii. 6.
media, Dod. vol. iii. 4.
mollis, *β*. Willd. vol. iii. 8.
persicifolia, *L.* vol. iii. 4.
ramosissima, vol. iii. 3.
rupestris, vol. iii. 10.
spatulata, vol. iii. 2.
speculum, *L.* vol. iii. 12.
versicolor, *Andr.* vol. iii. 5.
Camphorosma Pteranthus, *L.* vol. ii. 43.
Capparis ovata, Desf. vol. v. 70.
rupestris, vol. v. 71.
spinosa, *L.* vol. v. 70.
spinosa, Bot. Mag. vol. v. 71.
Cardamine græca, *L.* vol. vii. 30.
Cardopatum corymbosum, Lessing. vol. ix. 32.
Carduncellus cœruleus, DeCand. vol. ix. 32.
Carduus afer, Jacq. vol. ix. 20.
Galactites, Tourn. vol. x. 13.
glycacanthus, vol. ix. 18.
gnaphaloides, Cyrill. vol. ix. 34.
stellatus, L. vol. ix. 21.
syriacus, L. vol. ix. 22.
Carex dubia, Sib. vol. i. 56.
Carlina corymbosa, *L.* vol. ix. 27.
gummifera, Lessing. vol. ix. 28.
lanata, *L.* vol. ix. 26.
umbellata, Tourn. vol. ix. 27.
Carthamus cœruleus, *L.* vol. ix. 32.
corymbosus, *L.* vol. ix. 32.
creticus, L. vol. ix. 31.
dentatus, *Vahl.* vol. ix. 30.
lanatus, *L.* vol. ix. 30.
leucocaulos, vol. ix. 31.
Caryophyllus sylvestris, Matth. vol. iv. 82.
Catananche græca, *L.* vol. viii. 65.
lutea, *L.* vol. ix. 15.
Celsia orientalis, *L.* vol. vii. 4.
Cenchrus capitatus, *L.* vol. i. 81.
racemosus, L. vol. ii. 1.
Centaurea acicularis, vol. x. 8.
ægyptiaca, *L.* vol. x. 5.
arachnoidea, Vivian. vol. x. 11.
benedicta, *L.* vol. x. 4.
cæspitosa, Vahl. vol. x. 3.
cicutæfolia, Horn. vol. v. 10.
collina, *L.* vol. x. 10.
Crupina, *L.* vol. ix. 77.
cuneifolia, vol. x. 1.
diffusa, Lamarck. vol. x. 9.
drabifolia, vol. x. 7.
eryngioides, *Lamarck.* vol. x. 9.
Galactites, *L.* vol. x. 13.
melitensis, *L.* vol. x. 6.
mucronata, Forsk. vol. x. 13.
napifolia, *L.* vol. x. 3.
pannosa, DeCand. vol. x. 11.
parviflora, vol. x. 9.
pumila, *L.* vol. x. 13.
ragusina, *L.* vol. x. 2.
raphanina, *DeCand.* vol. x. 12.
romana, L. vol. x. 3.
rupestris, *L.* vol. x. 11.
rutifolia, vol. x. 11.
solstitialis, *L.* vol. x. 6.
spinosa, *L.* vol. x. 2.

Centaurea sphærocephala, *L.* vol. x. 3.
Zanonii, Sebast. vol. x. 3.
Cepa alba, Ger. vol. iv. 22.
capitata, Matth. vol. iv. 22.
vulgaris, Bauh. vol. iv. 22.
Cephalanthera rubra, Richard. vol. x. 25.
Cerastium illyricum, Arduin. vol. v. 41.
pilosum, vol. v. 41.
tomentosum, *L.* vol. v. 42.
Cercis Siliquastrum, *L.* vol. iv. 60.
Cerinthe aspera, *Roth.* vol. ii. 60.
echioides, L. vol. ii. 61.
major β, L. vol. ii. 60.
retorta, vol. ii. 60.
Ceterach Marantæ, DeCand. vol. x. 54.
Chamæleon gummiferum, Cassin. vol. ix. 28.
discoideum, Allion. vol. ix. 69.
Cheilanthes odora, Swartz. vol. x. 56.
suaveolens, *Prodr.* vol. x. 56.
Cheiranthus coronopifolius, Prodr. vol. vii. 35.
lyratus, Prodr. vol. vii. 34.
Pumilio, Prodr. vol. vii. 36.
rupestris, Prodr. vol. vii. 32.
sinuatus, L. vol. vii. 37.
tricuspidatus, L. vol. vii. 36.
varius, Prodr. vol. vii. 34.
Chelidonium corniculatum, L. vol. v. 72.
hybridum, L. vol. v. 73.
Chenopodium Botrys, *L.* vol. iii. 48.
fruticosum, L. vol. iii. 50.
Chironia maritima, *Willd.* vol. iii. 31.
spicata, *Willd.* vol. iii. 32.
Chondrilla ramosissima, vol. viii. 70.
Chrysanthemum coronarium, *L.* vol. ix. 60.
Chrysocoma Linosyris, *L.* vol. ix. 36.
spicata, Forsk. vol. ix. 47.
Cicer arietinum, *L.* vol. viii. 3.
Cichorium pumilum, *Jacq.* vol. ix. 16.
spinosum, *L.* vol. ix. 16.
Cincinalis Marantæ, Desv. vol. x. 54.
Cineraria anomala, vol. ix. 56.
maritima, *L.* vol. ix. 55.
Cirsium afrum, Lessing. vol. ix. 20.
Lobelii, Tenore. vol. ix. 20.
stellatum, Duby. vol. ix. 21.
syriacum, Duby. vol. ix. 22.
Cistus arabicus, *L.* vol. vi. 2.
creticus, *L.* vol. v. 77.
ellipticus, *Desf.* vol. vi. 1.
guttatus, *L.* vol. v. 79.
hirtus, *L.* vol. vi. 1.
incanus, *L.* vol. v. 76.
monspeliensis, *L.* vol. v. 75.
parviflorus, *Lam.* vol. v. 78.
salicifolius, *L.* vol v. 80.
salvifolius, *L.* vol. v. 78.
serratus, Cav. vol. v. 79.
thymifolius, *L.* vol. v. 81.
Clematis cirrosa, *L.* vol. vi. 14.
Viticella, *L.* vol. vi. 13.
Cleome Dilleniana, DeCand. vol. vii. 46.
ornithopodioides, *L.* vol. vii. 46.
Clypeola maritima, L. vol. vii. 19.
tomentosa, L. vol. vii. 21.
Cnicus Acarna, *L.* vol. ix. 19.
afer, *Willd.* vol. ix. 20.
benedictus, Camer. vol. x. 4.
cynaroides, *Lam.* vol. ix. 20.
stellatus, *Willd.* vol. ix. 21.
syriacus, *Willd.* vol. ix. 22.
Cochlearia lyrata, Prodr. vol. vii. 17.
Cochleata incana, Rivin. vol. viii. 51.
Colchicum latifolium, *Ger.* vol. iv. 43.
luteum, Lob. vol. iv. 9.
variegatum, vol. iv. 43.
Colutea arborescens, *L.* vol. viii. 5.
hirsuta, Roth. vol. viii. 5.
vesicaria, Tourn. vol. viii. 5.
Consolida regalis, Brunf. vol. vi. 3.
regia, Trag. vol. vi. 3.
Convolvulus althæoides, *L.* vol. ii. 78.
althæoides, Bot. Mag. vol. ii. 79.
althæoides β, L. vol. ii. 79.
argenteus, Lamarck. vol. ii. 82.
Cneorum, *L.* vol. ii. 82.
Cneorum, Forsk. vol. iii. 1.
Dorycnium, *L.* vol. iii. 1.
evolvuloides, *Desf.* vol. ii. 81.
humilis, Jacq. vol. ii. 81.
lanatus, *Vahl.* vol. iii. 1.
lineatus, *L.* vol. ii. 81.
pentapetaloides, *L.* vol. ii. 80.
sagittifolius, vol. ii. 77.
Scammonia, *L.* vol. ii. 76.
sericeus, Forsk. vol. ii. 79.
siculus, *L.* vol. ii. 79.
spicæfolius, Lamarck, vol. ii. 81.
tenuissimus, vol. ii. 79.
Conyza candida, *L.* vol. ix. 49.
candida, Willd. vol. ix. 50.
gemmiflora, Tenore. vol. ix. 48.
limoniifolia, vol. ix. 50.
pumila, vol. ix. 49.
rupestris, Linn. Mant. vol. ix. 48.
saxatilis, *Lindl.* vol. ix. 48.
verbascifolia, Willd. vol. ix. 49.
Cordylocarpus lævigatus, vol. vii. 45.
Coriandrum sativum, *L.* vol. iii. 76.
Corispermum hyssopifolium, *L.* vol. i. 1.
Cornucopia cucullata, vol. i. 37.
Cornucopiæ cucullatum, L. vol. i. 37.
Cornus mascula, *L.* vol. ii. 41.
Coronilla cretica, L. vol. viii. 9.
Emerus, *L.* vol. viii. 8.
glauca, *L.* vol. viii. 8.
parviflora, *Lindl.* vol. viii. 9.
Securidaca, *L.* vol. viii. 9.
Corrigiola littoralis, *L.* vol. iii. 86.
Corvisartia Helenium, Mérat. vol. ix. 57.
Corydalis rutifolia, *DeCand.* vol. vii. 62.
Cotula abrotanifolia, Willd. vol. ix. 41.
aurea, vol. ix. 61.
complanata, vol. ix. 62.
Cotula ? complanata, DeCand. vol. ix. 62.
Cotyledon parviflora, vol. v. 33.
serrata, *L.* vol. v. 32.
stellata, Bauh. vol. v. 34.
Cratægus Aria, L. vol. v. 63.
Crepis aspera, *L.* vol. ix. 2.
cernua, Tenore. vol. ix. 3.
Dioscoridis, *L.* vol. ix. 5.
hyoseroides, vol. ix. 6.
incana, vol. ix. 1.
interrupta, vol. ix. 2.
multiflora, vol. ix. 4.
muricata, vol. ix. 4.
neglecta, *L.* vol. ix. 3.
radicata, vol. viii. 74.
rubra, *L.* vol. ix. 1.
stricta, Scop. vol. ix. 3.
Cressa cretica, *L.* vol. iii. 51.
indica, Retz. vol. iii. 51.
Crinitaria Linosyris, Lessing. vol. ix. 36.
Crithmum spinosum, Dod. vol. iii. 58.
Crocus aureus, vol. i. 25.
Croton villosum, *Prod.* vol. x. 41.
tinctorium, *L.* vol. x. 40.
Crozophora tinctoria, Adr. Juss. vol. x. 40.
Crucianella latifolia, *L.* vol. ii. 30.
monspeliaca, *L.* vol. ii. 31.
pubescens, Willd. vol. ii. 16.
Crupina vulgaris, Cassin. vol. ix. 77.
Cucubalus fabarius, L. vol. v. 11.
italicus, L. vol. v. 20.
polygonoides, Willd. vol. iv. 78.
Cuscuta monogyna, *Vahl.* vol. iii. 52.
Cyanus spinosus, vol. x. 2.
Cyclamen hederifolium, *L.* vol. ii. 71.
latifolium, vol. ii. 71.
repandum, vol. ii. 72.
Cynanchum acutum, *L.* vol. iii. 45.
monspeliacum, *L.* vol. iii. 41.
Cynara Cardunculus, L. vol. ix. 24.
horrida, *Ait.* vol. ix. 24.
humilis, vol. ix. 25.
spinosissima, Presl. vol. ix. 24.
Cynocrambe Dioscoridis, Tourn. vol. x. 32.
Cynosurus aureus, *L.* vol. i. 62.
echinatus, *L.* vol. i. 61.
Cyperus ægyptiacus, Gloxin. vol. i. 30.
comosus, vol. i. 31.
difformis, *L.* vol. i. 32.
distachyos, Allion. vol. i. 34.
flavescens, *L.* vol. i. 33.
fuscus, *L.* vol. i. 34.
junciformis, Cavan. vol. i. 34.
lateralis, Forsk. vol. i. 34.
ligularis, Rottb. vol. i. 32.
mucronatus, *Willd.* vol. i. 34.
radicosus, vol. i. 32.
Cytinus Hypocistis, *L.* vol. x. 29.
Cytisus complicatus, Brot. vol. viii. 4.
divaricatus, vol. viii. 4.
græcus, L. vol. vii. 76.
hirsutus, vol. viii. 5.
lanigerus, DeCand. vol. vii. 69.
sessilifolius, *L.* vol. viii. 4.

Dactylis littoralis, Willd. vol. i. 63.
pungens, Desf. vol. i. 64.
repens, Desf. vol. i. 63.
Daphne argentea, vol. iv. 48.
buxifolia, *Vahl.* vol. iv. 49.
collina, *Sm.* vol. iv. 51.
Gnidium, *L.* vol. iv. 49.
jasminea, vol. iv. 50.
sericea, Vahl. vol. iv. 51.
Tartonraira, *L.* vol. iv. 47.
Datisca cannabina, *L.* vol. x. 50.
Daucus bicolor, vol. iii. 64.
guttatus, vol. iii. 63.
involucratus, vol. iii. 65.
littoralis, vol. iii. 65.
Delphinium Consolida, *L.* vol. vi. 3.
halteratum, vol. vi. 5.
junceum, DeCand. vol. vi. 5.
pubescens, DeCand. vol. vi. 3.
peregrinum, *L.* vol. vi. 5.
Staphisagria, *L.* vol. vi. 6.
tenuissimum, *Sib.* vol. vi. 4.
Dianthus arboreus, *L.* vol. v. 4.
arboreus β, Sm. vol. v. 5.
biflorus, vol. iv. 83.
carthusianorum, *L.* vol. iv. 82.
cinnamomeus, vol. iv. 88.
corymbosus, vol. iv. 85.

Dianthus crinitus, *Sm.* vol. v. 1.
diffusus, vol. iv. 85.
fruticosus, *L.* vol. v. 5.
gracilis, vol. v. 3.
leucophæus, vol. v. 3.
pallens, vol. iv. 87.
prolifer, *L.* vol. iv. 84.
pubescens, vol. iv. 86.
serratifolius, vol. v. 2.
strictus, vol. v. 2.
tripunctatus, *Sibth.* vol. iv. 86.
Didesmus ægyptius, DeCand. vol. vii. 12.
tenuifolius, DeCand. vol. vii. 12.
Digitalis ferruginea, *L.* vol. vii. 5.
leucophæa, vol. vii. 6.
Diotis candidissima, Desf. vol. ix. 37.
Dorycnium hirsutum, DcCand. vol. viii. 43.
monspeliense, Willd. vol. viii. 43.
monspeliensium, Tourn. vol. viii. 43.
suffruticosum, Vill. vol. viii. 43.
Dracunculus polyphyllus, Tourn. vol. x. 37.
vulgaris, Schott et Endlich, vol. x.37.

Ebenus cretica, *L.* vol. viii. 29.
pinnata, vol. viii. 30.
Sibthorpii, DeCand. vol. viii. 30.
Ecbalium officinale, Nees et Eberm. vol. x. 30.
Echinaria capitata, Desf. vol. i. 81.
Echinophora spinosa, *L.* vol. iii. 58.
tenuifolia, *L.* vol. iii. 59.
Echinops græcus, Mill. vol. x. 19.
lanuginosus, vol. x. 18.
lanuginosus, vol. x. 19.
major, Tourn. vol. x. 17.
microcephalus, vol. x. 18.
Ritro, Willd. vol. x. 18.
sphærocephalus, *L.* vol. x. 17.
spinosus, *Linn. Mant.?* vol. x. 18.
spinosus, D'Urv. vol. x. 17.
tenuissimus, vol. x. 19.
viscosus, DeCand. vol. x. 17.
Echium creticum, *L.* vol. ii. 69.
diffusum, vol. ii. 69.
hispidum, *Sibth.* vol. ii. 68.
plantagineum, *Linn. Mant.* vol. ii. 67.
pustulatum, *Sibth.* vol. ii. 68.
Elæagnus angustifolia, *L.* vol. ii. 42.
Elaterium cordifolium, Mœnch. vol. x. 30.
Eleagnon Theophrasti, Lob. vol. vii. 8.
Elymus crinitus, *Schreb.* vol. i. 76.
Ephedra distachya, *L.* vol. x. 51.
fragilis, Desf. vol. x. 51.
Epimedium alpinum, *L.* vol. ii. 39.
Epipactis purpurea, Crantz, vol. x. 25.
rubra, *Willd.* vol. x. 25.
Eraclissa hexagyna, Forsk. vol. x. 43.
Erica arborea, *L.* vol. iv. 45.
manipuliflora, *Salisb.* vol. iv. 46.
olympica, Sibth. vol. iv. 47.
spiculifolia, *Salisb.* vol. iv. 47.
verticillata, Forsk. vol. iv. 46.
Erigeron alpinum, DeCand. vol. ix. 52.
graveolens, *L.* vol. ix. 51.
uniflorum, *L.* vol. ix. 52.
Ernodea montana, vol. ii. 33.
Erodium absinthioides, *Prodr.* vol. vii. 48.
alpinum, *Prodr.* vol. vii. 49.
chium, *Willd.* vol. vii. 52.
crassifolium β, salinarium, Sibth. vol. vii. 49.
chrysanthum, L'Herit. vol. vii. 48.
Erodium gruinum, *Willd.* vol. vii. 51.
laciniatum, vol. vii. 50.
malacoides, *Willd.* vol. vii. 53.
petræum, *Prodr.* vol. vii. 47.
romanum, *Willd.* vol. vii. 50.
supracanum, L'Herit. vol. vii. 47.
Erucaria aleppica, *Gærtn.* vol. vii. 45.
Eruca sativa, Dod. vol. vii. 43.
Erucula major, Cord. vol. vii. 43.
Ervum Ervilia, *L.* vol. viii. 2.
Ervilia sativa, Link. vol. viii. 2.
vera, Tourn. vol. viii. 2.
Eryngium cyaneum, vol. iii. 53.
multifidum, vol. iii. 54.
rupestre, *DeCand.* vol. vii. 32.
Euphorbia aleppica, *L.* vol. v. 49.
arguta, *Soland.* vol. v. 53.
canescens, L. vol. v. 48.
Chamæsyce, *L.* vol. v. 48.
deflexa, vol. v. 52.
dendroides, *L.* vol. v. 54.
divaricata, Jacq. vol. v. 54.
dulcis, *L.* vol. v. 50.
eubœensis, Sibth. vol. v. 52.
læta, Ait. vol. v. 54.
leiosperma, vol. v. 51.
myrsinites, *L.* vol. v. 55.
portlandica, L. vol. v. 51.
pumila, *Sibth.* vol. v. 47.
segetalis, *L.* vol. v. 52.
spinosa, *L.* vol. v. 49.
stricta, *L.* vol. v. 53.
Euphrasia latifolia, L. vol. vi. 69.
Evax exigua, DeCand. vol. x. 15.
umbellata, Gærtn. vol. x. 15.
pygmæa, Pers. vol. x. 15.

Farsetia deltoidea, Ait. vol. vii. 26.
lunarioides, Br. vol. vii. 22.
Ferula nodiflora, *L.* vol. iii. 72.
sibirica, Willd. vol. iii. 72.
thyrsiflora, vol. iii. 73.
Festuca dactyloides, vol. i. 64. vol. ii. 3.
littoralis, *L.* vol. i. 63.
phœnicoides, Linn. Mant. vol. i. 66.
Fibigia lunarioides, vol. vii. 22.
Filago acaulis, All. vol. x. 15.
exigua, vol. x. 15.
pygmæa, *L.* vol. x. 15.
Frankenia hirsuta, *L.* vol. iv. 36.
pulverulenta, *L.* vol. iv. 37.
Fraxinus Ornus, *L.* vol. i. 4.
Fritillaria pyrenaica, *L.* vol. iv. 24.
racemosa, Ker. vol. iv. 24.
Fumaria cypria, Sibth. vol. vii. 62.
densiflora, DeCand. vol. vii. 63.
parviflora, *Prodr.* vol. vii. 63.
rutifolia, Prodr. vol. vii. 62.

Galactites tomentosa, Mœnch. vol. x. 13.
Galega officinalis, *L.* vol. viii. 19.
Galium apiculatum, vol. ii. 22.
apricum, vol. ii. 20.
brevifolium, vol. ii. 26.
coronatum, vol. ii. 19.
floribundum, vol. ii. 25.
græcum, *Linn. Mant.* vol. ii. 27.
incanum, vol. ii. 22.
incurvum, vol. ii. 24.
junceum, vol. ii. 21.
murale, Allion. vol. ii. 13.
pyrenaicum, *L.* vol. ii. 23.
Galium suberosum, vol. ii. 21.
tricorne, Don. vol. ii. 24.
verrucosum, *Smith.* vol. ii. 24.
Garidella Nigellastrum, *L.* vol. v. 31.
Gatyona globulifera, Cass. vol. ix. 5.
Genista acanthoclada, DeCand. vol. vii. 69.
Lobelii, D'Urv. vol. vii. 69.
parviflora, DeCand. vol. vii. 68.
Gentiana maritima, Linn. Mant. vol. iii. 31.
spicata, L. vol. iii. 32.
Geranium asphodeloides, *Prodr.* vol. vii. 56.
chium, L. vol. vii. 52.
gruinum, L. vol. vii. 51.
laciniatum, Cavan. vol. vii. 50.
malacoides, L. vol. vii. 53.
radicatum, Bieb. vol. vii. 54.
romanum, L. vol. vii. 50.
rupestre, Cavan. vol. vii. 47.
striatum, *L.* vol. vii. 55.
subcaulescens, L'Herit. vol. vii. 56.
tuberosum, *L.* vol. vii. 54.
Geropogon hirsutus, *L.* vol. viii. 57.
Geum coccineum, vol. v. 69.
Gladiolus communis, *L.* vol. i. 27.
communis, *var.* vol. i. 28.
triphyllus, Sibth. vol. i. 28.
Glaucium corniculatum, vol. v. 72.
phœniceum, *Gærtn.* vol. v. 72.
rubrum, vol. v. 72.
violaceum, *Juss.* vol. v. 73.
Glinus lotoides, *L.* vol. v. 56.
Glycyrrhiza echinata, *L.* vol. viii. 6.
glabra, *L.* vol. viii. 7.
Gnaphalium ægyptiacum, Pers. vol. ix. 47.
arenarium, *L.* vol. ix. 45.
cauliflorum, Desf. vol. ix. 47.
Chrysocoma, Poir. vol. ix. 47.
italicum, Roth. vol. ix. 44.
maritimum, Tourn. vol. ix. 37.
orientale, *L.* vol. ix. 45.
pygmæum, Lamarck. vol. x. 15.
Ruppelii, Fresen. vol. ix. 47.
spicatum, Vahl. vol. ix. 47.
Stœchas, *L.* vol. ix. 44.
supracanum, vol. ix. 47.
virgineum, vol. ix. 46.
Gypsophila cretica, vol. iv. 76.
dianthoides, vol. iv. 76.
illyrica, vol. iv. 77.
muralis, *L.* vol. iv. 74.
ochroleuca, vol. iv. 77.
ocellata, vol. iv. 78.
rigida, *L.* vol. iv. 75.
thymifolia, vol. iv. 79.
Vaccaria, *L.* vol. iv. 73.

Halicacabum vulgare, Fuchs. vol. iii. 28.
Hedypnois cretica, *Willd.* vol. ix. 9.
rhagadioloides, *Willd.* vol. ix. 8.
tubæformis, *Tenore.* vol. ix. 8.
Hedysarum æquidentatum, vol. viii. 18.
Alhagi, *L.* vol. viii. 15.
Caput Galli, *L.* vol. viii. 17.
Crista Galli, *L.* vol. viii. 18.
spinosissimum, *L.* vol. viii. 16.
venosum, *Desf.* vol. viii. 16.
Helichrysum angustifolium, De Cand. vol. ix. 44.
arenarium, DeCand. vol. ix. 45.
elongatum, Mœnch. vol. ix. 45.
orientale, DeCand. vol. ix. 45.
virgineum, DeCand. vol. ix. 46.

Heliotropium supinum, *L.* vol. ii. 48.
Helleborine cordigera, Sebast. et Maur. vol. x. 24.
Lingua, Pers. vol. x. 23.
Helleborus officinalis, *Salisb.* vol. vi. 19.
orientalis, *Lamarck.* vol. vi. 19.
Heracleum absinthifolium, *Vent.* vol. iii. 74.
aureum, vol. iii. 75.
tomentosum, vol. iii. 74.
Herniaria macrocarpa, vol. iii. 47.
Hesperis rigida, Sibth. vol. vii. 33.
verna, L. vol. vii. 38.
Hibiscus Trionum, *L.* vol. vii. 61.
Hieracium bulbosum, *Willd.* vol. viii. 73.
fœtidum, *Willd.* vol. viii. 74.
Hippocrepis biflora, Spreng. vol. viii. 12.
multisiliquosa, *L.* vol. viii. 12.
unisiliquosa, *L.* vol. viii. 12.
Hippomarathrum creticum, Bauh. vol. iii. 71.
siculum, Bocc. vol. iii. 71.
Holcus halepensis, L. vol. i. 52.
Hordeum bulbosum, *L.* vol. i. 79.
crinitum, Desf. vol. i. 76.
strictum, Desf. vol. i. 79.
Hyacinthus romanus, *L.* vol. iv. 33.
Hymenocarpus circinatus, Savi. vol. viii. 50.
Hymenomena Tournefortii, Cass. vol. viii. 65.
Hyoseris cretica, L. vol. ix. 9.
cretica, Cavan. vol. ix. 8.
rhagadioloides, L. vol. ix. 8.
Hyoscyamus albus, *L.* vol. iii. 24.
aureus, *L.* vol. iii. 25.
Hypecoum imberbe, vol. ii. 47.
procumbens, *L.* vol. ii. 46.
Hypericum calycinum, *L.* vol. viii. 52.
coris, *L.* vol. viii. 56.
crispum, *L.* vol. viii. 55.
empetrifolium, *Willd.* vol. viii. 54.
hircinum, *L.* vol. viii. 53.
olympicum, *L.* vol. viii. 53.
repens, *L.* vol. viii. 54.
Hypochœris arachnoides, Bivon. vol. ix. 11.
minima, vol. ix. 11.

Iberis cardamantica, Ger. vol. vii. 16.
sempervirens, *L.* vol. vii. 18.
Ifloga Fontanesii, Cassin. vol. ix. 47.
Illecebrum capitatum, *L.* vol. iii. 41.
cymosum, vol. iii. 39.
echinatum, vol. iii. 39.
Paronychia, *L.* vol. iii. 40.
Inula Bubonium, Jacq. vol. ix. 58.
candida α, verbascifolia, DeCand. vol. ix. 49.
candida β, limoniifolia, DeCand. vol. ix. 50.
dentata, vol. ix. 57.
graveolens, Desf. vol. ix. 51.
Helenium, *L.* vol. ix. 57.
pulicaria, *β*. L. vol. ix. 57.
spiræifolia, L. vol. ix. 58.
squarrosa, vol. ix. 58.
uliginosa, Stev. vol. ix. 57.
Iris florentina, *L.* vol. i. 28.
germanica, *L.* vol. i. 29.
Sisyrinchium, *L.* vol. i. 30.
tuberosa, *L.* vol. i. 29.
Isatis aleppica, Seop. vol. vii. 13.
lusitanica, *L.* vol. vii. 13.
Ixia Bulbocodium, *L.* vol. i. 26.

Jacobæa maritima, Tourn. vol. ix. 55.
Jacobæa Othonnæ, Meyer. vol. ix. 56.

Kentrophyllum lanatum, DeCand. vol. ix. 30.
leucocaulon, Lessing. vol. ix. 31.
Knautia palæstina, Linn. Mant. vol. ii. 9.
plumosa, Linn. Mant. vol. ii. 11.
Koelpinia linearis, Pall. vol. ix. 13.
Koniga maritima, *R. Br.* vol. vii. 19.
Krokeria oligoceratos, Mœnch. vol. viii. 41.

Lactuca leucophæa, vol. viii. 69.
Ladanum creticum, vol. v. 77.
Lagoecia cuminoides, *L.* vol. iii. 37.
Lagurus cylindricus, L. vol. i. 40.
ovatus, *L.* vol. i. 71.
Lamium hirsutum, *Lamarck.* vol. vi. 45.
maculatum, *L.* vol. vi. 46.
pubescens, Sibth. vol. vi. 45.
rugosum, *Ait.* vol. vi. 45.
striatum, *Sibth.* vol. vi. 46.
Lappago racemosa, *Willd.* vol. ii. 1.
Lapsana Koelpinia, *L.* vol. ix. 13.
Rhagadiolus, *L.* vol. ix. 12.
stellata, *L.* vol. ix. 12.
Zacintha, L. vol. ix. 14.
Laserpitium Chironium, L. vol. iii. 81.
Lathyrus alatus, vol. vii. 85.
amphicarpos, *L.* vol. vii. 82.
angulatus, *L.* vol. vii. 84.
Cicera, *L.* vol. vii. 83.
grandiflorus, vol. vii. 85.
Ochrus, DeCand. vol. vii. 80.
purpureus, Desf. vol. vii. 85.
sativus, *L.* vol. vii. 84.
Laurus nobilis, *L.* vol. iv. 57.
vulgaris, Bauh. vol. iv. 57.
Lavandula Stœchas, *L.* vol. vi. 40.
Lavatera arborea, *L.* vol. vii. 60.
Lentiscus vulgaris, Tourn. vol. x. 47.
Leontodon bulbosum, L. vol. viii. 73.
serotinum, vol. viii. 71.
tuberosum, L. vol. viii. 72.
Lepidium cornutum, Prodr. vol. vii. 15.
graminifolium, *L.* vol. vii. 15.
Iberis, DeCand. vol. vii. 15.
sativum, *L.* vol. vii. 14.
spinosum, *L.* vol. vii. 15.
Limeum humile, Forsk. vol. x. 43.
Limonium elegans, Rauw. vol. iv. 1.
syriacum, Besl. vol. iv. 1.
Linaria chalepensis, Brown. vol. vi. 73.
cærulea, Dalech. vol. vi. 71.
genistifolia, Brown. vol. vi. 76.
pelisseriana, Brown. vol. vi. 73.
purpurea, Brown. vol. vi. 71.
supina, Brown. vol. vi. 75.
Linosyris vulgaris, DeCand. vol. ix. 36.
Linum arboreum, *L.* vol. iv. 4.
cæspitosum, vol. iv. 5.
gallicum, *L.* vol. iv. 3.
hirsutum, *L.* vol. iv. 2.
nodiflorum, *L.* vol. iv. 5.
strictum, *L.* vol. iv. 3.
Liquiritia officinalis, Mœnch. vol. viii. 7.
Lithospermum apulum, *Vahl.* vol. ii. 49.
fruticosum, *L.* vol. ii. 52.
hispidulum, vol. ii. 53.
orientale, *L.* vol. ii. 51.
tenuiflorum, *L.* vol. ii. 50.
tinctorium, Andr. vol. ii. 56.
Lobelia Laurentia β, Willd. vol. iii. 16.
sctacea, vol. iii. 16.

Lonicera Xylosteum, *L.* vol. iii. 18.
Lotus creticus, *L.* vol. viii. 42.
diffusus, vol. viii. 41.
Dorycnium, *L.* vol. viii. 43.
edulis, *L.* vol. viii. 41.
hirsutus, *L.* vol. viii. 43.
ornithopodioides, L. vol. viii. 41.
tetragonolobus, *L.* vol. viii. 40.
Lunaria Tournefortii, *Sibth.* vol. vii. 22.
Lupinus angustifolius, *L.* vol. vii. 78.
luteus, *L.* vol. vii. 78.
pilosus, *L.* vol. vii. 77.
Louichea cervina, L'Herit. vol. ii. 43.
Pteranthus, L'Herit. vol. ii. 43.
Lychnis coronaria, Dod. vol. v. 39.
Lycium europæum, *L.* vol. iii. 30.
Lycopsis echioides β, Hb. Linn. vol. ii. 58.
variegatus, *L.* vol. ii. 66.
exaltatus, *L.* vol. i. 9.
Lyonnetia abrotanifolia, Lessing. vol. ix. 41.
rigida, DeCand. vol. ix. 40.
Lysimachia anagalloides, vol. ii. 74.
atro-purpurea, *L.* vol. ii. 72.
atro-purpurea, Murray. vol. ii. 73.
dubia, *Ait.* vol. ii. 73.
Linum-stellatum, *L.* vol. ii. 74.

Malcomia flexuosa, vol. vii. 33.
lyrata, *DeCand.* vol. vii. 33.
Malva althæoides, *Cavan.* vol. vii. 59.
Manna Hebraïca, Don. vol. viii. 15.
Marrubium Pseudodictamnus, *L.* vol. vi. 50.
velutinum, *Sibth.* vol. vi. 49.
Matricaria coronaria, Desrouss. vol. ix. 60.
Matthiola coronopifolia, *DeCand.* vol. vii. 35.
Pumilio, *DeCand.* vol. vii. 36.
sinuata, *Br.* vol. vii. 37.
tricuspidata, *Br.* vol. vii. 36.
varia, *DeCand.* vol. vii. 34.
Medica marina, Tourn. vol. viii. 51.
scutellata, Tourn. vol. viii. 50.
Medicago arborea, *L.* vol. viii. 49.
circinata, *L.* vol. viii. 49.
marina, *L.* vol. viii. 51.
polymorpha β, scutellata, L. vol. viii. 50.
scutellata, *Willd.* vol. viii. 50.
Melanthium damascenum, Ger. vol. vi. 7.
sativum, Matth. vol. vi. 8.
Melica aspera, Desf. vol. i. 55.
ciliata, *L.* vol. i. 54.
saxatilis, vol. i. 55.
Melilotus hamosa, Bieb. vol. viii. 46.
italica, Fuchs. vol. viii. 44.
longifolia, Tenore. vol. viii. 32.
major, Trag. vol. viii. 44.
messanensis, Desf. vol. viii. 31.
sulcata, Desf. vol. viii. 32.
unciuata, Bess. vol. viii. 46.
Melissa altissima, *Sibth.* vol. vi. 63.
Mesembryanthemum crystallinum, *L.* vol. v. 65.
nodiflorum, *L.* vol. v. 64.
Micropus exiguus, D'Urv. vol. x. 15.
pygmæus, Desf. vol. x. 15.
Milium arundinaceum, vol. i. 50.
lendigerum, *L.* vol. i. 49.
Mitina corymbosa, Cassin. vol. ix. 27.
lanata, Cassin. vol. ix. 26.
Mœhringia stricta, vol. iv. 54.
Molucca lævis, Dod. vol. vi. 53.
spinosa, Dod. vol. vi. 54.

Moluccella frutescens, *L.* vol. vi. 55.
lævis, *L.* vol. vi. 53.
spinosa, *L.* vol. vi. 54.
Momordica Elaterium, *L.* vol. x. 30.
Moricandia arvensis, DeCand. vol. vii. 41.
Morina persica, *L.* vol. i. 20.
Myagrum ægyptiacum, L. vol. vii. 12.
orientale, L. vol. vii. 11.
Myosotis apula, L. vol. ii. 49.
Myrtus communis, *L.* vol. v. 59.
communis a, L. vol. v. 59.
Myscolus microcephalus, Cassin. vol. ix. 18.

Narcissus Tazzetta, *L.* vol. iv. 7.
Nasturtium crispum, Bauh. vol. vii. 14.
hortense, Fuchs. vol. vii. 14.
vulgare, Bauh. vol. vii. 14.
Nauplius aquaticus, Cassin. vol. ix. 76.
Nemauchenes aculeata, Cass. vol. ix. 2.
Nepeta italica, *L.* vol. vi. 39.
nuda, *L.* vol. vi. 38.
violacea, *Villars.* vol. vi. 38.
Nerium Oleander, *L.* vol. iii. 42.
Nigella aristata, vol. vi. 8.
arvensis, *L.* vol. vi. 9.
damascena, *L.* vol. vi. 7.
hortensis, Trag. vol. vi. 7.
sativa, *L.* vol. vi. 8.
Nothochlæna lanuginosa, Desv. vol. x. 55.
Marantæ, R. Br. vol. x. 54.
vellea, Desv. vol. x. 55.
Notobasis syriaca, Cassin. vol. ix. 22.

Ochrus pallidus, Pers. vol. vii. 80.
Olea europæa, *L.* vol. i. 3.
Onobroma cæruleum, Gærtn. vol. ix. 32.
corymbosum, Tenore. vol. ix. 32.
Onobrychis æquidentata, DeCand. vol. viii. 18.
Caput Galli, DeCand. vol. viii. 17.
Crista Galli, DeCand. vol. viii. 18.
venosa, DeCand. vol. viii. 16.
Ononis antiquorum, *L.* vol. vii. 70.
arvensis, L. vol. vii. 70.
arvensis a et *γ,* Smith. vol. vii. 70.
breviflora, DeCand. vol. vii. 73.
Cherleri, *Prodr.* vol. vii. 72.
Cherleri, Hb. Linn. vol. vii. 71.
Columnæ, *Allion.* vol. vii. 71.
crispa, *L.* vol. vii. 74.
minutissima, Jacq. vol. vii. 71.
ornithopodioides, *L.* vol. vii. 73.
parviflora, Lamarck. vol. vii. 71.
procurrens, Wallr. vol. vii. 70.
repens, L. vol. vii. 70.
spinosa, L. vol. vii. 70.
subocculta, Villars. vol. vii. 71.
viscosa, *L.* vol. vii. 73.
viscosa β, L. vol. vii. 73.
Onopordum elatum, vol. ix. 23.
macracanthum, *Schousb.* vol. ix. 23.
virens, DeCand. vol. ix. 23.
Onosma echioides, *L.* vol. ii. 61.
echioides β, L. vol. ii. 61.
erecta, vol. ii. 62.
fruticosa, vol. ii. 63.
Ophrys fusca, *Link.* vol. x. 22.
grandiflora, Tenore. vol. x. 22.
lutea, Bivon. vol. x. 22.
tenthredinifera, *Willd.* vol. x. 22.
villosa, Desf. vol. x. 22.
Orchis expansa, Tenore. vol. x. 21.
papilionacea, vol. x. 21.
Orchis rubra, Jacq. vol. x. 21.
tephrosanthso, Desf. vol. x. 20.
tephrosanthso β, undulatifolia, Lindl. vol. x. 20.
undulatifolia, *Bivon.* vol. x. 20.
Origanum glandulosum, Desf. vol. vi. 57.
Maru, *L.* vol. vi. 59.
Onites, *L.* vol. vi. 58.
sipyleum, *L.* vol. vi. 57.
smyrnæum, *L.* vol. vi. 57.
Tournefortii, *Sibth.* vol. vi. 56.
Ornithogalum arvense, *Pers.* vol. iv. 27.
minimum, Redout. vol. iv. 27.
minimum, Fl. Dan.
nanum, vol. iv. 28.
spathaceum, *Hayne.* vol. iv. 26.
Ornithopus compressus, *L.* vol. viii. 10.
scorpioides, *L.* vol. viii. 11.
trifoliatus, Lamarck. vol. viii. 11.
Orobanche ramosa, *L.* vol. vii. 7.
Orobus hirsutus, *L.* vol. vii. 80.
laxiflorus, Desf. vol. vii. 80.
sessiliflorus, *DeCand.* vol. vii. 82.
vernus, *L.* vol. vii. 81.
Osyris alba, *L.* vol. x. 44.
Otanthus maritimus, Tenore. vol. ix. 37.
Oxalis corniculata, *L.* vol. v. 38.
lutea, Bauh. vol. v. 38.
pusilla, Salisb. vol. v. 38.
tuberosa, Dod. vol. iv. 42.

Paliurus aculeatus, Desf. vol. iii. 34.
australis, *Gærtn.* vol. iii. 34.
Pallenis spinosa, Cassin. vol. ix. 75.
Pancratium carolinianum, L. vol. iv. 8.
marinum, Lob. vol. iv. 8.
maritimum, *L.* vol. iv. 8.
verecundum, Ait. vol. iv. 8.
Panicum dactylon, *L.* vol. i. 45.
eruciforme, vol. i. 44.
repens, *L.* vol. i. 45.
Papaver album, Bauh. vol. v. 74.
hortense, Tourn. vol. v. 74.
olympicum, Sibth. vol. v. 75.
pilosum, vol. v. 75.
sativum, Matth. vol. v. 74.
somniferum, *L.* vol. v. 74.
sylvestre, Raii. vol. v. 74.
Parietaria cretica, *L.* vol. ii. 44.
Passerina hirsuta, *L.* vol. iv. 52.
Pastinaca Chironium, *Dalech.* vol. iii. 81.
Opopanax, *L.* vol. iii. 81.
Pavetta fœtidissima, Cyril. vol. ii. 33.
Pectinastrum napifolium, Cassin. vol. x. 3.
Peganum Harmala, *L.* vol. v. 43.
Pelecinus vulgaris, Tourn. vol. viii. 12.
Periploca græca, *L.* vol. iii. 44.
Peucedanum obtusifolium, vol. iii. 70.
Phaca bœtica, *L.* vol. viii. 20.
Phagnalon rupestre, DeCand. vol. ix. 48.
Tenorii, Presl. vol. ix. 48.
Phalaris aquatica, *L.* vol. i. 42.
bulbosa, Cavan. vol. i. 41.
canariensis, *L.* vol. i. 40.
nodosa, *L.* vol. i. 41.
paradoxa, *L.* vol. i. 43.
tuberosa, Linn. Mant. vol. i. 41.
utriculata, L. vol. i. 47.
Phillyrea latifolia, *L.* vol. i. 2.
Phleum crinitum, *Schreb.* vol. i. 46.
Gerardi, Sibth. vol. i. 48.
Phlomis fruticosa, *L.* vol. vi. 51.
Phlomis Herba-venti, *L.* vol. vi. 52.
samia, *L.* vol. vi. 52.
Physalis Alkekengi, *L.* vol. iii. 28.
somnifera, *L.* vol. iii. 27.
Phyteuma amplexicaule, vol. iii. 14.
ellipticum, vol. iii. 13.
limoniifolium, *L.* vol. iii. 14.
pinnatum, *L.* vol. iii. 15.
Picnomon Acarna, Cassin. vol. ix. 19.
Picridium tingitanum, Desf. vol. viii. 67.
vulgare, Desf. vol. viii. 67.
vulgare, Desf. vol. viii. 68.
Pinguicula crystallina, vol. i. 8.
Pinus halepensis, Ait. vol. x. 38.
maritima, *Lambert.* vol. x. 38.
Pistacia Lentiscus, *L.* vol. x. 47.
Terebinthus, *L.* vol. x. 46.
Pistolochia cretica, Bauh. vol. x. 26.
Pisum arvense, *L.* vol. vii. 79.
fulvum, vol. vii. 79.
Ochrus, *L.* vol. vii. 80.
Plantago albicans, *L.* vol. ii. 35.
Bellardi, *Allion.* vol. ii. 36.
cretica, *L.* vol. ii. 37.
Lagopus, *L.* vol. ii. 34.
maritima, *L.* vol. ii. 37.
Psyllium, *L.* vol. ii. 38.
Platanus orientalis, *L.* vol. x. 36.
Plumbago europæa, *L.* vol. ii. 75.
Poa Eragrostis, *L.* vol. i. 57.
littoralis, Gouan. vol. i. 63.
maritima, Cavan. vol. i. 63.
Podospermum laciniatum, DeCand. vol. viii. 64.
Polycarpon tetraphyllum, *L.* vol. ii. 4.
Polygala glumacea, vol. vii. 66.
monspeliaca, L. vol. vii. 66.
venulosa, vol. vii. 65.
Polygonum equisetiforme, vol. iv. 56.
maritimum, *L.* vol. iv. 55.
montanum, Ger. vol. iii. 40.
Polypogon monspeliense, Desf. vol. i. 46.
Portulaca oleracea, *L.* vol. v. 44.
Potentilla specciosa, *Willd.* vol. v. 68.
Poterium spinosum, *L.* vol. x. 34.
villosum, vol. x. 33.
Prasium majus, *L.* vol. vi. 67.
Prenanthes bulbosa, DeCand. vol. viii. 73.
Primula vulgaris *β,* rubra, vol. ii. 70.
Prunus prostrata, *Lab.* vol. v. 62.
Psoralea bituminosa, *L.* vol. viii. 28.
Pteris acrosticha, Balbis. vol. x. 56.
Pteronia Chamæpeuce, Tenore. vol. ix. 34.
Ptilostemon Chamæpeuce, Cass. vol. ix. 34.
Punica Granatum, *L.* vol. v. 60.
sylvestris, Tourn. vol. v. 60.
Pyrus Aria, *Sm.* vol. v. 63.

Quercus coccifera, *L.* vol. x. 35.

Ranunculus asiaticus, *L.* vol. vi. 15.
chærophyllos γ, DeCand. vol. vi. 16.
flabellatus, *Desf.* vol. vi. 16.
lanuginosus, *L.* vol. vi. 16.
millefoliatus, *Vahl.* vol. vi. 17.
muricatus, *L.* vol. vi. 18.
Rapistrum orientale, DeCand. vol. vii. 11.
Reseda alba, *L.* vol. v. 46.
candida, Dalech. vol. v. 46.
maxima, Bauh. vol. v. 46.
Plinii, Besl. vol. v. 46.

Rhagadiolus edulis, Willd. vol. ix. 12.
intermedius, Tenore. vol. ix. 12.
stellatus, Willd. vol. ix. 12.
Rhamnus Paliurus, L. vol. iii. 34.
pubescens, vol. iii. 33.
Ziziphus, L. vol. iii. 35.
Rhinanthus Trixago, L. vol. vi. 68.
Rhus Coriaria, *L.* vol. iii. 84.
Ricinus communis, *L.* vol. x. 42.
vulgaris, Tourn. vol. x. 42.
Ricotia tenuifolia, *DeCand.* vol. vii. 28.
Rœmeria hybrida, DeCand. vol. v. 73.
Rosa glutinosa, vol. v. 66.
sempervirens, *L.* vol. v. 67.
Rosmarinus officinalis, *L.* vol. i. 11.
Rotbollia digitata, vol. i. 73.
incurvata, *L.* vol. i. 71.
Rubia lucida, *L.* vol. ii. 32.
tinctorum, *L.* vol. ii. 31.
Rumex Acetosella, L. vol. iv. 42.
bucephalophorus, *L.* vol. iv. 39.
multifidus, *L.* vol. iv. 42.
roseus, *L.* vol. iv. 40.
spinosus, *L.* vol. iv. 41.
tuberosus, *L.* vol. iv. 42.
Ruscus Hypoglossum, *L.* vol. x. 45.
Ruta chalepensis, *L.* vol. iv. 61.
linifolia, Prodr. vol. iv. 63.
linifolia β, L. vol. iv. 63.
patavina, *L.* vol. iv. 62.
spatulata, vol. iv. 63.

Saccharum cylindricum, *Lam.* vol. i. 40.
Ravennæ, *L.* vol. i. 38.
Teneriffæ, *L.* vol. i. 39.
Salsola fruticosa, *L.* vol. iii. 50.
Salvia argentea, *L.* vol. i. 20.
bifida, Forsk. vol. i. 16.
calycina, vol. i. 13.
candidissima, Vahl. vol. i. 19.
clandestina, *L.* vol. i. 18.
crassifolia, vol. i. 19.
Forskaelei, *L.* vol. i. 16.
Horminum, *L.* vol. i. 15.
multifida, vol. i. 17.
pomifera, *L.* vol. i. 12.
ringens, vol. i. 14.
Sclarea, *L.* vol. i. 18.
Sibthorpii, vol. i. 17.
triloba, *L.* vol. i. 13.
viridis, *L.* vol. i. 15.
Sanicula alpina, Camer. vol. iv. 71.
guttata, Ger. vol. iv. 71.
Santolina alpina, vol. ix. 39.
anthemoides. *L.* vol. ix. 41.
maritima, *L.* vol. ix. 37.
montana, vol. ix. 39.
rigida, vol. ix. 40.
Saponaria cæspitosa, vol. iv. 79.
cretica, L. vol. iv. 76.
hirsuta, Lab. vol. iv. 79.
illyrica, L. vol. iv. 77.
Smithii, DeCand. vol. iv. 79.
Satureja capitata, *L.* vol. vi. 36.
cretica, Bauh. vol. vi. 33.
durior, Dalech. vol. vi. 35.
græca, *L.* vol. vi. 34.
juliana, *L.* vol. vi. 32.
montana, *L.* vol. vi. 35.
perennis, Riv. vol. vi. 35.
spicata, Bauh. vol. vi. 32.
spinosa, *L.* vol. vi. 36.
Saturcja Thymbra, *L.* vol. vi. 33.
Saxifraga cæsia, L. vol. iv. 70.
calyciflora, Lapeyr. vol. iv. 70.
Cymbalaria, *L.* vol. iv. 72.
hederacea, *L.* vol. iv. 72.
media, *Gouan.* vol. iv. 70.
orientalis, Jacq. vol. iv. 72.
rotundifolia, *L.* vol. iv. 71.
Scabiosa ambrosioides, vol. ii. 5.
argentea, *L.* vol. ii. 9.
bidens, vol. ii. 6.
brachiata, vol. ii. 9.
coronopifolia, vol. ii. 13.
eburnea, vol. ii. 7.
involucrata, vol. ii. 11.
papposa, Gærtn. vol. ii. 11.
plumosa, vol. ii. 11.
prolifera, *L.* vol. ii. 8.
pterocephala, *L.* vol. ii. 12.
Sibthorpiana, vol. ii. 10.
syriaca, *L.* vol. ii. 6.
Scandix australis, *L.* vol. iii. 78.
italica, Matth. vol. iii. 78.
latifolia, vol. iii. 77.
Schmidtia quadriaristata, Lessing. vol. ix. 6.
Schœnus mucronatus, *L.* vol. i. 30.
Scilla romana, Ker. vol. iv. 33.
Scirpus dichotomus, *L.* vol. i. 35.
Scolymus chrysanthemus, Tourn. vol. ix. 18.
hispanicus, *L.* vol. ix. 18.
maculatus, *L.* vol. ix. 17.
Scordium spinosum, Cavan. vol. vi. 31.
Scorpiurus acutifolia, Vivian. vol. viii. 14.
lævigata, vol. viii. 13.
sulcata, vol. viii. 14.
Scorzonera araneosa, vol. viii. 62.
acaulis, Willd. vol. viii. 71.
calcitrapifolia, *Willd.* vol. viii. 64.
crocifolia, vol. viii. 63.
clongata, *Willd.* vol. viii. 65.
glastifolia, Willd. vol. viii. 62.
graminifolia, *Hoffm.* vol. viii. 62.
laciniata, *L.* vol. viii. 64.
orientalis, L. vol. viii. 67.
picroides, L. vol. viii. 68.
picroides, L. vol. viii. 67.
pygmæa, vol. viii. 61.
tingitana, L. vol. viii. 67.
Scrophularia cæsia, vol. vii. 3.
bicolor, vol. vii. 1.
canina, *L.* vol. vi. 78.
filicifolia, *Miller.* vol. vi. 79.
frutescens β, Prodr. vol. vii. 2.
glauca, vol. vi. 78.
heterophylla, *Willd.* vol. vii. 2.
indica, Ger. vol. vi. 79.
livida, vol. vii. 1.
peregrina, *L.* vol. vi. 77.
Scutellaria albida, *Linn. Mant.* vol. vi. 65.
cretica, L. vol. vi. 26.
hirta, vol. vi. 66.
orientalis, *L.* vol. vi. 64.
peregrina, *L.* vol. vi. 66.
Secale villosum, *L.* vol. i. 77.
Securidaca legitima, Gærtn. vol. viii. 9.
Securigera Coronilla, DeCand. vol. viii. 9.
Sedum alpestre, Villars. vol. v. 37.
Cepæa, *L.* vol. v. 35.
eriocarpum, vol. v. 36.
gallioides, Allion. vol. v. 36.
rupestre, Fl. Dan. vol. v. 37.
saxatile, *Wiggers.* vol. v. 37.
Sedum stellatum, *L.* vol. v. 34.
tetraphyllum, vol. v. 36.
Sempervivum arborescens, Matth. vol. v. 57.
arboreum, *L.* vol. v. 57.
tenuifolium, vol. v. 58.
Senecio Cineraria, DeCand. vol. ix. 55.
crassifolius, *Willd.* vol. ix. 53.
fruticulosus, *DeCand.* vol. ix. 54.
Othonnæ, Bieb. vol. ix. 56.
trilobus, vol. ix. 54.
vernalis, Waldst. et Kit. vol. ix. 54.
Serapias cordigera, *L.* vol. x. 24.
Lingua, *L.* vol. x. 23.
ovalis, Richard. vol. x. 24.
rubra, *L.* vol. x. 25.
Seriola æthnensis, *L.* vol. ix. 10.
Alliatæ, Bivon. vol. ix. 10.
lævigata, *L.* vol. ix. 10.
Serpillum creticum, Ger. vol. vi. 60.
Serratula Chamæpeuce, L. vol. ix. 34.
Sesamoides minus, Dalech. vol. iv. 52.
Sesleria alba, vol. i. 56. vol. ii. 2.
Sherardia erecta, vol. ii. 14.
fœtidissima, Cyril. vol. ii. 33.
muralis, *L.* vol. ii. 13.
Sideritis montana, *L.* vol. vi. 42.
romana, *L.* vol. vi. 43.
spinosa, Bauh. vol. vi. 48.
syriaca, *L.* vol. vi. 41.
Silene Atocion, Jacq. vol. v. 19.
auriculata, vol. v. 24.
Behen, *L.* vol. v. 11.
bipartita, Desf. vol. v. 7.
cæsia, vol. v. 12.
cerastoides, *L.* vol. v. 9.
ciliata, Willd. vol. v. 7.
conica, *L.* vol. v. 16.
conoidea, Huds. vol. v. 16.
cretica, *L.* vol. v. 15.
decumbens, Bernard. vol. v. 7.
dichotoma, *Ehrh.* vol. v. 9.
discolor, vol. v. 8.
divaricata, vol. v. 10.
fabaria, vol. v. 11.
falcata, vol. v. 25.
fruticosa, *L.* vol. v. 20.
gigantea, *L.* vol. v. 22.
inaperta, *L.* vol. v. 14.
italica, *Ait.* vol. v. 20.
juncea, vol. v. 15.
lævigata, vol. v. 13.
leucophæa, vol. v. 17.
linifolia, vol. v. 23.
longipetala, *Venten.* vol. v. 13.
nocturna, *L.* vol. v. 6.
orchidea, *L.* vol. v. 19.
ramosissima, vol. v. 18.
rigidula, L. vol. v. 9.
rigidula, vol. v. 21.
rubella, *L.* vol. v. 18.
sedoides, *Desf.* vol. v. 18.
spinescens, vol. v. 22.
staticifolia, vol. v. 24.
thymifolia, vol. v. 8.
trinervis, Soland. vol. v. 9.
vespertina, *Retz.* vol. v. 7.
Sinapis radicata, Desf. vol. vii. 44.
Sisymbrium torulosum, *Desf.* vol. vii. 31.
Smilax aspera, *L.* vol. x. 49.
Smyrnium creticum, Matth. vol. iii. 82.
perfoliatum, *L.* vol. iii. 82.
verum, Dalech. vol. iii. 82.

Solanum halicacabum, Matth. vol. iii. 28.
sodomeum, *L.* vol. iii. 29.
somniferum, Matth. vol. iii. 27.
viscarium, Dod. vol. iii. 28.
Solidago graveolens, Lamarck. vol. ix. 51.
Sonchus chondrilloides, vol. viii. 67.
picroides, *Lamarck.* vol. viii. 68.
tenerrimus, *L.* vol. viii. 66.
tingitanus, *Lamarck.* vol. viii. 67.
Spartianthus junceus, Link. vol. vii. 67.
Spartium angulatum, *L.* vol. vii. 68.
horridum, vol. vii. 69.
junceum, *L.* vol. vii. 67.
lanigerum, Desf. vol. vii. 69.
parviflorum, Vent. vol. vii. 68.
villosum, *Vahl.* vol. vii. 69.
Stachys cretica, *L.* vol. vi. 47.
lychnitis, Lob. vol. vi. 41.
orientalis, *L.* vol. vi. 48.
spinosa, *L.* vol. vi. 48.
Stœhelina arborescens, *L.* vol. ix. 33.
Chamæpeuce, *L.* vol. ix. 34.
uniflosculosa, vol. ix. 33.
Statice alliacea, *Cavan.* vol. iii. 89.
aristata, vol. iii. 92.
bellidifolia, vol. iii. 90.
Echinus, *L.* vol. iii. 92.
echioides, *L.* vol. iii. 92.
echioides, vol. iii. 91.
globulariæfolia, *Desf.* vol. iii. 90.
palmaris, vol. iii. 91.
rorida, vol. iii. 91.
sinuata, *L.* vol. iv. 1.
Sternbergia colchiciflora, Bieb. vol. iv. 11.
Stipa aristella, *L.* vol. i. 69.
juncea, *L.* vol. i. 67.
paleacea, *Vahl.* vol. i. 68.
tortilis, Desf. vol. i. 68.
Styrax officinale, *L.* vol. iv. 68.

Tamarix gallica, *L.* vol. iii. 85.
Tamus cretica, *L.* vol. x. 48.
Tanacetum monanthos, L. vol. ix. 40.
uliginosum, vol. ix. 42.
Taraxacum bulbosum, Reichenb. vol. viii. 73.
Scorzonera, Reichenb. vol. viii. 71.
Tenoria fruticosa, Spreng. vol. iii. 57.
Terebinthus vulgaris, Tourn. vol. x. 46.
Tetragonolobus purpureus, DeCand. vol. viii. 40.
Teucrium alpestre, *Sibth.* vol. vi. 31.
Arduini, *Linn. Mant.* vol. vi. 26.
Belion, Schreb. vol. vi. 30.
brevifolium, *Schreb.* vol. vi. 24.
capitatum, *L.* vol. vi. 30.
creticum, *L.* vol. vi. 25.
cuneifolium, *Sibth.* vol. vi. 30.
flavum, *L.* vol. vi. 27.
fruticans, *L.* vol. vi. 23.
hyssopifolium, Schreb. vol. vi. 25.
Iva, L. vol. vi. 22.
latifolium, Ger. vol. vi. 27.
latifolium γ, L. vol. vi. 23.
lucidum, *L.* vol. vi. 27.
montanum, *L.* vol. vi. 28.
Teucrium *mucronatum*, L. vol. vi. 31.
Polium, *L.* vol. vi. 29.
quadratulum, *Schreb.* vol. vi. 25.
ramosissimum, Desf. vol. vi. 25.
salicifolium, L. vol. vi. 23.
spinosum, *L.* vol. vi. 31.
supinum β, L. vol. vi. 28.
Teuthrion, Schreb. vol. vi. 29.
verum, Besl. vol. vi. 27.
Thapsia Asclepium, *L.* vol. iii. 79.
garganica, *Linn. Mant.* vol. iii. 80.
Thelygonum Cynocrambe, *L.* vol. x. 32.
Thlaspi maritimum, Dalech. vol. vii. 19.
Thymbra spicata, *L.* vol. vi. 37.
Thymus exiguus, vol. vi. 61.
graveolens, *Sibth.* vol. vi. 61.
incanus, vol. vi. 62.
villosus, *L.* vol. vi. 62.
Zygis, *L.* vol. vi. 60.
Tithymalus arboreus, vol. v. 54.
cyparissias, vol. v. 49.
dendroides, Dod. vol. v. 54.
myrsinites, Matth. vol. v. 55.
spinosus, Whel. vol. v. 49.
Tolpis quadriaristata, *Bivon.* vol. ix. 6.
Tordylium absinthifolium, Pers. vol. iii. 74.
Dodonæi, Dalech. vol. iii. 61.
luteum, Column. vol. iii. 75.
officinale, *L.* vol. iii. 60.
Tragopogon asperum, L. vol. viii. 60.
crocifolium, *L.* vol. viii. 58.
Dalechampii, L. vol. viii. 59.
picroides, L. vol. viii. 59.
Tragus racemosus, Desf. vol. ii. 1.
Tribulus terrestris, *L.* vol. iv. 65.
Trichogyne cauliflora, DeCand. vol. ix. 47.
Trifolium angustifolium, *L.* vol. viii. 35.
Cherleri, *L.* vol. viii. 33.
clypeatum, *L.* vol. viii. 37.
comosum, Lab. vol. viii. 39.
globosum, *L.* vol. viii. 33.
incarnatum, *L.* vol. viii. 35.
lappaceum, *L.* vol. viii. 34.
mauritanicum, *Willd.* vol. viii. 32.
messanense, *L.* vol. viii. 31.
rotundifolium, *Smith.* vol. viii. 35.
speciosum, *Willd.* vol. viii. 39.
spicatum, vol. viii. 32.
stellatum, *L.* vol. viii. 36.
spumosum, *L.* vol. viii. 38.
uniflorum, *L.* vol. viii. 37.
Trigonella corniculata, *L.* vol. viii. 44.
elatior, *DeCand.* vol. viii. 45.
Fœnum-græcum, *L.* vol. viii. 48.
hamosa, *L.* vol. viii. 47.
monspeliaca, *L.* vol. viii. 47.
spicata, vol. viii. 46.
uncinata, Scringe. vol. viii. 46.
Triplocentron melitense, Cassin. vol. x. 6.
Triticum junceum, *L.* vol. i. 80.
Tulipa Clusiana, *Redout.* vol. iv. 25.
Sibthorpiana, vol. iv. 25.
Tunica minima, Dalech. vol. iv. 75.
Turritis arvensis, R. Br. vol. vii. 41.
Urospermum picroides β, Duby et DeCand. vol. viii. 60.

Valantia Aparine, *L.* vol. ii. 24.
hispida, *L.* vol. ii. 29.
muralis, *L.* vol. ii. 28.
Valeriana angustifolia, *Willd.* vol. i. 22.
Calcitrapa, *L.* vol. i. 22.
Cornucopiæ, *L.* vol. i. 23.
cornucopioides, *Rivin.* vol. i. 23.
Dioscoridis, vol. i. 24.
indica, Clus. vol. i. 23.
Locusta β, L. vol. i. 25.
monandra, Villars. vol. i. 23.
orbiculata, vol. i. 23.
rubra β, L. vol. i. 22.
vesicaria, *Willd.* vol. i. 25.
Velezia quadridentata, vol. iv. 81.
rigida, *L.* vol. iv. 80.
Verbascum auriculatum, vol. iii. 20.
mucronatum, Lamarck. vol. iii. 20.
pinnatifidum, Ait. vol. iii. 21.
pinnatifidum, *Vahl.* vol. iii. 23.
phlomoides, *L.* vol. iii. 19.
plicatum, vol. iii. 21.
sinuatum, *L.* vol. iii. 22.
sinuatum β, L. vol. iii. 21.
spinosum, *L.* vol. iii. 23.
Verbena nodiflora, *L.* vol. vi. 43.
sacra, Ger. vol. vi. 44.
supina, *L.* vol. vi. 44.
tenuifolia, Bauh. vol. vi. 44.
Veronica agrestis, *var. Byzantiaca*, vol. i. 6.
cymbalaria, vol. i. 7.
cymbalariæfolia, Vahl. vol. i. 7.
cymbalarifolia, Gmel. vol. i. 7.
gentianoides, *Sm.* vol. i. 5.
glauca, vol. i. 6.
hederifolia β, L. vol. i. 7.
thymifolia, vol. i. 5.
triphyllos, *L.* vol. i. 8.
Vesicaria utriculata, *DeCand.* vol. vii. 25.
Vicia ciliaris, vol. vii. 87.
Ervilia, Willd. vol. viii. 2.
melanops, vol. viii. 1.
polyphylla, vol. vii. 86.
tenuifolia, Roth. vol. vii. 86.
tricolor, Sebast. et Maur. vol. viii. 1.
triflora, Tenore. vol. viii. 1.
Viola gracilis, vol. iii. 17.
Vitex Agnus-castus, *L.* vol. vii. 8.
Vitis vinifera, *L.* vol. iii. 36.
Vulneraria argentea, Lamarck. vol. vii. 75.
pentaphyllos, Tourn. vol. vii. 75.
vesicaria, Lamarck. vol. vii. 75.

Zacintha verrucosa, *Gærtn.* vol. ix. 14.
Zapania nodiflora, Brown. vol. vi. 44.
Ziziphora capitata, *L.* vol. i. 10.
Ziziphus cappadocica, Dalech. vol. iii. 35.
rutila, Clus. vol. iii. 35.
vulgaris, *Willd.* vol. iii. 35.
Zosima orientalis, Hoff. vol. iii. 74.
Zygophyllum album, *L.* vol. iv. 64.
proliferum, Forsk. vol. iv. 64.

FINIS.

LONDINI
IN ÆDIBUS RICHARDI ET JOHANNIS E. TAYLOR
M.DCCC.XL.



QK315
.S56
v.10
R.B.R.